

چ ۴ - قب (درجه حرارت ۳۸ درجه سانتی گراد و بالاتر)

اقدام	تشفیض احتمالی	علائم همراه	ارزیابی
- اعزام به بیمارستان - باز کردن رگ و تزریق سرم رینتگر یا سالین نرمال به میزان یک لیتر در ۲۰-۳۰ دقیقه و سپس یک لیتر در ۳۰ دقیقه - تزریق آمپی سیلین ۲ گرم وریدی یا عضلانی - اعزام طبق ح ۱	پنومونی	تنگی نفس یا درد قفسه سینه ترشحات بدببو و چرکی واژینال، رحم بزرگتر از حد طبیعی، تب، درد شکم، سابقه پارگی طولانی کیسه آب یا دستکاری ماحصل بارداری، حساسیت و ریباند رحم	سؤال کنید: درد شکم، سوزش ادرار، درد پهلوها، تهوع و استفراغ، لرز، خروج ترشحات چرکی یا بدببو از واژن، خونریزی بیماری دیابت، مصرف داروی های مهار کننده سیستم ایمنی
- باز کردن رگ و تزریق سرم نرمال سالین یا رینتگر به میزان یک لیتر در ۲-۳ ساعت - تزریق عضلانی ۱۵۰ میلی گرم جنتاماپسین و ۱۵۰ میلی گرم کلینداماپسین - اعزام	منتزیت، سپسیس	تب بالای ۳۸ درجه و یکی از علائم: - تنفس خیلی تند - سفتی گردن - خواب آلودگی شدید - ضعف شدید یا ناتوانی در ایستادن	تعیین کنید: علائم حیاتی، نمایه توده بدنی
- تزریق ۲ گرم آمپی سیلین وریدی یا عضلانی - اعزام	عفونت مجرای ادراری فوقانی	تب بالای ۳۸ درجه و یکی از علائم: - درد پهلو ها - سوزش ادرار	معاینه کنید: محل بخیه، اندازه و قوام رحم، شکم و پهلو ها)
ارجاع در اولین فرصت به متخصص - در صورت ابتلا به دیابت، نمایه توده بدنی چاق و یا مصرف داروی های مهار کننده سیستم ایمنی: اعزام	عفونت محل برش سزارین یا اپی زیاتومی	تورم یا تندرنس یا قرمزی غیرمعمول محل بخیه، تحت فشار بودن بخیه ها، خروج ترشحات چرکی و بدببو	

این موارد در معرض شوک هستند. با بروز علائم شوک، درمان شوک انجام شود.

نکته: اندازه طبیعی رحم بر حسب زمان پس از زایمان در تعاریف مراقبت معمول اشاره شده است.