



جمهوری اسلامی ایران

PDF Compressor Free Version

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگریز، اداره سرطان



دستورالعمل برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان در ایران



PDF Compressor Free Version

بُنَاءُ
خُلَفَاءُ

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماهیت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان



دستورالعمل برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان در ایران



زمستان ۱۴۰۱

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

دستورالعمل
برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان پستان

۱: دستورالعمل برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان پستان

۷	دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت
۹	فراخوان و ثبت
۹	تصمیم‌گیری و اقدام
۹	مراقبت و پیگیری
۱۱	دستورالعمل ویژه مامای شبکه
۱۱	ارزیابی
۱۴	طبقه‌بندی
۱۵	مراقبت و پیگیری
۲۳	دستورالعمل ویژه متخصص رادیولوژی
۲۴	دستورالعمل ویژه متخصص ژنتیک
۲۶	دستورالعمل ویژه متخصص جراحی
۲۸	دستورالعمل ویژه متخصص پاتولوژی
۲۸	دستورالعمل مدیریت برنامه
۳۱	پیوست ۱
۳۱	دستورالعمل معاینه بالینی پستان
۳۲	پیوست ۲
۳۲	نظام طبقه‌بندی گزارش‌های تصویربرداری پستان (BI-RADS)
۳۳	پیوست ۳
۳۳	محتوی آموزشی

۲: دستورالعمل برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ

۴۱	دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت
۴۳	ثبت مشخصات فردی در سامانه
۴۳	شرح حال
۴۳	ارزیابی سوابق پزشکی
۴۴	انجام آزمایش
۴۴	تصمیم‌گیری و اقدام
۴۴	پیگیری و مراقبت بیماران
۴۷	دستورالعمل ویژه پزشک شبکه
۴۷	طبقه‌بندی و سیر مراقبت بیماران
۵۱	تعریف مرتبط با طبقه‌بندی
۵۸	دستورالعمل ویژه پزشک متخصص گوارش
۵۹	دستورالعمل ویژه پزشک متخصص پاتولوژی
۶۰	دستورالعمل مدیریت برنامه

PDF Compressor Free Version

۶۲	• پیوست ۱ دستورالعمل انجام آزمایش FIT
۶۲	• پیوست ۲ دستورالعمل آمادگی کولونوسکوپی
۶۹	• پیوست ۳ ارزیابی نیاز به کولونوسکوپی، ویزیت متخصص و مشاوره ژنتیک
۷۳	• پیوست ۴ محتوا آموزشی
۸۲	۳: دستورالعمل برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم
۹۳	دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت
۹۳	فراخوان و ثبت
۹۳	تصمیم‌گیری و اقدام
۹۳	پیگیری و مراقبت بیماران
۹۵	دستورالعمل ویژه مامای شبکه
۹۵	ارزیابی اولیه
۹۷	طبقه‌بندی
۹۸	مراقبت و پیگیری
۱۰۵	دستورالعمل ویژه متخصص زنان
۱۰۶	دستورالعمل مدیریت برنامه
۱۰۸	• پیوست ۱ دستورالعمل معاینه بالینی لگن و شکم
۱۰۹	• پیوست ۲ دستورالعمل نمونه‌برداری از دهانه رحم برای آزمایش غربالگری HPV
۱۱۲	• پیوست ۳ دستورالعمل مدیریت نمونه
۱۱۴	• پیوست ۴ محتوا آموزشی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان

۱

دستورالعمل برنامه ملی
تشخیص زودهنگام

سرطان پستان





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیرگیر، اداره سرطان

PDF Compressor Free Version

دستورالعمل برنامه ملی
تشخیص زودهنگام

سرطان پستان

۸

در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت افراد مشکوک یا مبتلا به سرطان پستان و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت افراد شناسایی شده است. در این دستورالعمل، راهنمای لازم برای بهوزز/مراقب سلامت، ماما، پزشک متخصص رادیولوژی، جراحی و پاتولوژی و نیز مدیریت برنامه توسط مدیر برنامه در سطح دانشگاه و ناظر برنامه در سطح شهرستان ارائه شده است.



دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت

بر اساس این دستورالعمل، وظایف بهورز / مراقب سلامت شامل موارد زیر است:

- ۱- فراخوان و ثبت
- ۲- تصمیم‌گیری و اقدام
- ۳- مراقبت و پیگیری

فراخوان و ثبت

پیش از هر اقدامی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

- زنان در گروه سنی ۳۰ تا ۶۹ سال، فراخوان شده و مشخصات آنها در سامانه ثبت گردد.
- در صورتی که سن خانمی زیر ۳۰ سال یا بالای ۶۹ سال باشد، یا در هر سنی در فواصل بین معاینات معمول، به دلیل سابقه فردی یا خانوادگی مثبت و یا مشکلات پستان شامل تغییرات پوست پستان، ترشحات نوک پستان، تغییرات نوک پستان، تغییر اندازه در پستان، بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل و تورم یک طرفه بازو مراجعه کند، مشخصات او نیز باید ثبت گردد. در این افراد همه ارزیابی‌ها مطابق دستورالعمل توسط مامای دوره دیده انجام می‌شود.

تصمیم‌گیری و اقدام

در همه موارد:

- آموزش‌های خودمراقبتی لازم به ویژه در خصوص عوامل زمینه‌ساز بروز سرطان پستان و راه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام آن داده شود (پیوست ۳).
- به مامای آموزش دیده سطح شبکه بهداشت (مرکز خدمات جامع سلامت) به منظور اخذ شرح حال و معاینه ارجاع داده شود.

مراقبت و پیگیری


افرادی که به ماما ارجاع می‌شوند، لازم است برای پیگیری مطابق ذیل به صورت دوره‌ای ارزیابی شوند:

- اگر بنا به گزارش ماما؛ شرح حال و معاینه طبیعی و سوابق منفی بوده است، زمان ارجاع بعدی ۱ تا ۲ سال بعد خواهد بود (در زنان زیر ۴۰ سال، هر دو سال یک بار فراخوان می‌شوند اما در زنان بالای ۴۰ سال، ترجیحاً هر سال یک بار فراخوان شوند)
- اگر بنا به گزارش ماما؛ شرح حال و/یا معاینه غیرطبیعی و سوابق مثبت باشد، زمان مراجعه بعدی، پس از ارزیابی‌های کامل تر، توسط مامای سطح شبکه بهداشت مشخص می‌شود.



فلوچارت ۱- فرآیند پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان

فراخوان و ارزیابی دوره‌ای یا بعدی زنان ۳۰ تا ۶۹ سال



دستورالعمل ویژه مامای شبکه

افرادی که هنگام ارزیابی اولیه در گروه هدف برنامه قرار دارند، توسط کارشناس مراقب سلامت یا بهورز، به مامای دوره‌دیده مرکز خدمات جامع سلامت معرفی شده‌اند. به طور کلی وظیفه مامای دوره‌دیده در درجه اول این است که با شرح حال دقیق و معاینه بالینی پستان و گرفتن سوابق فرد، موارد مشکوک را به درستی جدا کند و موارد غیرمشکوک را برای برنامه‌ریزی جهت ارزیابی دوره‌ای به بهورز / مراقب سلامت برگرداند. بر اساس این دستورالعمل، وظایف مامای دوره‌دیده شامل موارد زیر است:

۱. ارزیابی
۲. طبقه‌بندی
۳. مراقبت و پیگیری

ارزیابی

ارزیابی جامع بیمار توسط ماما شامل موارد زیر است:

- شرح حال مشکلات پستان
- معاینه بالینی پستان (Clinical Breast Exam: CBE)
- شرح حال سوابق پزشکی

۰ سابقه رادیوتراپی قفسه سینه

۰ سابقه نمونه برداری پستان

۰ سابقه فردی یا خانوادگی

شرح حال مشکلات پستان

- توده پستان یا زیر بغل
- تغییر در شکل و قوام پستان
- تغییرات پوستی پستان
- ترشح از نوک پستان

معاینه بالینی پستان

معاینه بالینی پستان‌ها و زیر بغل بر اساس دستورالعمل استاندارد (پیوست ۱) انجام می‌شود. علائم و نشانه‌های بالینی که غیرطبیعی گزارش می‌شوند و لازم است جدآگانه در سامانه ثبت شوند عبارتند از:

- توده پستان یا زیر بغل
- تغییر در شکل (عدم قرینگی) یا قوام (سفتی) پستان



- تغییرات پوستی پستان شامل هر یک از موارد زیر:

- پوست پرتفالی
- اریتم یا قرمزی پوست
- زخم پوست
- پوسته پوسته شدن و اگزما پوست
- تغییرات نوک پستان (فرورفتگی یا خراشیدگی)

- ترشح نوک پستان که دارای هر یک از خصوصیات زیر باشد:

- از یک پستان باشد (و نه هر دو پستان)
- از یک ماجرا باشد (و نه از چند ماجرا)
- ترشح خود به خودی و ادامه دار باشد.
- در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد.
- سروزی یا خونی باشد.

ارزیابی سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه

با بررسی مدارکی که ممکن است همراه فرد باشد، اطمینان حاصل گردد که فرد سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه را دارد یا نه. توجه داشته باشید که این بیماران، عمدتاً کسانی هستند که به دلیل تومورهایی چون لنفوم در سنین کودکی تحت پرتو درمانی قسمت میانی قفسه‌سینه (مدیاستن) قرار گرفته اند. در صورت اطمینان از این موارد، نتیجه ارزیابی را در سامانه به عنوان فرد با سابقه مثبت رادیوتراپی قفسه‌سینه ثبت نمایید.

ارزیابی سابقه نمونه‌برداری پستان

به این منظور ابتدا از فرد پرسیده شود که آیا سابقه نمونه‌برداری با سوزن از پستان را دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود باید گزارش آسیب‌شناسی (پاتولوژی) نمونه‌برداری از بیمار درخواست شود. در بسیاری از موارد در این گزارش‌ها مواردی چون بیماری فیبروکیستیک یا فیبروآدنوم گزارش می‌شود که در این صورت فرد با سابقه مثبت نمونه‌برداری پستان تلقی نمی‌شود. در صورتی که در نمونه‌برداری انجام شده یکی از موارد زیر گزارش شده باشد، فرد با سابقه مثبت تلقی می‌شود. در صورت اطمینان از این موارد نتیجه ارزیابی را در سامانه به عنوان فرد با سابقه مثبت نمونه‌برداری پستان ثبت نمایید.

LCIS (Lobular Carcinoma In Situ) •

ALH (Atypical Lobular Hyperplasia) •

ADH (Atypical Ductal Hyperplasia) •

ارزیابی سابقه فردی یا خانوادگی

با پرسش از فرد و نیز بررسی مدارکی که ممکن است همراه فرد باشد، اطمینان حاصل گردد که فرد یکی از سوابق زیر را دارد. در این صورت نتیجه ارزیابی را در سامانه ثبت نمایید. تعیین این مورد از دو نظر برای ماما اهمیت دارد:

- آیا فرد نیازمند تصویربرداری است؟ اگر آری؛ سن شروع ارزیابی تصویربرداری چیست؟ (در ذیل بخش مراقبت و پیگیری توضیح داده خواهد شد)
- آیا فرد نیازمند مشاوره ژنتیک است؟ (در ذیل بخش مراقبت و پیگیری توضیح داده خواهد شد)

به طور کلی مواردی که باید در تعیین سوابق فردی یا خانوادگی توسط ماما لحاظ گردند عبارتند از:

- کدام فرد یا افراد سابقه سرطان دارند و نسبت آنها با فردی که ارزیابی می‌شود چیست؟

◦ خود فرد

◦ خانواده درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند)

◦ خانواده درجه دو (پدربرزرگ، مادربرزرگ، خاله، عمه، دایی، عمو)

- به ازای هر مورد، نوع سرطان فرد مبتلا (خود فرد یا خانواده) چیست؟

◦ پستان

◦ تخدمان (شامل لوله‌های رحم و پریتوان)

◦ پانکراس (لوزالمعده)

◦ پروستات

- به ازای هر مورد، سن فرد مبتلا (خود فرد یا خانواده) چیست؟

افراد با سابقه فردی یا خانوادگی در ارزیابی ماما بر اساس معیارهای بالا به دو دسته با "خطر بالا" و "خطر خیلی بالا" تقسیم می‌شوند. هر چند تقسیم بندهی دقیق تر افراد به این دو گروه توسط مشاور ژنتیک انجام خواهد شد. افراد که سابقه ابتداء سرطان در خود و خانواده در سنی بالاتر از سن ذکر شده در گروه با خطر بالا دارند، به عنوان گروه با "خطر کمی بالا" طبقه‌بندی می‌شوند.

- **گروه با خطر بالا:** این افراد صرفاً نیازمند مشاوره ژنتیک هستند:

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان در سن ۳۵ تا ۴۰ سال

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان دو طرفه در یک فرد (همzman یا غیرهمzman)
هر دو در سن بالای ۴۵ سال

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان تخدمان در سن ۵۰ تا ۶۰ سال

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک) سرطان پانکراس در سن ۵۰ تا ۶۰ سال

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک) سرطان پروستات در سن ۴۰ تا ۴۵ سال

◦ سابقه فردی یا خانوادگی دست کم دو سرطان که یکی از آنها سرطان پستان و دیگری سرطان پستان،
تخدمان، پانکراس یا پروستات در هر سنی باشد.

- **گروه با خطر خیلی بالا:** این افراد نیازمند مشاوره ژنتیک و تست ژنتیک هستند (هر چند نیاز قطعی این گروه به انجام تست ژنتیک، توسط

مشاور ژنتیک صورت خواهد گرفت، ولی تشخیص افراد این گروه برای تعیین سن شروع تصویربرداری از سوی ماما اهمیت دارد).

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان در سن ۳۵ سال و کمتر

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان دو طرفه در یک فرد (همzman یا غیرهمzman)
در سن ۴۵ سال و کمتر

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان در جنس مرد با هر سنی

◦ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان تخدمان در سن ۵۰ سال یا کمتر



- سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک) سرطان پانکراس در سن ۵۰ سال یا کمتر
- سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک) سرطان پروستات در سن ۴۰ سال یا کمتر
- سابقه فردی یا خانوادگی دست کم دو سرطان که یکی از آنها سرطان پستان کمتر از ۵۰ سال و دیگری سرطان پستان، تخدمان، پانکراس یا پروستات در هر سنی باشد.

طبقه‌بندی

در این مرحله برای سهولت در تصمیم‌گیری، لازم است بیماران را بر اساس ارزیابی‌هایی که در بخش پیشین ذکر شد و با حالت‌های زیر طبقه‌بندی کرد:

- معاينه باليني

◦ طبیعی

◦ غیرطبیعی

- سابقه نمونه‌برداری پستان

◦ منفی (ندارد)

◦ مثبت (دارد)

- سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه

◦ منفی (ندارد)

◦ مثبت (دارد)

- سابقه فردی و یا خانوادگی

◦ منفی (بدون سابقه فردی و یا خانوادگی در بستگان درجه یک و/یا دو)

◦ سرطان پستان (در فرد یا بستگان درجه یک و/یا دو)

◦ سرطان تخدمان (در فرد یا بستگان درجه یک و/یا دو)

◦ سرطان پانکراس (در فرد یا بستگان درجه یک)

◦ سرطان پروستات (در بستگان درجه یک)

به این ترتیب بیماران بر اساس نتایج معاينه بالینی و سوابق به گروه‌های مطابق جدول شماره ۱ طبقه‌بندی می‌شوند.

جدول ۱- گروه‌بندی بیماران براساس نتایج معاینه بالینی و سوابق پزشکی

سابقه فردی و یا خانوادگی	سابقه رادیوتراپی قفسه سینه	سابقه نمونه‌برداری پستان	معاینه بالینی	گروه
ندارد	ندارد	ندارد	طبیعی	۱
ندارد	ندارد	دارد	طبیعی	۲
ندارد	دارد	ندارد	طبیعی	۳
دارد	ندارد	ندارد	طبیعی	۴
ندارد	دارد	دارد	طبیعی	۵
دارد	ندارد	دارد	طبیعی	۶
دارد	دارد	ندارد	طبیعی	۷
دارد	دارد	دارد	طبیعی	۸
ندارد	ندارد	ندارد	غیر طبیعی	۹
ندارد	ندارد	دارد	غیر طبیعی	۱۰
ندارد	دارد	ندارد	غیر طبیعی	۱۱
دارد	ندارد	ندارد	غیر طبیعی	۱۲
ندارد	دارد	دارد	غیر طبیعی	۱۳
دارد	ندارد	دارد	غیر طبیعی	۱۴
دارد	دارد	ندارد	غیر طبیعی	۱۵
دارد	دارد	دارد	غیر طبیعی	۱۶

بدیهی است که بیشتر افراد (حدود ۹۵ درصد) در گروه ۱ (معاینه بالینی طبیعی و سوابق پزشکی منفی) قرار می‌گیرند. از بین ۵ درصد باقیمانده نیز، بیشتر بیماران در گروه ۹ (صرفًاً معاینه بالینی غیر طبیعی) قرار دارند اما واضح است که فرد ممکن است یک یا چند مورد از شرایط ذکر شده در بخش طبقه‌بندی را، همزمان دارا باشد که برخورداری یا عدم برخورداری از هر یک از این شرایط، تعیین کننده نیاز و زمان تصویربرداری اولیه، نیاز به مشاوره ژنتیک و یزیت جراح همچنین لزوم و زمان تکرار معاینه و تصویربرداری خواهد بود که در بخش مراقبت (بخش ذیل) به آن پرداخته می‌شود.

مراقبت و پیگیری

پس از ارزیابی و طبقه‌بندی افراد، سیر مراقبت از بیمار آغاز می‌شود که شامل مراحل زیر است:

- مراقبت
- پیگیری
- آموزش



مراقبت

باید توجه کرد که در خصوص هر بیماری که وارد فرایند پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌شود، بر اساس معیارهای طبقه‌بندی (نتیجه معاينه، سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه، سابقه نمونه‌برداری پستان، سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی) و گروه‌بندی ذکر شده در جدول ۱، باید به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:

- آیا فرد نیازمند تصویربرداری اولیه (ماموگرافی و یا سونوگرافی پستان) در همین ویزیت و تعیین نوبت است؟
- آیا فرد نیازمند مشاوره ژنتیک است؟
- آیا فرد نیازمند ویزیت جراح است؟

چه افرادی نیازمند تصویربرداری اولیه (سونوگرافی یا ماموگرافی) پستان در همین ویزیت هستند؟

• گروه ۱: معاينه طبیعی و همه سوابق منفي

- فرد در این ویزیت نیازمند تصویربرداری نیست و صرفاً ۱۰ تا ۲۰ سال بعد جهت معاينه بالینی پستان مراجعه کند.

• گروه ۲: معاينه طبیعی و سابقه نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH، ALH یا LCIS)

- در صورتی که دست کم ۱۰ سال از نمونه‌برداری گذشته باشد درخواست تصویربرداری کنید.

• گروه ۳: معاينه طبیعی و سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه مثبت

- در صورتی که دست کم ۱۰ سال از رادیوتراپی قفسه‌سینه گذشته باشد، درخواست تصویربرداری کنید.

• گروه ۴: معاينه طبیعی و سابقه فردی یا خانوادگی مثبت

- در گروه با خطر بالا، از سن ۴۵ سالگی درخواست تصویربرداری (ماموگرافی) کنید.
- در گروه با خطر خیلی بالا، ۱۰ سال زودتر از سن ابتلای جوان‌ترین فرد مبتلا، درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۳۰ تا ۲۵ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

• گروه ۵: معاينه طبیعی و سابقه نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH، ALH یا LCIS)

- یک سال پس از نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH یا LCIS، ALH) یا ۱۰ سال پس از رادیوتراپی قفسه‌سینه (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

• گروه ۶: معاينه طبیعی و سابقه نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH، ALH یا LCIS)

- در گروه با خطر بالا، یک سال پس از نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH یا LCIS، ALH) یا از سن ۴۵ سالگی (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

- در گروه با خطر خیلی بالا، یک سال پس از نمونه‌برداری پستان (با تشخیص ADH یا LCIS، ALH) یا ۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

• **گروه ۷:** معاینه طبیعی و سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه مثبت و سابقه فردی یا خانوادگی مثبت

- در گروه با خطر بالا، ۱۰ سال پس از رادیوتراپی قفسه‌سینه یا از سن ۴۵ سالگی (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.
- در گروه با خطر خیلی بالا، ۱۰ سال پس از رادیوتراپی قفسه‌سینه یا ۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

• **گروه ۸:** معاینه طبیعی و سابقه نمونه برداری پستان (با تشخیص ADH یا LCIS، ALH یا ADH) مثبت و سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه مثبت و سابقه فردی یا خانوادگی مثبت

- در گروه با خطر بالا، یک سال پس از نمونه برداری پستان (با تشخیص LCIS، ALH یا ADH) یا ۱۰ سال پس از رادیوتراپی قفسه‌سینه یا از سن ۴۵ سالگی (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.
- در گروه با خطر خیلی بالا، یک سال پس از نمونه برداری پستان (با تشخیص LCIS، ALH یا ADH) یا ۱۰ سال پس از رادیوتراپی قفسه‌سینه یا ۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا (هر کدام که زودتر باشد) درخواست سونوگرافی (نه زودتر از ۲۵ تا ۳۰ سالگی) یا ماموگرافی (نه زودتر از ۳۰ سالگی) کنید.

• در گروه‌های ۲ تا ۸، در صورتی که مطابق دستورالعمل، فرد به سن شروع ارزیابی‌های تصویربرداری رسیده باشد.

- اگر تا کنون تصویربرداری پستان انجام نشده یا بیش از ۱ سال از آن گذشته باشد، در همین ویزیت درخواست سونوگرافی (برای فاصله سنی ۲۵ تا ۳۰ سال) یا ماموگرافی (۳۰ سال و بالاتر) کنید.
- اگر پیش از این و در طی ۱ سال اخیر، ماموگرافی و یا سونوگرافی پستان انجام شده، در صورتی که:
 - * براساس نتیجه تصویربرداری، شرایط ارجاع به جراح را دارد، درخواست ویزیت جراح نمایید.
 - * براساس نتیجه تصویربرداری شرایط ارجاع به جراح را ندارد، زمان ویزیت بعدی را ۱ سال پس از تصویربرداری قبلی تعیین کنید تا براساس نتایج آن زمان اقدام نمایید.

• **گروه‌های ۹ تا ۱۶:** معاینه غیر طبیعی با یا بدون سوابق مثبت

- اگر تا کنون تصویربرداری پستان انجام نشده و یا بیش از ۳ ماه از سونوگرافی گذشته باشد، در همین ویزیت درخواست سونوگرافی (برای فاصله سنی ۲۵ تا ۴۰ سال) یا سونوگرافی به علاوه ماموگرافی (۴۰ سال و بالاتر) درخواست نمایید. (برای زنانی که در کمتر از یک سال گذشته ماموگرافی انجام داده‌اند، درخواست سونوگرافی بدون ماموگرافی خواهد بود).
- اگر پیش از این و در طی ۳ ماه اخیر سونوگرافی پستان و یا در طی ۱ سال اخیر ماموگرافی انجام شده، درخواست ویزیت جراح نمایید.

- در همه گروه‌های ۲ تا ۱۶، سن شروع تصویربرداری، زودتر از ۲۵ سالگی نخواهد بود.
- در همه گروه‌های با خطر بالا و یا کمی بالا، سن شروع ارزیابی تصویربرداری دیرتر از ۴۵ سالگی نخواهد بود.
- در گروه‌های با خطر خیلی بالا از نظر سابقه فردی و خانوادگی، در صورتی که امکان تست ژنتیک باشد و نتیجه آن موجود و منفی گزارش شده باشد، سن شروع ارزیابی تصویربرداری مانند گروه با خطر بالا و از ۴۵ سالگی خواهد بود. اما در صورتی که امکان انجام تست وجود نداشته باشد یا تست انجام شده و نتیجه آن غیرتشخیصی یا مثبت باشد، زمان شروع تصویربرداری، ۱۰ سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلاست اما زودتر از ۲۵ سالگی و دیرتر از ۴۰ سالگی نخواهد بود.



چه افرادی نیازمند مشاوره ژنتیک هستند؟

- در همه موارد نیازمند مشاوره ژنتیک، در صورتی که فرد نیازمند تصویربرداری نیز باشد، پس از انجام تصویربرداری وی را برای مشاوره ارجاع دهید.
- افراد دارای سابقه فردی و یا خانوادگی مثبت با شرح ذکر شده در قسمت‌های بالا (گروه‌های ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۶) را پس از تکمیل فرم ارزیابی در سامانه، برای مشاوره ژنتیک ارجاع نمایید.
- مطابق مطالب ذکر شده در بخش ارزیابی سابقه فردی و خانوادگی، افراد زیر که در دو دسته با "خطر بالا" و "خطر خیلی بالا" قرار می‌گیرند، نیازمند مشاوره ژنتیک هستند:

۰ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان در سن ۵۰ سال و کمتر
۰ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان دو طرفه در یک فرد (همزمان یا غیرهمزمان) در هر سنی
۰ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان تخمدان در سن ۶۰ سال و کمتر
۰ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک) سرطان پانکراس در سن ۶۰ سال و کمتر
۰ سابقه خانوادگی (درجه یک) سرطان پروستات در سن ۴۵ سال و کمتر
۰ سابقه فردی یا خانوادگی دست کم دو سرطان که یکی از آنها سرطان پستان و دیگری سرطان پستان، تخمدان، پانکراس یا پروستات در هر سنی باشد.
۰ سابقه فردی یا خانوادگی (درجه یک یا دو) سرطان پستان در جنس مرد با هر سنی

جدول ۲- تعیین سیر مراقبت و نیاز به معاینه، تصویربرداری، ویزیت جراح و مشاوره ژنتیک براساس نتایج
شرح حال / معاینه بالینی و سوابق پزشکی

گروه	نیاز به ارزیابی‌های اولیه				
	تصویربرداری ^{۱،۲،۳،۴،۵،۶}	معاینه بالینی ^۱ پستان ^۲	مشاوره ژنتیک	ویزیت جراح	سن شروع تصویربرداری ^{۱،۲،۳،۴،۵،۶}
۱	بر اساس نتیجه ارزیابی بعدی	بر اساس نتیجه ارزیابی بعدی	هر ۱ تا ۲ سال	نه	نه
۲	یک سال پس از نمونهبرداری	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	نه	
۳	۱۰ سال پس از رادیوتراپی	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	نه	
۴	در گروه با خطر بالا: از سن ۴۵ سال در گروه با خطر خیلی بالا: ۱۰ سال زودتر از جوانترین فرد مبتلا	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	بله	
۵	(هر کدام زودتر)	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	نه	
۶	در گروه با خطر بالا: یک سال پس از نمونهبرداری یا از سن ۴۵ سال (هر کدام زودتر) در گروه با خطر خیلی بالا: یک سال پس از نمونهبرداری یا ۱۰ سال زودتر از جوانترین فرد مبتلا (هر کدام زودتر)	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	بله	
۷	در گروه با خطر بالا: ۱۰ سال پس از رادیوتراپی یا از سن ۴۵ سال (هر کدام زودتر) در گروه با خطر خیلی بالا: ۱۰ سال پس از رادیوتراپی یا ۱۰ سال زودتر از جوانترین فرد مبتلا (هر کدام زودتر)	بر اساس نتیجه تصویربرداری	هر ۱ سال	بله	

گروه	نیاز به ارزیابی‌های اولیه					سن شروع تصویربرداری ^{۶،۵،۴،۳،۲،۱}
	تصویربرداری ^{۱،۲،۳،۴}	معاینه بالینی ^۲ پستان	مشاوره ژنتیک	ویزیت جراح		
۸	در گروه با خطر بالا: یک سال پس از نمونه‌برداری یا ۱۰ سال پس از رادیوتراپی یا از سن ۴۵ سال (هر کدام زودتر)	هر ۱ سال	هر ۱ سال	بله	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در گروه با خطر خیلی بالا: یک سال پس از نمونه‌برداری یا ۱۰ سال پس از رادیوتراپی یا از سن ۴۵ سال (هر کدام زودتر) با ۱۰ سال پس از رادیوتراپی یا ۱۰ سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلا (هر کدام زودتر)
۹	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	نه	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۰	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	نه	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۱	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	نه	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۲	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بله	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۳	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	نه	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۴	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بله	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۵	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بله	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه
۱۶	در زمان بروز علایم و مراجعه	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه ^۸	بله	بر اساس نتیجه تصویربرداری	در زمان بروز علایم و مراجعه

- در همه موارد سن شروع تصویربرداری یا معاینه پستان، زودتر از ۲۵ سالگی نخواهد بود.
- در گروه‌های ۲ تا ۸، به شرطی که سن شروع ارزیابی‌ها رسیده باشد، سونوگرافی در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال و ماموگرافی در سن ۳۵ سال به بالا به عنوان روش ارزیابی تصویربرداری اولیه توصیه می‌شود.
- در گروه‌های ۲ تا ۸، اگر فردی تا کنون ماموگرافی و یا سونوگرافی پستان نشده و از حداقل سن شروع ارزیابی‌های تصویربرداری وی گذشته است و یا قبلًا ماموگرافی و یا سونوگرافی پستان شده اما حداقل ۱ سال از آن گذشته است، در همین ویزیت درخواست سونوگرافی و ماموگرافی اولیه کنید، در غیر این صورت، زمان ویزیت بعدی را، ۱ سال از گذشت تصویربرداری قبلی تعیین کنید.
- در گروه‌های ۹ تا ۱۶، سونوگرافی در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال و سونوگرافی و ماموگرافی در سن ۴۰ سال به بالا به عنوان روش ارزیابی تصویربرداری اولیه توصیه می‌شود.
- در گروه‌های ۹ تا ۱۶، اگر فردی طی کمتر از ۳ ماه گذشته سونوگرافی شده است، نیازی به درخواست تصویربرداری جدیدی نیست و بر اساس نتایج آن، اقدام بعدی (بیگیری معمول یا ویزیت جراح) را تعیین کنید در غیر این صورت تصویربرداری درخواست نمایید.
- در گروه با "خطر کمی بالا"، سن شروع ارزیابی تصویربرداری از ۴۵ سالگی خواهد بود.
- در گروه‌های با خطر خیلی بالا از نظر سابقه فردی و خانوادگی، در صورتی که امکان تست ژنتیک باشد و نتیجه آن موجود و منفی گزارش شده باشد: سن شروع ارزیابی تصویربرداری مانند گروه با خطر بالا و از ۴۵ سالگی خواهد بود. اما در صورتی که امکان انجام تست وجود نداشته باشد یا تست انجام شده و نتیجه آن غیر تشخیصی یا مثبت باشد، زمان شروع تصویربرداری، ۱۰ سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلاست اما زودتر از ۲۵ سالگی و دیرتر از ۴۰ سالگی نخواهد بود.
- در مواردی که فرد به دلیل یافته‌های غیر طبیعی در معاینه، سونوگرافی و یا ماموگرافی می‌شود، زمان ارزیابی بعدی را یافته‌های تصویربرداری مشخص می‌کند. در شرایطی که علاوه بر معاینه غیر طبیعی، سوابق مثبت (نمونه‌برداری پستان، رادیوتراپی قفسه‌سینه و یا سابقه فردی و خانوادگی) وجود دارد، در صورتی که نتیجه ارزیابی‌های اولیه از جمله تصویربرداری طبیعی باشند، زمان ارزیابی بعدی به هر حال نباید دیرتر از ۱ سال بعد باشد.



چه افرادی نیازمند ویزیت متخصص جراحی هستند؟

- گروه‌های زیر نیازمند ویزیت متخصص جراحی هستند و پس از تصویربرداری، ارجاع خواهند شد:

◦ در شرح حال / معاینه موارد زیر وجود داشته باشد:

* شک به کانسر التهابی پستان

* شک به بیماری پاژه پستان

◦ بر اساس سوابق، نیازمند مشاوره ژنتیک باشد (پس از انجام مشاوره ژنتیک، به جراح ارجاع گردد؛ مگر اینکه معاینه غیرطبیعی باشد)

◦ در تصویربرداری (با در نظر گرفتن شرح حال و معاینه) موارد زیر وجود داشته باشد:

* هر فرد نیازمند بیوپسی از جمله گزارش 5 BI-RADS 4, 5

* گزارش ماموگرافی مبنی بر 3 BI-RADS

* هر فرد دارای معاینه غیر طبیعی و 1, 2 BI-RADS در تصویربرداری

* هر گزارش مبهم ماموگرافی شامل 0 BI-RADS

* تصویربرداری طبیعی ولی شک بالینی بالا

* عدم هماهنگی بین تصویربرداری و معاینه و شرح حال


فلو چارت ۲- انواع توالی برای تعیین سیر مراقبت بیمار توسط مامای شبکه

توالی الف: گروه ۱

تعیین زمان ارزیابی
بعدی

آموزش خودمراقبتی و
معاینه پستان

توالی ب: گروه ۲ تا ۸



توالی ج: گروه ۹ تا ۱۶



سرطان PDF Compressor Free Version

پیگیری

باید توجه داشت که در خصوص هر بیماری که وارد فرایند پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌شود و بر اساس معیارهای طبقه‌بندی (نتیجه شرح حال و معاینه، سابقه رادیوتراپی قفسه‌سینه، سابقه نمونه‌برداری پستان، سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی) و گروه‌بندی ذکر شده در جدول ۱، قرار است به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:

- دریافت بازخورد و تفسیر نتایج تصویربرداری
- دریافت بازخورد و نتایج مشاوره ژنتیک
- دریافت بازخورد و نتایج ویزیت جراح
- زمان و شیوه پیگیری فرد در آینده

دریافت بازخورد و تفسیر نتایج تصویربرداری

- در گروه‌های ۱ تا ۸، در صورتی که فرد طی کمتر از یک سال گذشته ماموگرافی یا سونوگرافی و یا در گروه‌های ۹ تا ۱۶، در طی ۶ ماه اخیر سونوگرافی پستان و یا در طی ۱ سال اخیر ماموگرافی شده باشد، گزارش آن توسط ماما در همان مرحله ویزیت در سامانه ثبت می‌شود.
- در صورتی که فرد تصویربرداری جدید پستان ندارد و در همین ویزیت نیازمند ماموگرافی یا سونوگرافی است، پس از تعیین وقت توسط ماما در سامانه، تحت تصویربرداری قرار می‌گیرد.
- در صورت عدم مراجعه فرد در زمان مقرر برای تصویربرداری، لازم است تا دو بار پیگیری تلفنی از سوی ماما صورت گیرد و در صورت تمایل بیمار، نوبت جدید تعیین گردد.
- مقتضی است پیگیری‌های لازم صورت گیرد و تأکید شود تا گزارش‌های تصویربرداری به صورت ساختارمند در سامانه ثبت شود.
- لازم است بر اساس گزارش BI-RADS اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

BI-RADS 0: تعیین نوبت ویزیت جراح

BI-RADS 1,2: در افراد با شرح حال / معاینه طبیعی:

* تعیین زمان ارزیابی بعدی برای ۱ سال بعد در همه زنان بالای ۴۰ سال و بدون سابقه فردی یا خانوادگی

* تعیین زمان ارزیابی بعدی برای ۱ سال بعد در همه زنان با سوابق مثبت با هر سنی

* تعیین زمان ارزیابی بعدی برای ۲ سال بعد در زنان زیر ۴۰ سال بدون هیچ سابقه فردی یا خانوادگی

BI-RADS 1,2: در افراد با شرح حال / معاینه غیرطبیعی: تعیین نوبت ویزیت جراح

BI-RADS 3: تعیین نوبت ویزیت جراح

BI-RADS 4,5: تعیین نوبت نمونه‌برداری پستان و سپس تعیین نوبت ویزیت جراح

- تعريف و توضیح انواع گزارش‌های تصویربرداری پستان بر مبنای طبقه‌بندی BI-RADS در پیوست ۲ ذکر شده است.

دریافت بازخورد و نتایج مشاوره ژنتیک

- در صورتی که فرد، سابقه فردی یا خانوادگی سرطان (مطابق آنچه که در قسمت ارزیابی و طبقه‌بندی گفته شد) داشته باشد، نیازمند مشاوره ژنتیک است.
- در صورتی که فرد علاوه بر مشاوره ژنتیک، نیازمند تصویربرداری اولیه باشد، درخواست مشاوره ژنتیک را به پس از انجام تصویربرداری موكول کنید.



- در صورتی که فرد بی علامت باشد، پس از مشاوره ژنتیک و بر اساس نتیجه آن، نوبت ویزیت جراحی را در سامانه درخواست کنید.
- در صورتی که فرد علامت دار باشد، پس از دریافت نتیجه تصویربرداری ابتدا نوبت ویزیت جراحی را در سامانه درخواست کنید و در صورت عدم وجود بدحیمی در ارزیابی‌های تخصصی، مشاوره ژنتیک را درخواست نمایید.
- در صورت عدم مراجعة فرد در زمان مقرر برای مشاوره ژنتیک، لازم است تا دوبار پیگیری تلفنی از سوی ماما صورت گیرد و در صورت تمایل بیمار نوبت جدید تعیین گردد.
- مقتضی است پیگیری‌های لازم صورت گیرد و تاکید شود تا گزارش مشاوره ژنتیک در سامانه ثبت شود.

دریافت بازخورد و نتایج ویزیت جراح

- در صورتی که فرد مطابق آنچه که در قسمت مراقبت گفته شد، نیازمند ویزیت جراح باشد، نوبت ویزیت جراحی را در سامانه درخواست کنید.
- توجه داشته باشید که ویزیت جراحی، در همه موارد پس از انجام تصویربرداری درخواست می‌گردد. مگر اینکه در شرح حال / معاینه موارد زیر وجود داشته باشد که حتی قبل از تصویربرداری، نوبت ویزیت جراحی را در سامانه درخواست کنید:

◦ شک به کانسر التهابی پستان

◦ شک به بیماری پاژه پستان

- در صورت عدم مراجعة فرد در زمان مقرر برای ویزیت جراح، لازم است تا دوبار پیگیری تلفنی از سوی ماما صورت گیرد و در صورت تمایل بیمار نوبت جدید تعیین گردد.
- مقتضی است پیگیری‌های لازم صورت گیرد و تاکید شود تا گزارش ویزیت جراح در سامانه ثبت شود.

زمان و شیوه پیگیری فرد درآینده

- در صورتی که شرح حال / معاینه طبیعی بوده و همه سوابق منفی باشد (گروه ۱)، به بهورز / مراقب سلامت ارجاع دهید تا برای ارزیابی بعدی در افراد ۳۰ تا ۴۰ سال برای ۲ سال بعد و در افراد بالای ۴۰ سال ترجیحاً برای یک سال بعد نوبت ویزیت مجدد بدھند.
- در صورتی که شرح حال / معاینه طبیعی بوده و همه یا یکی از سوابق مثبت باشد (گروه‌های ۲ تا ۸)، زمان ارجاع بعدی به صورت زیر تعیین می‌شود:

◦ فرد در طی یک سال اخیر تصویربرداری پستان را انجام داده یا در همین ویزیت نیاز به تصویربرداری است و پس از انجام آن:

* در صورتی که نتیجه ارزیابی‌های اولیه از جمله تصویربرداری طبیعی BI-RADS یک و دو) باشند، زمان ارزیابی بعدی او را برای ۱ سال پس از سونوگرافی یا ماموگرافی قبلی تعیین کنید.

◦ فرد بر اساس سوابق هنوز به سن شروع تصویربرداری نرسیده است:

* در همه شرایط زمان ارزیابی بعدی او را برای ۱ سال پس از همین ارزیابی تعیین کنید.

- در مورد گروه‌هایی که نیازمند تصویربرداری اولیه هستند (گروه‌های ۹ تا ۱۶ و یا گروه‌های ۲ تا ۸ که زمان تصویربرداری آنها رسیده)، مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین لزوم ویزیت جراح، درخواست مشاوره ژنتیک و زمان ارزیابی بعدی، نتایج تصویربرداری جدید (سابقه فردی جدید) است که در ویزیت نخست درخواست و انجام شده است.

PDF Compressor Free Version

- در همه موارد آموزش‌های خود مراقبتی لازم درخصوص عالیم مشکوک سرطان پستان و انجام معاینه شخصی پستان مطابق بسته آموزشی، داده شود.

آموزش

- آموزشی که مامای آموزش دیده در آن دخالت دارد را می‌توان به دو دسته آموزش پرسنل و آموزش بیماران تقسیم کرد:

۰ آموزش پرسنل (سایر ماماها) شامل:

* نحوه گرفتن شرح حال و معاینه بالینی پستان

* نحوه بررسی نتایج ماموگرافی و سونوگرافی و تعاریف مرتبط با طبقه‌بندی نتایج (BI-RADS)

۰ آموزش بیماران شامل:

* آموزش علل بروز سرطان پستان و تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری از آن

* آموزش عالیم هشداردهنده سرطان پستان به افراد تا اگر در فواصل ارزیابی‌های دوره‌ای این عالیم را داشتنند زودتر مراجعه کنند.

* آموزش در خصوص هدف، نحوه انجام تصویربرداری و آمادگی‌های لازم برای آن

دستورالعمل ویژه متخصص رادیولوژی

- مطابق شرایطی که در قسمت مراقبت گفته شد، بیمار جهت تصویربرداری و یا نمونه‌برداری به متخصص رادیولوژی ارجاع داده می‌شود و در سامانه نوبت سونوگرافی و یا ماموگرافی تعیین می‌گردد.
- در مواردی که بیمار نیازمند مداخله درمانی باشد، اقدامات تخصصی انجام و زمان ارزیابی دوره‌ای تعیین و از طریق سامانه به اطلاع ماما می‌رسد تا در این خصوص اقدام نماید.
- در مواردی که فرد نیازمند ارزیابی مجدد، خارج از برنامه ارزیابی دوره‌ای باشد، نیاز به ارزیابی مجدد را ثبت و از طریق سامانه به ماما شبكه اعلام گردد تا وی نوبت ویزیت مجدد جراح را تعیین کند.
- لازم است برای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر به **راهنمای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان پستان**، مراجعه نمایید.



دستورالعمل ویژه متخصص ژنتیک

- افرادی که یکی از چهار عامل خطر اصلی زیر را داشته باشند در گروه دارای خطر افزایش یافته جامعه (Increased risk) طبقه‌بندی می‌گردند:
 - استعداد ژنتیکی شناخته شده برای سرطان پستان (جهش BRCA یا سایر ژن‌های مهم)
 - سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان پستان یا تخدمان
 - سابقه رادیوتراپی به قفسه سینه
 - سابقه نمونه‌برداری از پستان
- منظور از سابقه خانوادگی سرطان، وجود سابقه در اعضای درجه یک یا دو خانواده است.
- توصیه می‌شود اخذ نمونه برای آزمایش ژنتیک از فرد مبتلا به سرطان در خانواده صورت گیرد و نمونه‌گیری از فردی بدون تشخیص سرطان در خانواده تنها زمانی انجام شود که فرد مبتلا مناسب برای آزمایش در دسترس نباشد.
- مواردی که در قسمت وظایف ماما از این دستورالعمل به عنوان افراد نیازمند مشاوره ژنتیک و نیازمند تست ژنتیک ذکر شده‌اند، به دلیل سهولت در یادگیری و ارجاع، ساده شده مواردی هستند که در ادامه با جزئیات بیشتری برای ارائه دهنده خدمات مشاوره ژنتیک ذکر می‌گردد.
- انجام مشاوره ژنتیک در افراد دارای سابقه فردی یا خانوادگی سرطان که شخص یا خانواده‌اش دست کم یکی از مشخصات و سوابق زیر را داشته باشد، توصیه می‌شود:

- موتاسیون شناخته شده مستعدکننده به سرطان پستان
- سرطان پستان در سن ۴۰ سال یا کمتر
- سرطان پستان تریپل نگاتیو در سن ۵۰ سال یا کمتر
- سرطان پستان در جنس مرد در هر سنی
- دو سرطان اولیه متفاوت پستان در یک فرد (همزمان یا غیر همزمان، در یک پستان یا در دو پستان)
- سه سرطان پستان در اعضای خانواده در هر سنی
- سرطان تخدمان (شامل لوله‌های رحم و پریتوان) در سن ۶۰ سال یا کمتر
- سرطان پانکراس در سن ۶۰ سال یا کمتر
- سرطان پروستات (با نمره گلیسون ۷ و بالاتر یا متاستاتیک) در سن ۴۵ سال یا کمتر
- دو مورد از موارد زیر: سرطان پستان در سن ۵۰ سال یا کمتر، سرطان تخدمان در هر سنی، سرطان پانکراس در هر سنی، سرطان پروستات با نمره گلیسون ۷ یا بالاتر در هر سنی، سرطان پروستات متاستاتیک در هر سنی
- سابقه سه مورد از سرطان‌ها یا تظاهرات بالینی مرتبط با بیماری‌های زیر در یک سمت خانواده:
 - * سندروم های تومور هامارتومی PTEN (از جمله سندروم Cowden)
 - * سندروم Li-Fraumeni
 - * سندروم پوتز جگرز
 - * سرطان پستان لوبلار
 - * سرطان معده منتشر (CDH1)

- انجام آزمایش ژنتیک در افراد دارای سابقه فردی یا خانوادگی سرطان که شخص یا خانواده‌اش دست کم یکی از مشخصات و سوابق زیر را داشته باشد، توصیه می‌شود:

◦ موتاسیون شناخته شده مستعد کننده به سرطان پستان
◦ سرطان پستان در سن ۳۵ سال یا کمتر
◦ سرطان پستان تریپل نگاتیو در سن ۴۰ سال یا کمتر
◦ سرطان پستان در جنس مرد در هر سنی
◦ دو سرطان متفاوت پستان در یک فرد (همزمان یا غیرهمزمان، در یک پستان یا در دو پستان) که یکی از آنها در سن ۴۵ سال یا کمتر تشخیص داده شده باشد.
◦ دو سرطان پستان در یک سمت خانواده که حداقل یکی از آنها در سن ۴۰ سال یا کمتر تشخیص داده شده باشد.
◦ سه سرطان پستان در یک سمت خانواده در هر سنی
◦ سرطان تخدمان (شامل لوله‌های رحم و پریتوان) در سن ۵۰ سال یا کمتر
◦ سرطان پانکراس در سن ۵۰ سال یا کمتر
◦ سرطان پروستات (با نمره گلیسون ۷ و بالاتر یا متاستاتیک) در سن ۴۰ سال یا کمتر
◦ دو مورد از موارد زیر: سرطان پستان در سن ۵۰ سال یا کمتر، دو سرطان پستان در هر سنی، سرطان تخدمان در هر سنی، سرطان پانکراس در هر سنی، سرطان پروستات با نمره گلیسون ۷ یا بالاتر در هر سنی، سرطان پروستات متاستاتیک در هر سنی
◦ سابقه سرطان‌ها یا تظاهرات بالینی مرتبط با بیماری‌های زیر در سه نفر یا بیشتر از اعضای یک سمت خانواده:
* سندرم های تومور هامارتومی PTEN (از جمله سندرم Cowden)
* سندرم Li-Fraumeni
* سندرم پوتز جگرز
* سرطان پستان لوبلار
* سرطان معده منتشر (CDH1)

- جهت انجام آزمایش ژنتیک در موارد عنوان شده در بالا، انجام پانل برای بررسی موتاسیون‌های شناخته شده پاتوژنیک (Pathogenic) یا احتمالاً پاتوژنیک (Likely Pathogenic) در ژن‌های زیر توصیه می‌شود:

BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, CDH1, TP53, PTEN, STK11, BRIP1, ATM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, RAD51C, RAD51D, NF1, EPCAM
- در صورت منفی شدن آزمایش پانل ژنتیک و شک بالینی بالا به وجود اختلال ژنتیک وراثتی، انجام آزمایش جهت بررسی حذف (-Dele-) و اضافه‌شدگی (Insertion) در ژن‌های 1 BRCA و 2 BRCA توصیه می‌شود.



دستورالعمل ویژه متخصص جراحی

- مطابق شرایطی که در قسمت مراقبت گفته شد، بیمار جهت ویزیت و بررسی بیشتر به متخصص جراحی ارجاع داده می‌شوند و در سامانه، نوبت ویزیت جراحی تعیین می‌گردد.
- افراد با شرایط زیر پس از تصویربرداری، از طرف ماما به متخصص جراحی ارجاع می‌شوند و جراح لازم است با بررسی‌های دقیق تر این موارد را تایید و متناسب با یافته‌های بالینی و تصویربرداری و سوابق بیمار و براساس "راهنمای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان پستان"، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

◦ در شرح حال / معاینه موارد زیر وجود داشته باشد:
* شک به کانسر التهابی پستان
* شک به بیماری پاژه پستان
◦ براساس سوابق نیازمند مشاوره ژنتیک باشد (پس از انجام مشاوره به جراح ارجاع گردد مگر اینکه معاینه غیرطبیعی باشد)
◦ در تصویربرداری (با در نظر گرفتن شرح حال و معاینه) موارد زیر وجود داشته باشد:
* هر فرد نیازمند بیوپسی از جمله گزارش BI-RADS 4, 5
* گزارش ماموگرافی مبنی بر BI-RADS 3
* هر فرد دارای معاینه غیرطبیعی و BI-RADS 1 در تصویربرداری
* هر گزارش مبهم ماموگرافی شامل BI-RADS 0
* تصویربرداری طبیعی ولی شک بالینی بالا
* عدم هماهنگی بین تصویربرداری و معاینه و شرح حال

- در مواردی که بیمار نیازمند مداخله درمانی باشد، اقدامات تخصصی انجام و زمان ارزیابی دوره‌ای تعیین و از طریق سامانه به اطلاع ماما می‌رسد تا در این خصوص اقدام نماید.
- در مواردی که فرد نیازمند ویزیت مجدد خارج از برنامه ارزیابی دوره‌ای باشد، نیاز به ویزیت مجدد راثبت و از طریق سامانه به ماما شبکه اعلام نمایید تا وی نوبت ویزیت مجدد جراح را تعیین کند.
- در مواردی که اقدام تخصصی خاصی نیاز نباشد، جراح در فرم سیر بیماری این مورد را به ماما شبکه اعلام می‌کند و وی نوبت ارزیابی دوره‌ای را برای فرد تعیین می‌کند.
- در افراد دارای سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان‌های مرتبط (ذکر شده در قسمت افراد نیازمند مشاوره ژنتیک) که نیازمند مشاوره ژنتیک یا تست ژنتیک نیستند و یا نتیجه تست ژنتیک منفی است، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

◦ پیگیری مانند گروه با خطر متوسط جامعه در افراد با سابقه خانوادگی مثبت
◦ ماموگرافی هر ۱۲ ماه با شروع از ۶ تا ۱۲ ماه پس از درمان اولیه و گذشت حداقل یک سال از ماموگرافی قبلی در افراد با سابقه شخصی مثبت
◦ افزایش آگاهی و آموزش خودآزمایی پستان (Breast awareness) با تأکید بر گروه‌های پر خطر

- در افراد دارای سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان‌های مرتبط (ذکر شده در قسمت افراد نیازمند مشاوره ژنتیک) با آزمایش ژنتیک غیرتشخیصی (Uninformative) بدون انجام آزمایشات تکمیلی یا آزمایش تکمیلی غیرتشخیصی (Uninformative) و یا افرادی که امکان تست ژنتیک ندارند، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

- معاینه بالینی هر ۶ تا ۱۲ ماه سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و ماموگرافی سالانه، ۱۰ سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلا‌امانه قبل از ۳۰ سالگی در افراد با سابقه خانوادگی مثبت
- ماموگرافی هر ۱۲ ماه با شروع از ۶ تا ۱۲ ماه پس از درمان اولیه و گذشت حداقل یک سال از ماموگرافی قبلی در افراد با سابقه شخصی مثبت
- افزایش آگاهی و آموزش خودآزمایی پستان (Breast awareness) با تأکید بر گروه‌های پر خطر (از جمله آموزش در خصوص علائم و نشانه‌های سرطان‌های مرتبط با موتاسیون در ژن‌های ذکر شده در قسمت مربوطه)

- در افراد دارای سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان‌های مرتبط (ذکر شده در قسمت افراد نیازمند آزمایش ژنتیک) که آزمایش ژنتیک مثبت دارند، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

- معاینه بالینی هر ۶ تا ۱۲ ماه از ۲۵ سالگی
- ماموگرافی سالانه، از ۳۰ سالگی
- افزایش آگاهی و آموزش خودآزمایی پستان (Breast awareness) با تأکید بر گروه‌های پر خطر (از جمله آموزش در خصوص علائم و نشانه‌های سرطان‌های مرتبط با موتاسیون در ژن‌های ذکر شده در قسمت مربوطه)
- پیشگیری دارویی با یکی از داروهای تاموکسیفین، رالوکسیفین یا مهارکننده‌های آروماتاز بسته به سن و شرایط بالینی بیمار
- جراحی پیشگیرانه ماستکتومی دو طرفه ترجیحاً در سن زیر ۵۰ سال و پس از ارائه مشاوره‌های لازم به بیمار در تیم چند تخصصی
- جراحی پیشگیرانه سالپینگو اووفورکتومی در سنین ۳۵ تا ۴۰ سالگی، پس از تکمیل فرزندآوری و ارائه مشاوره‌های لازم به بیمار در تیم چند تخصصی

- در افراد دارای سابقه شخصی سرطان‌های مرتبط (ذکر شده در قسمت افراد نیازمند آزمایش ژنتیک) که آزمایش ژنتیک مثبت از نظر سندروم Li-Fraumeni دارند، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

- معاینه کامل بالینی شامل پستان، نورولوژیک و درماتولوژیک هر ۶ تا ۱۲ ماه از ۱۸ سالگی
- افزایش آگاهی و آموزش خودآزمایی پستان (Breast awareness) با تأکید بر گروه‌های پر خطر از ۱۸ سالگی
- سونوگرافی سالیانه از ۲۰ تا ۳۹ سالگی (در مواردی که MRI در دسترس نباشد)
- سونوگرافی سالانه و ماموگرافی single MLO view دیجیتال دو طرفه هر دو سال، از ۴۰ تا ۷۵ سالگی (در مواردی که MRI در دسترس نباشد)
- اندوسکوپی و کولونوسکوپی هر ۲ تا ۵ سال با شروع از ۲۵ سالگی یا ۵ سال قبل از سن بروز اولین سرطان روده بزرگ در خانواده



- جراحی پیشگیرانه ماستکتومی دوطرفه، پس از ارائه مشاوره‌های لازم به بیمار در تیم چند تخصصی
- MRI پستان با و بدون کنتراست، سالانه از ۲۰ تا ۷۵ سالگی
- تصمیم‌گیری بر اساس شرایط فردی پس از ۷۵ سالگی بنابراین صلاحیت تیم چند تخصصی

- در زنان دارای سابقه شخصی سرطان‌های مرتبط (ذکر شده در قسمت افراد نیازمند آزمایش ژنتیک) که آزمایش ژنتیک مثبت از نظر سندروم‌های تومور هامارتومی PTEN / سندروم Cowden، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

- معاینه بالینی پستان، هر ۶ تا ۱۲ ماه از ۲۵ سالگی یا ۱۰ سال قبل از سن بروز اولین سرطان پستان در خانواده
- افزایش آگاهی و آموزش خودآزمایی پستان (Breast awareness) با تأکید بر گروه‌های پر خطر از ۱۸ سالگی
- سونوگرافی سالانه از ۲۰ تا ۲۹ سالگی (در مواردی که MRI در دسترس نباشد)
- ماموگرافی single MLO view دیجیتال دو طرفه سالانه، از ۳۰ یا ۳۵ (یا ۱۰ سال قبل از سن بروز اولین سرطان پستان در خانواده) تا ۷۵ سالگی (در مواردی که MRI در دسترس نباشد)
- جراحی پیشگیرانه ماستکتومی دوطرفه، پس از ارائه مشاوره‌های لازم به بیمار در تیم چند تخصصی

- برای اطلاعات بیشتر به "راهنمای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان پستان"، دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنمایی سلامت، پائیز ۱۳۹۸ مراجعه نمایید.

دستورالعمل ویژه متخصص پاتولوژی

- بیمارانی که به دلیل ضایعات بدخیم یا مشکوک به بدخیمی تحت نمونه برداری توسط جراح قرار می‌گیرند، جهت بررسی نمونه به متخصص پاتولوژی (آسیب‌شناسی) ارجاع می‌شوند. انتظار می‌رود به منظور مدیریت درست برنامه و ثبت اطلاعات، گزارش ساختارمند پاتولوژی در سامانه سیمای سرطان توسط متخصص پاتولوژی تکمیل گردد.

دستورالعمل مدیریت برنامه

به طور کلی مدیریت برنامه بر بستر الکترونیک (سامانه سیمای سرطان) صورت می‌گیرد. هر فرد ارائه‌دهنده خدمت، موارد مرتبط با ارزیابی‌ها و وظایفش را در سامانه ثبت می‌کند. نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برای ساماندهی نظام ارجاع و جلوگیری از به اصطلاح گم شدن بیمار (فرد) در طی مسیر مراقبت و پیگیری، هر فرد پس از ارائه خدمت، لازم است فرد گیرنده ارجاع را مشخص و در صورت لزوم نوبت ویزیت یا هر اقدام دیگر مورد نیاز بیمار را در سامانه ثبت نماید.

به این ترتیب، بهورز و مراقب سلامت پس از ثبت فرد در سامانه، وقت ویزیت مامای آموزش دیده شبکه را تعیین و به فرد اعلام می‌کند. سپس مامای شبکه، پس از تکمیل ارزیابی مربوط به خود در سامانه، وقت تصویربرداری را تعیین و به فرد اعلام می‌کند. پس از ارزیابی و تفسیر نتایج تصویربرداری (ماموگرافی یا سونوگرافی پستان)، در صورت نیاز نوبت ویزیت جراحی و یا مشاوره ژنتیک از طریق سامانه اخذ می‌شود.

اگر بر اساس دستورالعمل برنامه، نیاز به نمونه برداری باشد، نمونه برداشت شده از طریق سامانه به مرکز پاتولوژی همکار برنامه ارجاع می‌شود. سپس پاتولوژیست همکار برنامه با ارزیابی نمونه نتیجه را در سامانه ثبت و به جراح در شبکه ارجاع می‌دهد و جراح شبکه بر اساس مجموع نتایج گزارش ساختارمند تصویربرداری و پاتولوژی و نیز مشاوره ژنتیک (در صورت انجام)، نوع و زمان ارزیابی بعدی (از جمله نیاز به مداخله جراحی، تصویربرداری های اضافه یا ارزیابی دوره‌ای معمول) را از طریق سامانه به ماما اعلام می‌نماید.

نکته مهم این است که بازخورد همه ارجاعات و نتایج همه بررسی ها (از جمله گزارش تصویربرداری، پاتولوژی، مشاوره ژنتیک یا ویزیت جراح) در پرونده الکترونیک فرد، به مامای آموزش دیده شبکه منعکس می‌شود و کانون تصمیم‌گیری برای زمان و نوع خدمات بعدی، بر اساس دستورالعمل برنامه، مامای آموزش دیده شبکه است.

به جز راه‌های معمول اطلاع‌رسانی، تلاش خواهد شد هم ارائه دهنده و هم گیرنده خدمت با ارسال پیامک از روند و تاریخ مراقبت مطلع گردد.

در عین حال لازم است هر دانشگاه برای مدیریت و نظارت بر روند اجرای برنامه در سه سطح اقدام نماید که شامل:

- **سطح ۱.** مرکز خدمات جامع شهری؛ با معرفی یک نفر به عنوان ناظر بر عملکرد پایگاه‌های سلامت و مراکز ارائه دهنده خدمت.

اهم وظایف ناظرین و مدیران به شرح زیر می‌باشد:

ناظر مرکز خدمات


- گزارش روزانه از عملکرد بهورز و پژوهش در مرکز، پایگاه‌های سلامت، خانه‌های بهداشت همکار برنامه در منطقه تحت پوشش مدیر و ناظر ستاد شبکه بهداشت شهرستان
 - ثبت تغییرات در مراکز و مشخصات ارائه‌دهندگان خدمت شامل بهورز یا مراقب سلامت، ماما، متخصص جراح، متخصص رادیولوژی و پاتولوژی و در صورت امکان مشاور ژنتیک به عنوان ادمین ستاد شهرستان
 - تنظیم بار فراخوان سطح یک
 - تنظیم بار ارجاع تخصصی
 - مدیریت ارجاع به موقع
 - اطمینان از تعیین نوبت در سیستم‌های بیمارستانی و در صورت لزوم تغییر نوبت ویزیت بنا به درخواست پژوهش یا بیمار هماهنگی با بیمار و ارائه‌دهنده خدمت ۴۸ ساعت پیش از انجام پروسیجر یا ویزیت
 - گزارش دوره‌ای از عملکرد و اجرای برنامه در سطح یک و ثبت آن در سامانه



مدیر و ناظر ستاد معاونت بهداشت دانشگاه

- ثبت اولیه مراکز و مشخصات ارائه دهنگان خدمت شامل بهوزری مراقب سلامت، ماما، متخصص جراح، متخصص رادیولوژی و متخصص پاتولوژی و در صورت امکان مشاوره ژنتیک بعنوان ادمین ستاد دانشگاه
- ارزیابی عملکرد در سطح یک و دو و ثبت گزارش جامع دوره‌ای از اجرای برنامه در سطح شهرستان‌های تحت پوشش
- تنظیم بازارجاع تخصصی^۱
- مدیریت ارجاع به موقع^۱
- اطمینان از تعیین نوبت در سیستم‌های بیمارستانی و در صورت لزوم تغییر نوبت ویزیت بنا به درخواست پزشک یا بیمار^۱
- هماهنگی با بیمار و ارائه دهنده خدمت ساعت پیش از انجام پروسیجر یا ویزیت^۱
- نظرارت بر ارتباط با متخصص توسط دبیرخانه از طریق:
 - ارسال پیامک جلب مشارکت
 - ارسال پیامک فیدبک خدمات
 - وب سایت دبیرخانه

فلوچارت ۳- نمای جامع مدیریت برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان



۱ در شهرستان‌هایی که امکان ارائه خدمات تخصصی میسر نمی‌باشد، این وظیفه بر عهده مدیر و ناظر در ستاد دانشگاه می‌باشد.

پیوست ۱

دستورالعمل معاینه بالینی پستان


اغلب توده‌های پستانی توسط خود بیمار و گاهی نیز توسط پزشک و ماما در حین معاینه معمول پستان کشف می‌شوند.

معاینه‌ی پستان بخش مهمی از معاینات بالینی را تشکیل می‌دهد. معمولاً برای این معاینات، بیماران به ماما یا متخصص جراحی ارجاع داده می‌شوند. به دلیل ارتباط بین تشخیص زودهنگام بیماری و نتایج درمانی قابل توجه آن، هر ماما یا پزشکی باید وظیفه انجام معاینات مربوطه و بررسی‌های تشخیصی لازم را در مراحل اولیه کشف یافته‌ی غیرطبیعی به عهده گیرد. معاینه بالینی، به تنها یی نمی‌تواند بدخیمی را رد کند. روزهای ۵ تا ۱۰ دوره قاعده‌گی، بهترین دوران برای انجام معاینه پستان است. معاینه بالینی پستان باید شامل مشاهده پستان‌ها، بررسی عدد لنفاوی و لمس بافت پستان و زیربغل باشد.

در مشاهده پستان، به اندازه، شکل، رنگ، حاشیه‌ها، جهت پستان‌ها و نوک پستان‌ها توجه نمایید. وجود یک سری مشخصات ویژه در همراهی با ضایعات و توده‌های قابل لمس پستان شک به بدخیمی را بالا می‌برند:

- تغییر در شکل، کشیدگی و عدم قرینگی پستان‌ها (مانند بزرگی پستان)
- تغییرات پوستی (مانند پوست پرتفالی، قرمزی، پوسته پوسته شدن، زخم‌های سفت، نامنظم و ثابت)
- تغییرات نوک پستان (مانند پوسته پوسته شدن یا فورفتگی نوک پستان)
- ترشح نوک پستان (به ویژه اگر از یک پستان باشد، در آن پستان از یک ماجرا باشد، خود به خودی و ادامه‌دار باشد، در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد و از نوع سروزی یا خونی باشد)

یکی از الگوهای معاینه که حساسیت بیشتری نسبت به روش‌های معاینه دیگر دارد، الگوی نوار عمودی است. در این الگو پستان با نوارهای عمودی که باهم تداخل دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد. الگوی نوار عمودی از جهت اینکه تامکه تمام بافت پستان را مورد بررسی قرار می‌دهد، اطمینان بیشتری به ما می‌دهد.





پیوست ۲

نظام طبقه‌بندی گزارش‌های تصویربرداری پستان (BI-RADS)

جدول ۳- نظام طبقه‌بندی گزارش‌های تصویربرداری پستان (BI-RADS)

گروه	توضیح	احتمال بدخیمی	مثال	قدم بعدی ارزیابی
۰	ناکامل؛ نیاز به تصویربرداری‌های اضافه یا مقایسه با ارزیابی‌ها و معاینه‌های قبلی	ناشناخته	غیرقرینگی، توده، کلسیفیکاسیون	نمایهای خاص ماموگرافی، سونوگرافی، MRI پستان، بررسی ارزیابی‌های قبلی
۱	منفی	عدم وجود شواهد بدخیمی	ماموگرافی طبیعی	ارزیابی دورهای معمول
۲	خوش‌خیم	عدم وجود شواهد بدخیمی	غدد لنفاوی التهابی، کیست چربی، کلسیفیکاسیون‌های عروقی، فیبروآدنوم کلسیفیه	ارزیابی دورهای معمول
۳	احتمالاً خوش‌خیم	کمتر از ۲ درصد	توده توپر با ظاهر خوش‌خیم، کلسیفیکاسیون‌های دسته‌ای (کلاستر) (کلاستر)	تکرار تصویربرداری (ماموگرافی و سونوگرافی) در طی ۶ تا ۱۲ ماه
۴	بدخیمی مشکوک	۱۲ تا ۳۵ درصد	توده توپر یا ترکیبی (کمپلکس) شامل جزء توپر و کیستیک، کلسیفیکاسیون‌های دسته‌ای (کلاستر) مبهوت نامشخص	نمونه‌برداری
۵	بدخیمی محتمل	بیش از ۹۵ درصد	توده سوزنی شکل	نمونه‌برداری
۶	بدخیمی شناخته‌شده	۱۰۰ درصد	دارای تاییدیه نمونه‌برداری جراحی، شیمی‌درمانی، رادیوتراپی	

محتوای آموزشی

سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ایران و میلیون ها مورد در جهان رخ می دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل و بهبود کامل، آن بسیار زیاد است.

میزان بروز سالیانه سرطان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بوده است که تا سال ۲۰۴۰ میلادی به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید همچنین عدد مرگ و میر سالیانه از ۱۰ میلیون نفر در همین مدت به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.

در ایران، سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر مبتلا به سرطان می‌شوند که این عدد تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ خورشیدی) با افزایش دست کم بیش از ۱۱۵ درصدی به بیش از ۲۹۰ هزار نفر خواهد رسید.

مهمترین دلایل برای افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از:

- افزایش امید به زندگی و تعداد سالم‌دانان (چرا که بروز سلطان با افزایش سن، افزایش می‌یابد)
 - تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری و کم تحرکی
 - عوامل محیطی مانند افزایش حرارت و خشکی های فسیلی





در حال حاضر با وجودی که عدد خام مرگ و میر ناشی از سرطان‌ها افزایش یافته است، اما به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت می‌کنند با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتلا، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافته است. نیمی از افرادی که امروز با تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بیش از ۴۰٪ بعد از ده سال هنوز زندگی می‌کنند. متوسط میزان بقای ده ساله برای سرطان دو برابر ۳۰ سال گذشته شده است.

مهمترین دلیل بهبود در بقای بیماران، علاوه بر درمان‌های موثرتری که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش‌های تشخیص زودهنگام است. حتی برای کسانی که احتمال بهبودی آنها کم است، شناسنامه ماندن در زمان تشخیص زودتر، بیشتر خواهد بود. دو جزء اصلی در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: **تشخیص زودهنگام و غربالگری**.

تفاوت تشخیص زودرس و غربالگری

لازم است بین تشخیص زودرس (Early Diagnosis) و غربالگری (Screening) اختراق قائل شد. هر دوی این مداخلات در ذیل تشخیص زودهنگام (Early Detection) قرار می‌گیرند:

• **تشخیص زودرس** به مجموع مداخلاتی گفته می‌شود که منجر به تشخیص زودتر سرطان در افرادی می‌شود که علایم مشکوک سرطان را دارند. مجموعه اقدامات ذیل تشخیص زودرس، ضروری و از ظایف اصلی نظام‌های سلامت و بسیار مقویون به صرفه است. به طور عام معنای تشخیص زودرس این است که ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات سلامتی در سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور، علایم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابی‌های دوره‌ای، اگر فردی را بررسی کردیم و یا در فوایل بین ارزیابی‌ها اگر فردی با این علایم مراجعه کرد، آمادگی شناسایی این علایم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در مرحله بعدی موارد مهم را برای اقدامات تشخیصی کامل‌تر به مرکز سطح بالاتر و مجهزتر معرفی کنیم و در عین حال نظام سلامت آمادگی پاسخگویی به ارجاعات و ثبت دقیق خدمات و مراقبت‌ها و پیگیری فرد را داشته باشد.

• **غربالگری** به مجموع مداخلاتی گفته می‌شود که منجر به تشخیص زودتر سرطان در افرادی می‌شود که هیچ علامت مشکوکی ندارند، اما به دلیل شرایط جنسی (مثلًا سرطان پستان) یا سنی خاص (مثلاً سن بالا) بالقوه در معرض خطر هستند. غربالگری می‌تواند در دو گروه با خطر متوسط و با خطر بالا انجام شود. ضرورت انجام خدمات غربالگری به بروز و شیوع بیماری و منابع مالی هر کشوری بستگی دارد و علی‌غم اثربخشی ممکن است هزینه اثربخش نباشد.

غربالگری به معنی شناسایی بیماری احتمالی ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایش‌های ساده در فردی است که هنوز علائم ندارد. در یک برنامه ملی مدیریت سرطان، بعد از غربالگری، افراد تشخیص داده شده تحت درمان مناسب قرار می‌گیرند. بسیاری از سرطان‌ها تنها با معاینه پزشکی و آزمایش‌های تکمیلی تشخیص داده می‌شوند که از جمله آنها سرطان‌های پستان، دهانه، رحم و روده بزرگ هستند.

لازم است هم بیمار و هم ارائه دهنگان مراقبت‌های بهداشتی به اهمیت تشخیص زودهنگام از راه آشنایی با علایم مشکوک سرطان همچنین انجام فعالیت‌های غربالگری سرطان پاییند باشند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتلاف منابع شود. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ (کولورکتال)، پستان و دهانه رحم (سرویکس)، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به این سرطان‌ها و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و همچنین ساماندهی نظام ارجاع، درمان و مراقبت بیماران است.

سرطان پستان

سلامت زنان و به ویژه مادران از مفاهیم زیربنایی در توسعه است. زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نه تنها مسئول سلامت خود هستند، بلکه بیشترین مراقبت‌ها را برای بهداشت خانواده انجام می‌دهند. به این ترتیب وضعیت سلامت زنان تأثیر به سزاًی بر سلامت فرزندان، خانواده و جامعه پیرامون آنها دارد و چنانچه این موضوع نادیده گرفته شود، سلامتی خانواده و جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد. امروزه یکی از عوامل نگران‌کننده در سلامتی زنان، سرطان پستان است. سرطان پستان بیماری است که در آن، سلول‌های بدخیم در بافت پستان ایجاد می‌شوند. در اکثر کشورهای دنیا سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان است. در ایران نیز این بیماری در صدر سرطان‌های زنان قرار دارد و بروز آن در حال افزایش است.

اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان

برای آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت‌کننده در برنامه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌ها، دو اصل مهم باید آموزش داده شود:

۱. راه‌های پیشگیری از سرطان

- به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان برخلاف تصور عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که می‌توان از بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها پیشگیری کرد.
- برای پیشگیری از سرطان پستان باید بدانیم که علل ایجاد کننده سرطان و راه‌های دوری از آن کدامند؛ همچنین چه عواملی اثر محافظتی در برابر این سرطان دارند.

۲. علایم هشدار‌دهنده سرطان

- با شناخت علایم هشدار‌دهنده سرطان پستان و مراجعه به موقع به خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشتی می‌توان ضایعات پیش‌سرطانی را قبل از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

◦ برای مینا زنان باید به مشارکت در برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ترغیب شوند و به شبکه بهداشتی مراجعه کنند.

◦ نحوه انجام خودآزمایی پستان (BSE) به آنها آموزش داده شود.

بهترین راه کاهش خطر سرطان پستان ضمن رعایت شیوه زندگی سالم، انجام مراقبت‌های معمول نظیر معاینات دوره‌ای و انجام ماموگرافی در صورت نیاز به ویژه در افراد پرخطر است.



عوامل خطر سرطان پستان و پیشگیری از آن

هر کسی می‌تواند برای کاهش خطر سرطان و دیگر بیماری‌های مزمن، تغییراتی را در شیوه‌ی زندگی خود ایجاد کند. افراد در معرض خطر باید به خاطر داشته باشند که ترکیبی از عوامل برای ایجاد سرطان لازم است از جمله عوامل ژنتیکی، محیطی و شیوه‌ی زندگی. بعضی از این عوامل می‌توانند اصلاح شوند و بعضی دیگر خارج از اراده افراد هستند، بنابراین افراد می‌توانند قدم‌هایی را برای کاهش خطر بیماری بردارند. خوشبختانه بیشتر عوامل خطری که سبب سرطان پستان می‌شوند قابل اصلاح می‌باشند.

• عوامل خطر غیرقابل اصلاح

- سن بالا
- سابقه خانوادگی و جهش‌های ژنی
- سن قاعده‌گی کمتر از ۱۲ سال
- سن یائسگی بالای ۵۵ سال
- زمینه نژادی و قومی
- وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر
- سابقه هیپرپلازی (رشد بیش از حد سلول‌ها) در پستان

• عوامل خطر قابل اصلاح

- نمایه توده بدنی (BMI) بالای ۳۰
- مصرف الکل
- سن بالای مادر در زمان اولین زایمان
- مواجهه با اشعه برای درمان سرطان در گذشته
- قرص‌های ضد بارداری خوراکی
- هورمون درمانی جایگزین (HRT) پس از یائسگی
- مصرف بالای چربی‌های اشباع شده

• بر مبنای عوامل خطری که در بالا گفته شد، مهم‌ترین توصیه‌های خود مراقبتی برای پیشگیری از سرطان پستان عبارتند از:

- وزن متعادلی داشته باشید.
- از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ کرده، نمک زده و آماده حاوی مواد نگهدارنده، ترشی و کنسروها پرهیز کنید یا مصرف آنها را کاهش دهید.
- میوه، سبزیجات، غلات و گوشت ماهی را بیشتر مصرف کنید چرا که می‌توانند با افزایش سطح آنتی اکسیدان‌ها سبب کاهش بروز سرطان شوند.
- حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت ورزشی داشته باشید.
- از مصرف الکل و سیگار پرهیز کنید.
- در صورت دارا بودن فرزند شیرخوار، شیردهی از پستان را مورد توجه قرار دهید.
- با خانه یا مرکز بهداشتی درباره‌ی خطرات و مزایای مصرف قرص‌های ضد بارداری خوراکی مشورت کنید.
- با خانه یا مرکز بهداشتی درباره‌ی خطرات و مزایای حاصل از مصرف هورمون‌های جایگزین یائسگی مشورت کنید.

سرطان پستان PDF Compressor Free Version

علایم سرطان پستان و تشخیص زودهنگام آنها

- مهم‌ترین علایم ضایعات خوش‌خیم و بدخیم پستان عبارتند از:

◦ توده پستانی یا زیربغلی
◦ تغییر در شکل (عدم قرینگی) یا قوام (سفتی) پستان
◦ تغییرات پوستی پستان شامل هر یک از موارد زیر:
* پوست پرنتقالی
* ارتیتم یا قرمزی پوست
* زخم پوست
* پوسته پوسته شدن و اگزما پوست
* تغییرات نوک پستان (فرورفتگی یا خراشیدگی)
◦ ترشح نوک پستان که دارای هر یک از خصوصیات زیر باشد:
* از یک پستان باشد (ونه هر دو پستان)
* از یک ماجرا باشد (ونه از چند ماجرا)
* ترشح خود به خودی و ادامه دار باشد.
* در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد.
* سروزی یا خونی باشد.

- بر مبنای علایمی که در بالا گفته شد، مهم‌ترین توصیه‌های خود مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان عبارتند از:

◦ اگر سابقه‌ی خانوادگی از سرطان پستان، تخدمان و نیز پانکراس و پروستات دارید، با خانه یا مرکز بهداشتی درباره‌ی گزینه‌های غربالگری خاص، انجام تست‌های ژنتیک یا درمان پیشگیرانه صحبت کنید.
◦ علایم سرطان پستان را بشناسید و اگر توده‌ای مشکوک یا تغییرات پوستی را در پستان‌های خود دیدید، به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمائید.
◦ هر ماه بلافاصله بعد از اتمام قاعدگی، خودآزمایی پستان را انجام دهید.

شیوه‌های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان

أنواع روش‌ها برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان به کار می‌روند که در اینجا فقط به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود از جمله آزمایش معاینه پستان توسط خود فرد، معاینه پستان توسط ماما یا پزشک، ماموگرافی، سونوگرافی پستان و MRI.



معاینه بالینی پستان توسط خود فرد (Breast Self Examination, BSE)

خودآزمایی پستان‌ها باید از سن ۲۰ سالگی، به صورت ماهیانه انجام شود. بهترین زمان برای انجام معاینات پستان، هفته اول قاعده‌گی است. این خودآزمایی از طریق مشاهده و لمس قابل انجام است. مراحل انجام معاینه فردی عبارتند از:

- مقابل آینه بایستید و دست‌ها را به پهلوها بزنید؛ طوری که شانه‌ها به بالا کشیده شوند.
- به اندازه، شکل، رنگ و تورم پستان‌ها توجه کنید.
- در صورت مشاهده هر گونه برآمدگی، فرورفتگی قسمتی از پوست با نوک پستان، قرمزی، زخم و یا لکه‌های پوستی به شبکه بهداشتی مراجعه نمایید.
- دست‌ها را بالا ببرید، طوری که به دو طرف سر بچسبند. در این مرحله نیز به دنبال تغییرات ظاهری به ویژه تغییرات زیر بغل بگردید.
- کمی نوک پستان را فشار دهید. دقت کنید آیا مایعی از نوک یک یا هر دو پستان خارج می‌شود یا خیر. این ترشحات می‌تواند آبکی، شیری، خونی و یا مایعی زرد رنگ باشد.
- دراز بکشید. دست راست خود را زیر سر گذاشته و با دست چپ پستان راست را لمس کنید. سپس دست چپ را زیر سر خود بگذارد و با دست راست پستان چپ را لمس کنید. حرکات دست باید چرخشی و دورانی باشد. این حرکت را از نوک پستان شروع کرده و به خارج حرکت کنید. مطمئن شوید که تمام قسمت‌های پستان زیر بغل را لمس کرده‌اید.
- بایستید یا بنشینید. دست چپ خود را بالا برده و با دست راست قسمت انتهایی پستان چپ، جایی که به زیر بغل منتهی می‌شود را لمس کنید و بالعکس.
- در صورتی که توده‌ای لمس کردید یا تغییرات ظاهری در پستان خود دیدید، حتماً به خانه یا مرکز بهداشتی مراجعه کنید.

ماموگرافی

ماموگرافی تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان را افزایش داده است. هدف از غربالگری سرطان پستان کشف توده‌ها در مرحله‌ای است که هنوز کوچک (زیر ۱ سانتی متر) و قابل درمان با جراحی است. در برنامه تشخیص زودهنگام سرطان پستان در ایران، از ماموگرافی به عنوان روش تشخیصی در افراد پرخطر (مثلاً افراد با سابقه فردی یا خانوادگی مثبت) یا با معاینه غیرطبیعی و در سطح دو خدمت استفاده می‌شود.



برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح یک

تشخیص زودهنگام به منظور بهبود بقا، سنگ بنای کنترل سرطان پستان است. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به سرطان پستان و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما یا مراقب سلامتی که دارای مدرک مامایی بوده و دوره اختصاصی تشخیص زودهنگام سرطان را دیده باشد، ارائه می‌شود. جزئیات وظایف ماما در دستورالعمل تشخیص زودهنگام سرطان پستان ذکر شده است.

برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح دو

- افرادی که به هر دلیل به سطح دو یعنی جراح عمومی در بیمارستان یا مراکز تشخیص زودهنگام سرطان ارجاع می‌شوند، تحت ارزیابی‌های کامل‌تر از جمله ویژیت متخصص و انجام ماموگرافی و در صورت لزوم سونوگرافی قرار می‌گیرند.

افرادی که به دلیل شرح حال / معاینه غیر طبیعی به سطح دو ارجاع می‌شوند در صورتی که زمان مناسب برای ارزیابی دوره‌ای آن‌ها باشد، ماموگرافی می‌شوند. اگر ضایعه مشکوک وجود داشت، نمونه برداری انجام شد و نمونه به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می‌شود. در آزمایشگاه نمونه‌ها رنگ آمیزی شده و در زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود و در صورتی که سلول‌های بدخیم در زیر میکروسکوپ دیده شود، فرد برای اقدامات تشخیصی درمانی به سطح سه یعنی بیمارستان تخصصی ارجاع می‌شود.

تنها راه مطمئن تعیین این که آیا توده‌ای سرطانی است، نمونه برداری از آن توده است. این کار مخصوصاً برداشتن نمونه‌ای از بافت است که گاهی اوقات این کار با استفاده از یک سوزن انجام می‌شود و در آزمایشگاه برروی آن بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. گاهی اوقات برای برداشتن بخشی از توده یا کل آن، عمل جراحی صورت می‌گیرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که آیا توده سرطانی است و اگر سرطانی می‌باشد از چه نوعی است. اما بهترین راه تأیید سرطان پستان در بیشتر موارد نمونه برداری سوزنی (CNB) است و نه لزوماً جراحی.



برنامه تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران: سطح سه

در سطح سه یا تخصصی که معمولاً یک بیمارستان تخصصی یا یک مرکز سرطان است، ابتدا ارزیابی‌های کامل‌تری مانند آزمایش خون و CT اسکن انجام می‌شود و در صورتی که درگیری اعضاً دور دست مانند کبد و ریه وجود نداشته باشد و توده پیشرفت موضعی زیادی نداشته باشد، بیمار جراحی می‌شود که اگر اندازه توده بزرگ نباشد فقط شامل برداشت توده و کمی از بافت طبیعی اطراف توده پستان خواهد بود و نیازی به برداشتن کل پستان نیست و این یکی از مزایای تشخیص زودهنگام سرطان پستان است. روش‌های دیگر درمان سرطان پستان که در صورت لزوم استفاده می‌شوند عبارتند از پرتودرمانی، شیمی‌درمانی و هورمون درمانی.



پس از پایان درمان‌ها، بیمار به فواصل هر ۳ تا ۶ ماه با معاینه بالینی پزشک و سالیانه با انجام ماموگرافی پیگیری می‌شود تا اگر در این بررسی‌ها، نشانه‌هایی از عود وجود داشت، درمان‌های لازم انجام شود.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعاونیت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان



دستورالعمل برنامه ملی
تشخیص زودهنگام

سرطان روده بزرگ





در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت افراد مشکوک یا مبتلا به پولیپ یا سرطان روده بزرگ و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. در این دستورالعمل، راهنمای لازم برای بهورز/مراقب سلامت، پزشک شبکه، پزشک متخصص گوارش، پزشک متخصص پاتولوژی و نیز مدیریت برنامه توسط مدیر برنامه در سطح دانشگاه و ناظر برنامه در سطح شهرستان ارائه شده است.



دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت

بر اساس این دستورالعمل، وظایف بهورز / مراقب سلامت شامل مراحل زیر می‌باشد:

- ۱- ثبت مشخصات فردی در سامانه
- ۲- شرح حال
- ۳- ارزیابی سوابق پزشکی
- ۴- انجام آزمایش
- ۵- تصمیم‌گیری و اقدام
- ۶- پیگیری و مراقبت بیماران

ثبت مشخصات فردی در سامانه

پیش از هر اقدامی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

- مشخصات تمامی افراد ۰۵ تا ۶۹ سال، که برای ارزیابی فراخوان شده‌اند، در سامانه ثبت گردد.
- در صورتی که سن فردی زیر ۰۵ یا بالای ۶۹ سال باشد، یا در هرسنی اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل سابقه فردی یا خانوادگی مثبت و یا مشکلات گوارشی مراجعه کند، مشخصات او نیز باید ثبت شده و بر اساس دستورالعمل زیر بررسی شود. در این افراد همه ارزیابی‌ها مطابق دستورالعمل انجام می‌شود.

شرح حال

• شرح حال از نظر موارد زیر انجام و در سامانه ثبت گردد:

◦ در طی ماه اخیر خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی داشته‌اید؟

◦ تغییر در اجابت مزاج در طی یک ماه اخیر (بیوست با یا بدون اسهال، درد شکم، احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج و یا کاهش قطر مدفع) داشته‌اید؟

◦ کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه اخیر داشته‌اید؟

ارزیابی سوابق پزشکی

• ارزیابی‌های زیر انجام و در سامانه ثبت گردد:

◦ آیا سوابق خانوادگی زیر را دارید؟

* سابقه سرطان یا پولیپ روده بزرگ در خانواده درجه یک را دارد؟ (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان)



* سابقه سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد را داردید؟ (عممه، عمو، خاله، دایی، مادر بزرگ و پدر بزرگ)

ه آیا سابقه فردی بیماری‌های زیر را دارید؟

* سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته

* سابقه پولیپ روده بزرگ در گذشته

* سابقه بیماری التهابی روده بزرگ (IBD) (بیماری کرون یا کولیت اولسروز)

انجام آزمایش

- مطابق دستورالعمل (پیوست ۱) برای فرد تست خون مخفی در مدفوع انجام شود.

تصمیم‌گیری و اقدام

- در صورتی که پاسخ هر یک از موارد بالا (ارزیابی سوابق پزشکی یا شرح حال) و/ یا تست خون مخفی در مدفوع مثبت بود به پزشک شبکه ارجاع داده شود.
- در صورتی که همه موارد در ارزیابی سوابق پزشکی یا شرح حال و نتیجه تست منفی باشد، توصیه می‌شود طی دو سال جهت ارزیابی مجدد مراجعت کند.
- در همه موارد، اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده می‌شود. (مطابق بسته آموزشی بهوز؛ برای اطلاعات بیشتر پیوست ۴ را ملاحظه فرمایید)

پیگیری و مراقبت بیماران

افرادی که به پزشک ارجاع شده و ارزیابی‌های کامل تری می‌شوند، برای پیگیری‌های دوره‌ای باید مطابق شرایط به صورت دوره‌ای ارزیابی گردد:

- در صورتی که همه موارد در ارزیابی سوابق پزشکی یا شرح حال و نتیجه تست منفی باشد، زمان فراخوان بعدی طی دو سال بعد خواهد بود.
- اگر فردی به هر دلیلی توسط پزشک شبکه جهت انجام کولونوسکوپی به سطح تخصصی ارجاع شود، زمان فراخوان بعدی بر اساس یافته‌های کولونوسکوپی و دریافت بازخورد از سطح تخصصی مشخص خواهد شد.
- اگر فردی به دلیل علایم مشکوک توسط پزشک شبکه جهت ویزیت متخصص گوارش ارجاع اما کولونوسکوپی نشود، زمان فراخوان بعدی بر اساس دریافت بازخورد از سطح تخصصی و توسط پزشک شبکه مشخص خواهد شد.


جدول ۱- وظایف بهورز / مراقب سلامت در برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ

ارزیابی	طبقه‌بندی	اقدام و پیگیری و مراقبت
<p>الف- شرح حال</p> <ul style="list-style-type: none"> - خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر داشته‌اید؟ - تغییر در اجابت مراجح در طی یک ماه اخیر (بیوست با یا بدون اسهال، درد شکم، احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مراجح و یا کاهش قطره مدفعه) داشته‌اید؟ - کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه اخیر داشته‌اید؟ <p>ب- ارزیابی سوابق پزشکی</p> <p>بررسی سابقه خانوادگی</p> <ul style="list-style-type: none"> - سابقه سرطان یا پولیپ روده بزرگ در خانواده درجه یک را دارید؟ (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان) - سابقه سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد را دارید؟ (عمه، عمو، خاله، دایی، مادر بزرگ و پدر بزرگ) <p>بررسی سابقه فردی</p> <ul style="list-style-type: none"> - سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته - سابقه پولیپ روده بزرگ در گذشته - سابقه بیماری التهابی روده بزرگ (IBD) (بیماری کرون یا کولیت اولسروز) <p>ج- انجام تست خون مخفی در مدفع (FIT)</p>	<p>۵ دارا بودن همه شرایط زیر:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بدون علامت - سابقه خانوادگی منفی - سابقه فردی منفی - تست خون مخفی در مدفع (FIT) منفی 	<ul style="list-style-type: none"> - اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده شود. - توصیه شود طی دو سال جهت ارزیابی مجدد مراجعه کند. - توصیه شود در صورت داشتن مشکلات گوارشی در فواصل معاینات (زودتر از دو سال) مراجعه کند.
<p>۵ دارا بودن دست کم یکی از شرایط زیر:</p> <ul style="list-style-type: none"> - دارای بودن علامت‌های مشکوک - سابقه خانوادگی مثبت - سابقه فردی مثبت - تست خون مخفی در مدفع (FIT) مثبت 	<ul style="list-style-type: none"> - فرد به پژشک شبکه ارجاع داده شود. - اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده شود. - زمان فراخوان بعدی بر اساس دریافت بازخورد از پژشک شبکه (بر اساس نتایج کولونوسکوپی و یا ویزیت متخصص گوارش و یا مشاوره ژنتیک) به بیمار توصیه می‌گردد. 	<ul style="list-style-type: none"> - اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده شود. - توصیه شود طی دو سال جهت ارزیابی مجدد مراجعه کند. - توصیه شود در صورت داشتن مشکلات گوارشی در فواصل معاینات (زودتر از دو سال) مراجعه کند.



فلوچارت ۱- فرایند پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ

فراخوان و ارزیابی دوره‌ای یا بعدی زنان و مردان ۵۰ تا ۶۹ سال



دستورالعمل ویژه پزشک شبکه

افرادی که هنگام ارزیابی اولیه مشخصات ذکر شده در ادامه این متن را دارند، توسط کارشناس مراقب سلامت یا بهورز و به تفکیک دلیل ارجاع، به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت معرفی شده‌اند. وظیفه‌ی پزشک در درجه اول این است که بر موارد ذکر شده توسط مراقب سلامت یا بهورز صحه بگذارد و سپس با شرح حال دقیق‌تر، معاینه و بررسی‌های پاراکلینیک، موارد مشکوک را به درستی جدا کند و موارد غیر مشکوک را به بهورز / مراقب سلامت برگرداند.

البته واضح است که فرد ممکن است یک یا چند مورد از شرایط ذکر شده در بخش طبقه‌بندی را، همزمان دارا باشد (جدول شماره ۳، پیوست ۳) که برخورداری یا عدم برخورداری از هر یک از این شرایط، تعیین کننده نیاز و زمان کولونوسکوپی اول، لزوم و زمان تکرار کولونوسکوپی و همچنین نیاز به ویزیت متخصص گوارش و یا مشاوره ژنتیک خواهد بود. فرد پس از دریافت نتایج کولونوسکوپی و نتیجه ویزیت متخصص یا مشاوره ژنتیک، به قصد مدیریت ارجاع و ارزیابی بازخورد، توسط پزشک شبکه، دوباره ویزیت می‌شود. در صورت عدم نیاز به مداخله بیشتر به جهت پیگیری و مراقبت دوره‌ای، بیمار توسط پزشک شبکه به بهورز ارجاع داده می‌شود.

طبقه‌بندی و سیر مراقبت بیماران

الف- طبقه‌بندی بیماران

برای سهولت تصمیم‌گیری لازم است بر اساس چهار معیار زیر، بیماران را طبقه‌بندی کرد:

- نتیجه تست FIT

۰ مثبت

۰ منفی

- علایم و نشانه‌ها

* بی علامت

* علایم کم خطر

* علایم پر خطر

- سوابق فردی

۰ منفی (بدون سابقه فردی)

۰ پولیپ معمولی

۰ پولیپ کم خطر

۰ پولیپ پر خطر

۰ سرطان روده بزرگ

۰ بیماری التهابی روده (IBD)



• سوابق خانوادگی

◦ منفی (بدون سابقه خانوادگی)

◦ پولیپ پرخطر

◦ سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک

◦ سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو

◦ سندروم ارشی

- براین مبنای بیماران به گروه‌های مطابق ذیل (جدول ۲) طبقه‌بندی می‌شوند که با جزئیات بیشتر در جدول شماره ۳ (پیوست ۳) ذکر شده است:

جدول ۲- طبقه‌بندی بیماران براساس نتیجه تست FIT، علایم، سابقه فردی و سابقه خانوادگی

سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	ردیفهای متناظر در جدول شماره ۳	گروه
منفی	مثبت یا منفی	با یا بدون علامت	مثبت	۱ تا ۶	یکم
مثبت	مثبت یا منفی	با یا بدون علامت	مثبت	۷ تا ۳۰	دوم
منفی	منفی	پرخطر	منفی	۳۱ تا ۳۶	سوم
منفی	منفی	کم خطر	منفی	۳۷	چهارم
منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	۳۸ تا ۴۳	پنجم
مثبت	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	۴۴ تا ۶۷	ششم
منفی	مثبت	بدون علامت	منفی	۶۸ تا ۷۲	هفتم
مثبت	مثبت یا منفی	بدون علامت	منفی	۷۳ تا ۹۶	هشتم
منفی	منفی	بدون علامت	منفی	۹۷	نهم

ب- تعیین سیر مراقبت بیمار (تعیین اقدامات و توالی آنها)

- باید توجه کرد که در خصوص هر بیماری که وارد فرایند پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ می‌شود و براساس معیارهای چهارگانه طبقه‌بندی (نتیجه تست FIT، وجود، عدم وجود و نوع علایم و نشانه‌ها، سابقه فردی، سابقه خانوادگی)، قرار است به سوالات زیر پاسخ دهیم که در ادامه پاسخ به آنها خواهد آمد:

◦ آیا فرد نیازمند کولونوسکوپی اولیه و تعیین نوبت است؟

◦ آیا فرد نیازمند مشاوره ژنتیک است؟

◦ آیا فرد نیازمند ویزیت متخصص گوارش است؟

◦ زمان و نحوه پیگیری فرد در آینده چه خواهد بود؟

- چه افرادی نیازمند کولونوسکوپی اولیه (تعیین وقت در پایان همین ویزیت) هستند؟

◦ افرادی که لازم است در همین ویزیت، برای تعیین وقت کولونوسکوپی آنها اقدام شود:

* افراد دارای FIT مثبت (گروه‌های یکم و دوم)

* افراد دارای علایم پرخطر (گروه سوم)

* افراد دارای علایم (کم خطر یا پرخطر) و هم‌زمان سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی (گروه‌های پنجم و ششم)

- افرادی که ممکن است در همین ویزیت، نیاز باشد برای تعیین وقت کولونوسکوپی آنها اقدام شود:
 - * در افراد با FIT منفی و بدون علامت، اما با سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی مثبت (گروه هفتم و هشتم)، براساس اطلاعات مندرج در جدول ۳، ممکن است لازم باشد در همین ویزیت و در اولین نوبت، برای تعیین وقت کولونوسکوپی اولیه آنها اقدام گردد.
 - * افراد دارای صرفاً علایم کم خطر (گروه چهارم) پس از ویزیت گوارش و اعلام بازخورد به پزشک شبکه، ممکن است در همین ویزیت و در اولین نوبت، برای تعیین وقت کولونوسکوپی اولیه آنها اقدام گردد.

• چه افرادی نیازمند مشاوره ژنتیک هستند؟

- افراد دارای سابقه فردی و یا خانوادگی (گروه‌های دوم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم و گاهی یکم) در شرح حال (مطابق توضیحات ذکر شده در بخش‌های سابقه فردی و خانوادگی از جمله سندرم‌های شناخته شده ارثی مانند FAP و HNPCC)
- افراد دارای سرطان روده بزرگ در کولونوسکوپی
- وجود و یا سابقه پولیپ در کولونوسکوپی شامل:
 - * پولیپ هاماوتوم به تعداد ۲ یا بیشتر
 - * پولیپ آدنوماتوز به تعداد ۱۰ یا بیشتر
 - * پولیپ بدون پایه (SSP) به تعداد ۵ یا بیشتر

• چه افرادی نیازمند ویزیت متخصص گوارش هستند؟

- افرادی که تنها دارای علایم کم خطر گوارشی هستند (گروه چهارم)
- افرادی که در کولونوسکوپی اولیه (گروه‌های اول، دوم، سوم، پنجم، و ششم و گاهی چهارم، هفتم یا هشتم) آنها موارد زیر گزارش شده است:
 - * سرطان روده بزرگ
 - * بیماری التهابی روده بزرگ
- پولیپ‌های دارای مشخصات نیازمند مشاوره ژنتیک (پس از انجام مشاوره)

• زمان و نحوه پیگیری فرد در آینده چه خواهد بود؟


- در صورت وجود علایم کم خطر، فرد به فاصله دو هفته ویزیت و سپس تصمیم‌گیری می‌شود.
- در هر شرایطی، زمان ارزیابی بعدی دیتر از ۲ سال بعد نخواهد بود.
- در صورت بروز علایم در فاصله ۲ سال و مراجعته فرد، باز هم براساس این دستورالعمل ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد.
- در مورد گروه‌هایی که نیازمند کولونوسکوپی اولیه هستند (یک، دو، سه، پنجم و ششم)، مبنای تصمیم‌گیری برای درخواست مشاوره ژنتیک و زمان ارزیابی (و یا کولونوسکوپی) بعدی، نتایج کولونوسکوپی جدیدی است که در همین ویزیت درخواست و انجام شده است.
- در افراد با FIT منفی و بدون علامت، اما با سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی مثبت (گروه هفتم و هشتم)، در صورتی که نیاز به انجام کولونوسکوپی در همین ویزیت و در اولین نوبت نباشد، مبنای تصمیم‌گیری



اولیه، سابقه فردی و خانوادگی قبلی است بنابراین لازم است در این گروه‌ها گزارش کولونوسکوپی قبلی از بیمار دریافت شود.

- در افراد با FIT منفی و بدون علامت، اما با سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی مثبت (گروه هفتم و هشتم)، در صورتی که نیاز به انجام کولونوسکوپی در همین ویزیت و در اولین نوبت نباشد، براساس سوابق فردی و خانوادگی، یافته‌های کولونوسکوپی قبلی و سن، وقت کولونوسکوپی و در نتیجه زمان ارزیابی بعدی آنها تعیین می‌گردد.
- در همه شرایط و براساس سوابق فردی یا خانوادگی، اگر فردی در زمانی کمتر از ۲ سال آینده نیازمند کولونوسکوپی باشد، نوبت ارزیابی بعدی او نیز همان زمان خواهد بود. در غیر این صورت، حداقل ۲ سال بعد فراخوان و ارزیابی می‌شود.
- اگر فردی به تازگی درمان شده است و پیش از جراحی سرطان، کولونوسکوپی نشده باشد، به فاصله ۶ ماه از پایان درمان و اگر پیش از جراحی، کولونوسکوپی شده باشد، در فاصله ۳ سال از پایان درمان، برای کولونوسکوپی ارجاع می‌شود.
- در همه شرایط، تکرار کولونوسکوپی، براساس نتایج آخرين ارزیابی دوره‌ای تعیین می‌شود بنابراین لازم است زمان تکرار کولونوسکوپی، بعد از مشاوره ژنتیک و تعیین مواردی چون نسبت افراد مبتلا در خانواده، نوع بیماری فرد مبتلا در خانواده، تعداد افراد مبتلا و سن جوان‌ترین آنها صورت گیرد.

فلوچارت -۲- انواع توالی برای تعیین سیر مراقبت بیمار توسط پزشک شبکه



ج-آموزش

- آموزشی که پزشک در آن دخالت دارد را می‌توان به دو دسته آموزش پرسنل و آموزش بیماران تقسیم کرد:

۰ آموزش پرسنل شامل:

- * نحوه گرفتن شرح حال و انجام تست خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوچیمی (FIT: Fecal Immunochemical Test) و تفسیر آن است.

۰ آموزش عمومی شامل:

- * آموزش علل بروز آدنوم و سرطان روده بزرگ و تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری از آن
- * آموزش عالیم هشداردهنده سرطان به افراد تا اگر در فواصل ارزیابی‌های دوره‌ای این عالیم را داشتند زودتر مراجعه کنند.
- * آموزش در خصوص هدف، نحوه انجام کولونوسکوپی و آمادگی‌های لازم برای آن
- * ارائه آموزش‌های تغذیه‌ای مناسب به بیماران براساس محتوای آموزشی تغذیه در سرطان

تعاریف مرتبط با طبقه‌بندی

تعاریف مفاهیم ارائه شده در طبقه‌بندی و گروه‌بندی بیماران در زیر ارائه می‌گردد.

تست FIT مثبت

- تعريف: منظور، فردی است که یا در ارزیابی اولیه بهورز و یا در ارزیابی توسط پزشک، تست FIT مثبت دارد. بر این مبنای مطابق گروه‌بندی ذکر شده در بالا این فرد بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری همزممان از عالیم و یا سوابق فردی و خانوادگی، در گروه یک (ردیف ۱ تا ۶ از جدول شماره ۳) یا دو (ردیف ۷ تا ۲۰ از جدول شماره ۳) قرار می‌گیرد.
- پزشک در صورت هرگونه تردید در خصوص نتیجه تست FIT که توسط بهورز/مراقب سلامت انجام شده است، خود باید با کیت مشابه تست را تکرار کند و به آزمایشگاه ارجاع ندهد.
- در همه موارد، فرد نیازمند کولونوسکوپی است. به همین دلیل آمادگی‌های لازم را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

فرد علامت‌دار

- تعريف: منظور، فردی است که یکی از عالیم ذکر شده در ارزیابی بهورز را دارد و مطابق دستورالعمل زیر و در چهار گام، به صورت کامل تر بررسی و برای وی تصمیم‌گیری می‌شود. بر این مبنای مطابق گروه‌بندی ذکر شده در بالا این فرد بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری همزممان از تست FIT مثبت و یا سوابق فردی و خانوادگی، در گروه بکم (ردیف ۱ تا ۶ از جدول شماره ۳)، گروه سوم (ردیف ۳۱ تا ۳۶ جدول شماره ۳)، گروه چهارم (ردیف ۳۷ جدول شماره ۳)، گروه پنجم (ردیف ۷ تا ۲۰ از جدول شماره ۳)، گروه ششم (ردیف ۴۴ تا ۶۷ جدول شماره ۳) قرار می‌گیرد و اگر بیمار هیچ علامتی نداشت، مبنای ۳۸ تا ۴۳ جدول شماره ۳ یا گروه ششم (ردیف ۴۴ تا ۶۷ جدول شماره ۳) قرار می‌گیرد (مراجعه به گروه هفتم یا هشتم).



- گام‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص طبقه‌بندی بیماران بر اساس علائم و نشانه‌ها به شرح زیر است:

۱. شرح حال

- در گام اول پزشک شرح حال دقیق‌تری از نظر دارا بودن علایم زیر می‌گیرد و در پرونده الکترونیک ثبت می‌کند تا بتواند در چارت علایم و نشانه‌ها از آنها استفاده کند (فلوچارت ۳). اگر بیمار برخلاف نظر به هوزر / مراقب سلامت، سابقه هیچ علامتی نداشت، بر اساس سایر شرایطی که جلوتر خواهد آمد تصمیم‌گیری خواهد شد.

◦ خونریزی رکتال: منظور دفع خون روشن چه به صورت قطره قطره یا بر روی مدفوع یا دفع خون تیره است به ویژه در طی یک ماه اخیر است.

◦ یبوست: منظور سختی و کاهش تعداد دفعات دفع مدفوع یا دفع مدفوع خشک است که در طی یک ماه اخیر ایجاد شده باشد. ممکن است بیمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج و یا کاهش قطره مدفوع را نیز ذکر کند.

◦ اسهال: منظور افزایش در تعداد دفعات مدفوع است که در طی یک ماه اخیر ایجاد شده است که ممکن است به تنهایی یا به صورت متناوب با یبوست، احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج و یا کاهش قطره مدفوع باشد.

◦ کاهش وزن: منظور کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه اخیر است که بدون رژیم غذایی خودخواسته ایجاد شده باشد (مثلاً اگر فردی با ۸۰ کیلوگرم وزن، در طی شش ماه اخیر لاغر شده باشد به طوری که وزن کنونی وی زیر ۷۲ کیلوگرم باشد).

◦ درد شکم: منظور درد ژنرالیزه یا درد ناحیه پایین شکم است.

۲. معاینه

- در گام دوم، افراد علامت‌دار که در ارزیابی پزشک نیز علامت‌دار بودن آنها تایید شده است، تحت معاینه قرار می‌گیرند و نتایج در پرونده الکترونیک بیمار ثبت می‌شود:

◦ معاینه شکم: در معاینه شکم به توده یا تندرنس شکم در نواحی مختلف توجه و به عنوان معاینه غیر طبیعی شکم ثبت کنید.

◦ معاینه رکتوم: در معاینه رکتوم که پس از تخلیه مدفوع انجام می‌شود، به لمس توده، زخم یا خونی شدن دستکش، توجه نموده و به عنوان معاینه غیر طبیعی رکتوم ثبت کنید.

۳. بررسی چارت ارزیابی خطر

- در گام سوم، چارت علایم و نشانه‌های مشکوک به سرطان روده بزرگ تحت بررسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که یک یا چند علامت یا نشانه در خانه‌های قرمز و نارنجی را به عنوان پرخاطر و یک یا چند علامت یا نشانه در خانه‌های سفید یا زرد را به عنوان کم خطر در نظر بگیرید. (فلوچارت ۳)

◦ بیمارانی که تنها یک مورد غیر طبیعی در شرح حال یا معاینه دارند، بالاترین ردیف تحت عنوان "هر علامت به تنهایی" را ملاحظه نمایند.

- اگر بیماری، دو یا بیشتر علامت یا نشانه داشت، به خانه‌هایی که از تقاطع دو علامت یا نشانه حاصل می‌شوند توجه کنید و خانه پرنگ‌تر را به عنوان معیار در نظر بگیرید.

۴. تصمیم‌گیری

- در گام چهارم، مطابق توضیحات زیر برای بیمار در ویزیت اول یا در صورت نیاز پس از ویزیت دوم در عرض دو هفته، تصمیم‌گیری می‌شود:

◦ چه با یک علامت (به عنوان مثال خونریزی رکتال) یا بیشتر، اگر بیمار در گروه پرخطر (خانه قرمز یا نارنجی) قرار گیرد، آمادگی‌های لازم برای کولونوسکوپی را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

◦ چه با یک علامت (به عنوان مثال بیوست یا درد شکم) یا بیشتر، اگر بیمار در گروه کم خطر (خانه زرد یا سفید) قرار گیرد اما هم‌زمان سابقه فردی یا خانوادگی مثبت نیز داشته باشد، باز هم آمادگی‌های لازم برای کولونوسکوپی را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

◦ چه با یک علامت (به عنوان مثال بیوست یا درد شکم) یا بیشتر، اگر بیمار در گروه کم خطر (خانه زرد یا سفید) قرار گیرد و هم‌زمان سابقه فردی یا خانوادگی مثبت نداشته باشد، اقدامات زیر را انجام دهید:

* هموگلوبین درخواست کنید (اگر فردی آزمایش هموگلوبین مربوط به یک ماه اخیر را به همراه داشته باشد نیازی به تکرار آزمایش هموگلوبین نیست)

* دو هفته بعد بیمار را ویزیت کنید و ضمن بررسی مجدد علایم و نشانه‌ها، تست FIT انجام دهید.

* چارت علایم و نشانه‌ها را بررسی نمایید.

◦ اگر در ویزیت دوم، بیمار مثبت شد، فارغ از نوع علایم و نشانه‌ها، آمادگی‌های لازم برای کولونوسکوپی را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

◦ اگر در ویزیت دوم، بیمار همان تک علامت ویزیت یک را به صورت پایدار داشت، به خانه‌هایی که عبارت "پایداری در ویزیت دوم" در آنها درج شده است، نگاه شود؛ به این ترتیب برای بیماری که علامت پایدار "درد شکم" را دارد، آمادگی‌های لازم برای کولونوسکوپی را آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

◦ اگر در ویزیت دوم، چه با یک علامت جدید (به عنوان مثال خونریزی رکتال) یا بیشتر، بیمار در گروه پرخطر (خانه قرمز یا نارنجی) قرار گیرد، آمادگی‌های لازم برای کولونوسکوپی را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

◦ اگر در ویزیت دوم، چه با یک علامت (به عنوان مثال بیوست یا درد شکم) یا بیشتر، اگر بیمار در گروه کم خطر (خانه زرد یا سفید) قرار گیرد، از طریق سامانه، برای وی وقت ویزیت متخصص گوارش را تعیین نمائید.



فلوچارت ۳- فرایند ارزیابی علایم و نشانه‌های مشکوک به سرطان روده بزرگ



گروه‌های پرخطر

گروه‌های کم خطر

سابقه فردی مثبت

- تعزیف:** منظور، فردی است که یکی از سوابق فردی مثبت زیر را دارد؛ در این صورت مطابق دستورالعمل زیر و در گام‌های زیر، وی را به صورت کامل تر بررسی و تصمیم‌گیری نمایید. براین مبنای مطابق گروه‌بندی ذکر شده در بالا این فرد بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری همزمان از تست FIT مثبت، علایم و یا سوابق خانوادگی، در گروه یکم (ردیف ۱ تا ۶ از جدول شماره ۳)، دوم (ردیف ۷ تا ۳۰ از جدول شماره ۳)، گروه پنجم (ردیف ۳۸ تا ۴۳ جدول شماره ۳)، گروه ششم (ردیف ۴۴ تا ۶۷ جدول شماره ۳) یا گروه هفتم (ردیف ۶۸ تا ۷۲ جدول شماره ۳) قرار می‌گیرد. اگر بیمار سابقه فردی نداشت، مبنای تصمیم‌گیری را علایم یا سوابق خانوادگی وی قرار دهید (گروه‌های سوم، چهارم و هشتم).
- گام‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص طبقه‌بندی بیماران بر اساس سوابق فردی به شرح ذیل است:

۱. شرح حال

- در گام اول، پژوهش شرح حال دقیق‌تری از نظر سوابق فردی می‌گیرد و در پرونده الکترونیک ثبت می‌کند.
- سابقه فردی سرطان روده بزرگ: در صورت امکان، گزارش پاتولوژی نمونه‌بندی یا جراحی که تاییدکننده تشخیص سرطان باشد از بیمار درخواست شود. ممکن است بیمار سوابق را همراه نداشته باشد؛ اما معمولاً می‌داند که چه نوع درمانی برایش انجام شده است. بنابراین از وی سوال شود که جراحی شده است و هنگام معاینه به اسکار جراحی اش توجه شود یا با توصیف شیمی‌درمانی و رادیوتراپی توجه شود آیا این درمان‌ها برایش انجام شده است؟

◦ سابقه فردی بیماری التهابی روده بزرگ (IBD) (بیماری کرون یا کولیت اولسروز): در این صورت، معمولاً بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، نام بیماری خود رانیز می‌دانند. در غیر این صورت ملاحظه خلاصه پرونده‌ها یا گواهی پزشک، گزارش کولونوسکوپی احتمالی، نمونه برداری تاییدکننده تشخیص یا داروهایی که مصرف می‌کند (مثلًاً آمینوسالسیلات‌ها از جمله مسالازین یا کورتیکواستروئیدها)، می‌تواند تایید یا ردکننده بیماری او باشد.

◦ سابقه فردی پولیپ یا آدنوم: در صورت امکان گزارش کولونوسکوپی، پاتولوژی نمونه برداری یا به ندرت جراحی که تایید کننده تشخیص پولیپ باشد از بیمار درخواست شود. ممکن است بیمار سوابق را همراه نداشته باشد اما معمولاً می‌داند که چه نوع اقدامی برایش انجام شده است. بنابراین با توصیف کولونوسکوپی توجه شود. آیا این اقدام برای انجام شده است؟

۲. ارزیابی نتیجه کولونوسکوپی قبلی

- در گام دوم و اگر فرد دارای پولیپ باشد، با بررسی جزئیات کولونوسکوپی، خطر پولیپ مشخص می‌شود. تعیین خطر پولیپ به سه عامل بستگی دارد:

اندازه پولیپ	تعداد پولیپ	نوع پولیپ
کمتر از یک سانتی‌متر	یک عدد	غیر آدنوماتوز
یک سانتی‌متر و بیشتر	بیشتر از یک عدد (۲، ۵ و ۱۰)	آدنوماتوز

- بر اساس سه معیار بالا، سه نوع پولیپ قراردادی زیر وجود دارد:

◦ پولیپ معمولی:

- * پولیپ هیپرپلاستیک زیر ۱ سانتی‌متر
- * پولیپ التهابی، هاماوتوم یا لنفوئید

◦ پولیپ کم خطر:

- * پولیپ آدنوماتوز یا بدون پایه (SSP) با اندازه زیر ۱ سانتی‌متر به تعداد حداقل ۲

◦ پولیپ پر خطر:

- * پولیپ آدنوماتوز یا بدون پایه (SSP) با اندازه ۱ سانتی‌متر و بیشتر به هر تعداد

- * پولیپ آدنوماتوز یا بدون پایه (SSP) با هر اندازه‌ای به تعداد ۳ یا بیشتر

- * پولیپ هیپرپلاستیک با اندازه ۱ سانتی‌متر و بیشتر به هر تعداد

- * پولیپ ویلوس یا توبولوویلوس با هر اندازه و تعدادی

- * پولیپ از هر نوع با دیسپلазی دارای درجه تمایز بالا (High Grade)



۱۳. تصمیم‌گیری: کولونوسکوپی

- در گام سوم، تصمیم‌گیری در مورد زمان کولونوسکوپی بر اساس میزان خطر پولیپ، سابقه سرطان یا بیماری التهابی روده صورت می‌گیرد:

- پولیپ روده بزرگ معمولی: به فاصله ۵ تا ۱۰ سال از کولونوسکوپی قبلی
- پولیپ روده بزرگ کم خطر: به فاصله ۳ تا ۵ سال از کولونوسکوپی قبلی
- پولیپ روده بزرگ پر خطر: به فاصله ۱ تا ۳ سال از کولونوسکوپی قبلی
- سرطان روده بزرگ: به فاصله ۶ ماه تا ۳ سال از کولونوسکوپی قبلی
- بیماری التهابی روده بزرگ: به فاصله ۸ تا ۱۰ سال از تشخیص بیماری

- در همه انواع پولیپ، حداقل فاصله، معمولاً در اولین نوبت پیگیری پس از کولونوسکوپی اول خواهد بود و برای نوبت‌های بعدی، حداقل فاصله تعیین می‌شود.
- در بیماران با سابقه سرطان روده بزرگ، اگر جراحی سرطان روده بزرگ، به صورت اورژانسی انجام شده باشد، کولونوسکوپی معمولاً ۶ ماه پس از پایان درمان انجام می‌شود. در صورتی که بیمار پیش از جراحی کولونوسکوپی شده باشد، کولونوسکوپی بعدی معمولاً ۳ سال بعد انجام خواهد شد.
- در بیماران با سابقه بیماری التهابی روده بزرگ، اگر بیمار مشکل دیگری نداشته باشد، زمان کولونوسکوپی به قصد غربالگری پولیپ یا سرطان روده بزرگ، بنابراین صلاح‌حید متخصص گوارش معمولاً طی ۸ تا ۱۰ سال پس از تشخیص بیماری خواهد بود.
- در همه موارد، در صورت نیاز به کولونوسکوپی، آمادگی‌های لازم را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.

۱۴. تصمیم‌گیری: مشاوره ژنتیک

- در گام چهارم، تصمیم‌گیری در مورد مشاوره ژنتیک، بر اساس نوع و تعداد پولیپ، سابقه سرطان یا سندرم‌های ارثی صورت می‌گیرد:

- پولیپ هامارتوم به تعداد ۲ یا بیشتر
- پولیپ آدنوماتوز به تعداد ۱۰ یا بیشتر
- پولیپ بدون پایه (SSP) به تعداد ۵ یا بیشتر
- سرطان روده بزرگ
- سندرم‌های ارثی شناخته شده FAP و HNPCC

- در همه موارد، در صورت نیاز به مشاوره، از طریق سامانه، برای وی وقت مشاوره ژنتیک را تعیین کنید.

سابقه خانوادگی مثبت

- تعریف: منظور، فردی است که یکی از سوابق خانوادگی مثبت زیر را دارد در این صورت مطابق دستورالعمل زیر و در گام‌های ذکر شده در ادامه این متن، وی را به صورت کامل تر بررسی و تصمیم‌گیری نمایید. بر این مبنای مطابق گروه‌بندی ذکر شده در بالا، این فرد

بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری همزمان از تست FIT مثبت، عالیم و یا سوابق فردی، در گروه دوم (ردیف ۷ تا ۳۰ از جدول شماره ۳)، گروه ششم (ردیف ۴۴ تا ۶۷ جدول شماره ۳) یا گروه هشتم (ردیف ۷۳ تا ۹۶ جدول شماره ۳) قرار می‌گیرد. اگر در ارزیابی و شرح حال به شواهد مثبتی در خصوص سابقه خانوادگی فرد نرسیدید، مبنای تصمیم‌گیری را عالیم یا سوابق فردی وی قرار دهید (گروه‌های یکم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم).

- گام‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص طبقه‌بندی بیماران بر اساس سوابق خانوادگی به شرح ذیل است:

۱. شرح حال

• با بررسی مدارکی که ممکن است همراه فرد باشد، اطمینان حاصل گردد که فرد یکی از سوابق زیر را دارد و اگر چنین سابقه‌ای وجود دارد آیا واقعاً خانواده درجه یک یا دو، سلطان یا پولیپ روده بزرگ داشته‌اند یا نه. تعیین این مورد هم از نظر لزوم و سن درخواست کولونوسکوپی و هم مشاوره ژنتیک اهمیت دارد:

- سابقه سلطان یا پولیپ به ویژه از نوع پولیپ آدنوماتوز روده بزرگ در خانواده درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان)
- سابقه سلطان روده بزرگ در خانواده درجه دو (عمه، عمو، خاله، دایی، مادر بزرگ یا پدر بزرگ) در سن زیر ۵ سال
- وجود مورد شناخته شده FAP یا HNPCC در خانواده

۲. ارزیابی نتیجه کولونوسکوپی قبلی

- در گام دوم و اگر فرد دارای پولیپ باشد، با بررسی جزئیات کولونوسکوپی، نوع پولیپ مشخص می‌شود.

۳. تصمیم‌گیری: کولونوسکوپی

• در گام سوم، تصمیم‌گیری در مورد زمان کولونوسکوپی بر اساس میزان خطر پولیپ، سابقه سلطان یا بیماری التهابی روده صورت می‌گیرد:

- پولیپ پرخطر در خانواده درجه یک: حداقل از سن ۴۰ سال (شروع از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده)
- سلطان روده بزرگ در خانواده درجه یک: حداقل از سن ۴۰ سال (شروع ۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده)
- سلطان روده بزرگ در خانواده درجه دو (زیر ۵۰ سالگی): حداقل از سن ۵۰ سال (شروع ۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده)
- سندروم‌های ارثی شناخته شده FAP و HNPCC: در اولین فرصت

• در همه موارد، در صورت نیاز به کولونوسکوپی، آمادگی‌های لازم را به بیمار آموزش داده و از طریق سامانه، برای وی وقت کولونوسکوپی را تعیین کنید.



۱۴. تصمیم‌گیری: مشاوره ژنتیک

- در گام چهارم، تصمیم‌گیری در مورد مشاوره ژنتیک، بر اساس نوع و تعداد پولیپ، سابقه سرطان یا سندروم‌های ارثی صورت می‌گیرد:
 - پولیپ هاماوتوم به تعداد ۲ یا بیشتر
 - پولیپ آدنوماتوز به تعداد ۱۰ یا بیشتر
 - پولیپ بدون پایه (SSP) به تعداد ۵ یا بیشتر
 - سرطان روده بزرگ
 - سندروم‌های ارثی شناخته شده FAP و HNPCC
- در همه موارد، در صورت نیاز به مشاوره، از طریق سامانه، برای وی وقت مشاوره ژنتیک را تعیین کنید.

دستورالعمل ویژه پزشک متخصص گوارش

بیماران به سه منظور زیر از سطح پزشک شبکه به پزشک متخصص گوارش ارجاع می‌گردند:

- انجام کولونوسکوپی
- انجام ویزیت گوارش و تصمیم‌گیری در مورد وضعیت بیمار
- به دلیل نتایج حاصل از کولونوسکوپی

۱. انجام کولونوسکوپی

- در مواردی که بیمار به دلیل کولونوسکوپی به متخصص گوارش ارجاع شده، از قبل آمادگی‌های کولونوسکوپی را دریافت کرده است. انتظار می‌رود به منظور مدیریت درست برنامه و ثبت اطلاعات، گزارش ساختارمند کولونوسکوپی در سامانه سیمای سرطان تکمیل می‌گردد.
- اگر به هر دلیلی امکان انجام کولونوسکوپی وجود نداشته باشد یا به دلیل آمادگی نامناسب، کولونوسکوپی کامل انجام نشود، متخصص گوارش در فرم سیر بیماری، نیاز به کولونوسکوپی (محدد) را ثبت می‌نماید. این موضوع از طریق سامانه به پزشک شبکه اعلام گردد تا وی نوبت کولونوسکوپی فرد را دوباره تعیین شود.
- اگر نتیجه کولونوسکوپی، حاکی از نیاز به ارسال نمونه (پولیپ، تومور و یا هر ضایعه‌ای) به پاتولوژی باشد، در سامانه نیز به مرکز پاتولوژی همکار برنامه که از قبل آمادگی دریافت نمونه را دارد، انتخاب و ارسال نمونه به وی اعلام می‌شود.
- اگر حاصل کولونوسکوپی، طبیعی یا هر نتیجه دیگری به جز پولیپ و سرطان باشد، متخصص گوارش، فرد را در سامانه به پزشک شبکه ارجاع می‌دهد تا زمان ارزیابی بعدی بر اساس دستورالعمل توسط پزشک شبکه تعیین گردد.

۲. انجام ویزیت گوارش و تصمیم‌گیری

- در مواردی که بیمار صرفاً به دلیل عالیم کم خطر و مشکوک (گروه چهارم) جهت ویزیت به متخصص گوارش ارجاع می‌شود ممکن است سه حالت زیر اتفاق بیفتد:

- فرد نیازمند کولونوسکوپی است: متخصص گوارش در فرم سیر بیماری، نیاز به کولونوسکوپی را ثبت می‌کند و از طریق سامانه به پزشک شبکه اعلام می‌گردد تا وی نوبت کولونوسکوپی فرد را تعیین کند.
- فرد نیازمند ویزیت مجدد است: متخصص گوارش در فرم سیر بیماری، نیاز به ویزیت مجدد را ثبت نموده و از طریق سامانه به پزشک شبکه اعلام می‌شود تا وی نوبت ویزیت مجدد گوارش را تعیین کند.
- فرد نیازمند اقدام خاص تخصصی نیست: متخصص گوارش در فرم سیر بیماری، این مورد را به پزشک شبکه اعلام می‌کند و وی نوبت ارزیابی دوره‌ای را برای فرد تعیین می‌نماید.

۳. بازخورد ناشی از نتایج کولونوسکوپی

- افرادی که در کولونوسکوپی اولیه آنها موارد زیر گزارش شده باشد، از طرف پزشک شبکه به متخصص گوارش ارجاع می‌گردند که در هر کدام از موارد اقدامات لازم انجام می‌شود:

- سرطان روده بزرگ: در این مورد، اگر تومور در ناحیه‌ای به جز رکتوم باشد، جهت جراحی اولیه به متخصص جراحی ارجاع می‌گردد. در مواردی که تومور در ناحیه انتهای روده بزرگ (رکتوم) باشد؛ اغلب برای نئوادجوانات کمودادیاسیون به متخصص رادیوانکولوژی (رادیوتراپی) ارجاع می‌گردد.
- بیماری التهابی روده بزرگ: درمان و مدیریت عالیم این بیماری بر عهده متخصص گوارش است.
- پولیپ‌های دارای مشخصات نیازمند مشاوره ژنتیک: پس از اینکه مشاوره ژنتیک انجام شد، در صورتی که بیمار در گروه سندرم‌های ارثی قرار گیرد، در مورد اقدامات درمانی یا پیشگیرانه دارویی و جراحی با مشورت تخصص‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شود.

دستورالعمل ویژه پزشک متخصص پاتولوژی

بیماری که به دلیل سرطان، پولیپ یا هر مشکل دیگری تحت نمونه برداری توسط متخصص گوارش قرار گرفته است، جهت بررسی نمونه به متخصص پاتولوژی (آسیب‌شناسی) ارجاع می‌گردد. انتظار می‌رود به منظور مدیریت درست برنامه و ثبت اطلاعات، گزارش ساختارمند پاتولوژی در سامانه سیمای سرطان تکمیل گردد.



دستورالعمل مدیریت برنامه

به طور کلی مدیریت برنامه بر بستر الکترونیک (سامانه سیمای سرطان) صورت می‌گیرد. هر فرد ارائه‌دهنده خدمت، موارد مرتبط با ارزیابی‌ها و ظایفیش را در سامانه ثبت می‌کند.

نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برای ساماندهی نظام ارجاع و جلوگیری از به اصطلاح گم شدن بیمار (فرد) در طی مسیر مراقبت و پیگیری، هر فرد پس از ارائه خدمت، لازم است فرد گیرنده ارجاع را مشخص و در صورت لزوم نوبت ویزیت یا هر اقدام دیگر مورد نیاز بیمار را در سامانه ثبت نماید.

به این ترتیب، بهورز و مراقب سلامت پس از تکمیل ارزیابی مربوط به خود، در صورتی که فرد نیازمند ارجاع به پزشک شبکه باشد، در سامانه، وقت ویزیت پزشک شبکه را تعیین و به فرد اعلام می‌کند. سپس پزشک شبکه، پس از تکمیل ارزیابی مربوط به خود، در سامانه، وقت ویزیت پزشک متخصص گوارش را تعیین و به فرد اعلام می‌کند.

متخصص گوارش نیز، اگر بیمار به منظور کولونوسکوپی ارجاع شده باشد، گزارش ساختارمند مربوطه را در سامانه تکمیل می‌کند. اگر نتیجه کولونوسکوپی، حاکی از نیاز به ارسال نمونه (پولیپ، تومور یا هر ضایعه‌ای) به پاتولوژی باشد، در سامانه نیز به مرکز پاتولوژی همکار برنامه اعلام می‌شود. سپس پاتولوژیست همکار برنامه با ارزیابی نمونه نتیجه را در سامانه ثبت و به پزشک شبکه ارجاع می‌دهد و پزشک شبکه بر اساس مجموع نتایج گزارش ساختارمند کولونوسکوپی و پاتولوژی، نوع و زمان ارزیابی بعدی (از جمله ویزیت متخصص گوارش، مشاوره ژنتیک یا ارزیابی دوره‌ای معمول) را مشخص می‌کند.

اگر حاصل کولونوسکوپی، طبیعی یا هر نتیجه دیگری به جز پولیپ و سرطان باشد، متخصص گوارش، فرد را در سامانه به پزشک شبکه ارجاع می‌دهد تا زمان ارزیابی بعدی براساس دستورالعمل تعیین گردد.

نکته مهم این است که بازخورد همه ارجاعات و نتایج همه بررسی‌ها (از جمله گزارش کولونوسکوپی، پاتولوژی، مشاوره ژنتیک یا ویزیت گوارش) در پرونده الکترونیک فرد، به پزشک شبکه معنکس می‌شود و کانون تصمیم‌گیری برای زمان و نوع خدمات بعدی، براساس دستورالعمل برنامه، پزشک شبکه است.

به جز راه‌های معمول اطلاع رسانی، تلاش خواهد شد هم ارائه‌دهنده و هم گیرنده خدمت با ارسال پیامک پیشاپیش از روند و تاریخ مراقبت مطلع گرددند.

در عین حال لازم است هر دانشگاه در سطح شبکه بهداشت شهرستان یک نفر را به عنوان مدیر و ناظر برنامه در سطح شهرستان و یک نفر را به عنوان ناظر و مدیر برنامه در سطح ستاد معاونت بهداشت، انتخاب کند. اهم وظایف ناظر شهرستان عبارتند از:

◦ تنظیم بار فراخوان سطح یک


◦ تنظیم بار ارجاع تخصصی

◦ مدیریت ارجاع به موقع

◦ اطمینان از تعیین نوبت در سیستم‌های بیمارستانی

◦ هماهنگی با بیمار و ارائه‌دهنده خدمت ۴۸ ساعت پیش از انجام پروسیجر یا ویزیت

فلوچارت ۴- نمای جامع مدیریت برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ





پیوست ۱

دستورالعمل انجام آزمایش FIT


تست خون مخفی در مدفع به روش ایمونوژیمی (FIT یا IFOBT) یک سنجش سریع یک مرحله‌ای جهت تشخیص کیفی خون پنهان در مدفع انسانی به روش ایمونوژیمی است. در این تست از دو آنی بادی در فرمت ساندویچی استفاده شده است که به صورت انتخابی، خون پنهان (هموگلوبین) در مدفع را در غلظت حداقل 50 ng/ml (یا $6 \mu\text{g/g}$) شناسایی می‌کند. مزیت مهم این روش آن است که نتایج برخلاف روش‌های قدیمی اندازه‌گیری خون مخفی تحت تأثیر رژیم غذایی بیمار قرار نمی‌گیرد.

محتویات و شرایط نگهداری کیت FIT

هر بسته کیت شامل ظرف جمع آوری مدفع حاوی بافر استخراج، کاست مورد استفاده برای انجام تست (حاوی یک عدد کاست و ماده جاذب رطوبت) و دستورالعمل استفاده از کیت است. کیت (با弗 و کاست) در دمای اتاق یا یخچال (2°C تا 30°C درجه سانتی‌گراد) قابل نگهداری هستند. کیت‌ها تا تاریخ چاپ شده بر روی بسته‌بندی پایدار بوده و پس از آن قابل مصرف نیستند. توجه گردد که باید از یخ زدن محتویات کیت باید جلوگیری شود.


نمونه‌گیری توسط بیمار (مراجعةه کننده)

- بخش اول این آزمایش توسط خود فرد مراجعة کننده قابل انجام است، بنابراین باید برای به دست آمدن بهترین پاسخ، شیوه نمونه‌گیری توسط بههورز یا مراقب سلامت، به درستی به فرد آموزش داده شود.
- برای جمع آوری درست نمونه، بیمار باید از محل تجمع مدفع نمونه برداری کند که می‌تواند از ظرف جمع آوری نمونه باشد (که توسط بههورز یا مراقب سلامت به بیمار ارائه می‌گردد) یا از داخل کاسه توالت. در صورت نمونه برداری از کاسه توالت، کف توالت باید کاملاً شسته و عاری از مواد شوینده و پاک کننده باشد. ترجیحاً بهتر است دو بار سیفون کشیده شود یا مقداری آب قبل از دفع مدفع ریخته و کاسه توالت شسته شود.
- لوله جمع آوری نمونه را به صورت ایستاده نگه داشته و درپوش آن را باز نموده و قسمت میله متصل به درب ظرف (قاشقک درون آن) بیرون آورده شود.



نحوه بازکردن لوله جمعآوری نمونه

- قسمت میله متصل به درب ظرف (قاشقک جمعکننده نمونه) را مطابق شکل زیر دست کم در ۴ جای مختلف از نمونه مدفوع فرو کرده و نهایتاً به اندازه یک عدس از مدفوع را بردارید.



نحوه نمونه‌برداری از مدفوع


- سپس قسمت میله متصل به درب ظرف را دوباره به جای خود برگردانده و درب ظرف را بیندید.
- پس از آن باید ظرف چند بار تکان داده شود تا نمونه مدفوع با بافر استخراج موجود در لوله به خوبی مخلوط گردد.
- این ظرف توسط بهوزر یا مراقب سلامت تحويل گرفته می‌شود.
- نمونه آماده شده را می‌توان تا ۶ ماه در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد.

شیوه انجام آزمایش توسط بهوزر یا مراقب سلامت

- قبل از انجام آزمایش لازم است دمای کاست تست، لوله جمعکننده نمونه و نمونه مورد آزمایش و یا نمونه کنترل به دمای اتفاق ۱۵ تا ۳ درجه سانتی‌گراد) برسد.
- نکته: بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شود که سنجش تا ۶ ساعت بعد از نمونه‌گیری انجام شود.



- کاست تست از بسته بندی خارج گردد.
- توسط بهوزر یا مراقب سلامت، زائده سر ظرف پلاستیکی شکسته شده و از مایع داخل ظرف ۲ قطره (حدود ۱۳۰ مل) بر روی چاهک کاست چکانده شود.
- در این زمان، باید تایمر روشن شود و بعد از ۵ دقیقه باید کیت مورد نظر بررسی شود. در صورتی که کیت بعد از ۱۰ دقیقه بررسی شود، ارزشی نخواهد داشت.




مراحل انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع

تفسیر نتایج آزمایش توسط بهوزر یا مراقب سلامت

- نتایج کیت مورد نظر ممکن است یکی از ۳ حالت زیر را داشته باشد:

- اگر علامت به صورت دو خط در کنار حروف C و T باشد (مانند بخش A شکل زیر)، یعنی نتیجه تست مثبت است.
- در صورتی که علامت به صورت یک خط در کنار حرف C باشد (مانند بخش B شکل زیر)، یعنی نتیجه تست منفی است.
- در صورتی که علامت به صورت یک خط در کنار حرف T باشد (مانند بخش C شکل زیر)، یعنی نتیجه تست نامعتبر است و باید این تست مجدد انجام شود.



تفسیر نتایج آزمایش FIT

- شدت رنگ در ناحیه تست (T) با توجه به غلظت خون (هموگلوبین انسانی) موجود در نمونه متفاوت است، بنابراین وجود هاله‌ای از رنگ نیز در این منطقه مثبت تلقی می‌شود.

کنترل کیفیت

- ظهور خط رنگی در ناحیه (C) کنترل داخلی این تست است. تشکیل این خط رنگی نشان دهنده حجم مناسب نمونه، حرکت صحیح نمونه بر روی غشا و صحت انجام تست است.
- کنترل‌های استاندارد به همراه تست فراهم شده است. توصیه می‌شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن به صورت ادواری از یک نمونه کنترل مثبت و یک نمونه کنترل منفی استفاده شود.
- نمونه کنترل باید در یخچال نگهداری شود. در این صورت نمونه برای مدت یک ماه پایدار است.

موارد احتیاط

- پیش از تحويل لوله جمع‌آوری نمونه، بر چسب روی آن نام و نام خانوادگی مراجعه کننده و تاریخ تحويل ظرف با استفاده از خودکار یا مازیک درج گردیده و به مراجعه کننده داده شود.
- به مراجعه کنندگان یادآوری شود که نمونه تهیه شده در کوتاه‌ترین زمان برای آزمایش تحويل گردد.
- به محض دریافت نمونه، مشخصات بیمار در لیست ارائه شده در قالب این برنامه درج گردد.
- حداقل زمان نگهداری نمونه جمع‌آوری شده در ظرف نمونه‌گیری ۴۸ ساعت در دمای اتاق است، لذا آزمون باید ظرف این مدت انجام شده باشد. در غیر اینصورت وجود خون (هموگلوبین) در مقادیر پایین ممکن است به درستی تشخیص داده نشود. بنابراین اگر به هر علت انجام آزمایش به تأخیر بیفتند، لازم است نمونه‌ها در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود. حداقل مدت زمان نگهداری در یخچال تا ۴ روز است.
- از کیت بعد از گذشتن تاریخ مصرف مندرج در روی بسته‌بندی، استفاده نشود.
- کیت سنجش تا هنگام استفاده باید در بسته‌بندی نگهداری شود.
- ماده جاذب رطوبت باید در بسته‌بندی کاست وجود داشته باشد؛ در غیراین صورت از آن کاست برای انجام آزمایش استفاده نشود.
- تمام نمونه‌ها باید عفونی در نظر گرفته شود و کلیه اصول ایمنی جهت جابه جایی، استفاده و حذف آنها رعایت شود.

اصول ایمنی در انجام آزمایش‌های تشخیص سریع

از آنجاکه تماس با خون، محصولات خونی، ادرار و سایر نمونه‌های جدا شده از انسان بالقوه خطرناک است، باید به رعایت اصول ایمنی به منظور حفظ ایمنی فرد انجام دهنده آزمایش و مراجعه کننده، محیط زیست و سایر افراد در هنگام انجام آزمایش توجه گردد.



به همین منظور انجام دهنگان آزمایش مسئول تمامی موارد زیر می‌باشند:

- تامین اینمی خود، همکاران، خانواده و محیط زیست
- مطالعه تمامی دستورالعمل‌های لازم در زمینه اصول حفاظت و پیشگیری کارکنان
- شرکت در برنامه‌های آموزشی مرتبط
- رعایت اصول اینمی در حین کار
- استفاده از وسایل حفاظت فردی
- گزارش حوادث به مسئول موفق و ثبت آن
- نکات اینمی باید در تمام مراحل قبل از انجام آزمایش (جمع‌آوری نمونه، آماده‌سازی و انتقال نمونه)، حین انجام آزمایش و همچنین بعد از انجام آزمایش (هنگام دور ریز باقیمانده نمونه و مواد و وسایل مصرفی) رعایت گردد.
- توجه: به طور کلی و به عنوان احتیاط عمومی واستاندارد باید تمام نمونه‌ها را عفونی فرض کنید.

عادات کاری اینم

- قبل و بعد از انجام نمونه‌گیری از هر فرد، دست‌ها شسته شوند.
- از دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده شود. برای مراجعه‌کننده بعدی دستکش تعویض گردد.
- در صورت امکان روپوش یا گان پوشیده شود.
- مواد عفونی یا اشیا تیز و برنده بلا فاصله طبق روش استاندارد دفع شوند.
- خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در محل انجام آزمون اکیداً منوع است.
- مواد غذایی نباید در یخچال نگهداری نمونه‌ها یا محل انجام آزمون نگهداری شوند.
- فضای کار منظم و پاکیزه نگهداشته شود.
 - * از بهم ریختگی پرهیز نموده و محیط پاکیزه نگهداشته شود.
 - * هر روز سطوح کاری آلودگی زدایی شود.
 - * از تردد غیر ضروری در زمان انجام آزمایش جلوگیری شود.
 - * مواد، کیت‌ها و ابزار کار در محلی امن و اینم نگهداری شوند.
- احتیاطات زیر برای جلوگیری از فرو رفتن تصادفی لانست / سوزن به عمل آید.
 - * اشیاء تیز و برنده استفاده شده، جهت دفع در ظروف اینم (Safety Box) قرار گیرد.
 - * لانست، سرنگ و سوزن مصرف شده بدون گداشتن سرپوش باید در ظروف اینم دفع گردد. از خم کردن یا شکستن آنها خودداری شود.
 - * از تکان دادن ظروف حاوی اشیای برنده و تیز برای بدست آوردن فضای بیشتر خودداری شود.
 - * هرگز سوزن، لانست و سایر اشیاء تیز و برنده در سطل زباله عادی محل کار انداخته نشوند.

قوانين کار با اشیاء تیز و برنده

- مصرف کننده / انجام دهنده، مسئول دفع این اشیاء تیز و برنده است.
- بلا فاصله بعد از انجام هر آزمایش دفع این ایمن صورت پذیرد.
- اشیاء تیز و برنده در ظروف مخصوص قرار داده شوند.
- اشیاء تیز و برنده روی سطوح محل کار یا در سطل زباله قرار نگیرند.
- ظروف دفع مخصوص اشیاء تیز نزدیک محل انجام آزمایش قرار داشته باشند.
- وقتی ۳ ظرفیت آن پرش درب آن را بسته و مطابق دستورالعمل دفع زباله‌های عفونی امحاء شوند.

آلودگی زدایی با استفاده از محلول‌های سفیدکننده خانگی

محلول توصیه شده برای آلودگی زدایی هیپوکلریت سدیم (وایتکس) می‌باشد لذا وجود محلول ۱۰٪ سفیدکننده خانگی در محل انجام آزمایش ضروری است.

باید به این نکته توجه داشت که در شرایط مختلف و بسته به اهداف آنها لازم است، از رقت‌های مختلف آن استفاده نمود:

ریختن مایعات	ضد عفونی در شرایط معمول
10% (1 part + 9 parts)	1% (1 part + 99 parts)

ریختن یا پاشیدن مواد آلوده

- دستکش یکبار مصرف تمیز پوشیده شود.
- هر نوع آلودگی پوست با خون سریعاً و به صورت کامل شسته شود.
- ریختن مایعات به مقدار زیاد- مقداری پنبه یا دستمال کاغذی روی مایع پخش شده قرار داده و محلول سفیدکننده خانگی به رقت ۱۰٪ روی آن ریخته شود.
- ریختن مایعات به حجم اندک- با دستمال یا پنبه آغشته به محلول سفیدکننده با رقت ۱۰٪ ضد عفونی شود.
- دستمال‌های آلوده در ظروف ایمن قرار گیرد.

در صورت بروز هرگونه رخداد باید به موارد زیر توجه گردد:

۱- چه نوع حادثه‌ای اتفاق افتاده است؟

- آسیب به انجام دهنده آزمایش: فرورفتن سوزن، ...
- آلودگی محیط: ریختن یا پاشیدن مایعات عفونی یا غیر عفونی
- آسیب به ابزار کار



۲- چه باید کرد؟


- الف- به مقام مأفوّق (سوپرووایزر یا پزشک مرکز) اطلاع داده شود.
- ب- ارزیابی حادثه و واکنش مناسب انجام گردد.
- ج- حادثه و واکنش انجام شده پس از آن، در فرم یا دفاتر مربوطه ثبت گردد.
- د- پایش وضعیت انجام گیرد.

پیوست ۲

دستورالعمل آمادگی کولونوسکوپی

کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوپی روشی برای تشخیص زورس پولیپ و سرطان روده بزرگ است. طی کولونوسکوپی، لوله‌ای انعطاف‌پذیر وارد روده شده و پزشک با دوربین فیلمبرداری ریزی که در نوک لوله وجود دارد، داخل روده بزرگ را مشاهده می‌کند. در صورت لزوم، پزشک می‌تواند پولیپ‌ها را در زمان کولونوسکوپی خارج نموده و یا نمونه‌های بافتی (بیوپسی) تهیه کند. پولیپ‌ها در صورتی که برداشته نشوند، احتمال تبدیل شدن به بدخیمی را دارند.



آمادگی پیش از کولونوسکوپی

به منظور ارزیابی کامل در زمان کولونوسکوپی، لازم است روده بزرگ به اندازه کافی تمیز و تخلیه شده باشد تا امکان بررسی هر نوع ضایعه مقدور باشد. از این رو با رعایت رژیم غذایی و دارویی مناسب می‌توان به تشخیص دقیق کمک نمود. رژیم دارویی شامل ترکیبات ملین و مسهل به منظور تسهیل در دفع و تخلیه کامل روده است.

دستورالعمل زیر جهت آمادگی برای کولونوسکوپی ارائه گردیده است. توجه داشته باشید که صرفاً در این خصوص می‌توانید از دستورالعمل آمادگی که توسط پزشک متخصص همکار برنامه در سطح دانشگاه پیشنهاد می‌گردد نیز استفاده نمایید.



رزیم غذایی پیش از کولونوسکوپی

- از ۳ روز قبل از کولونوسکوپی غذاهای حاوی فیبر بالا نظیر ذرت بو داده (پفیلا)، نان سبوس دار، آجیل و سبزیجات و میوه خام مصرف نمایید.
- روز قبل از کولونوسکوپی به هیچ عنوان غذای جامد و سوب سفت مصرف نکنید.
- روز قبل از کولونوسکوپی آب فراوان (۱۶ تا ۲۰ لیوان در روز) و مایعات مانند چای کم رنگ، آب گوشت، آب مرغ و آب کمپوت صاف شده و آب سوب کاملاً صاف شده مصرف کنید.
- شربت عسل و شربت شیره رقیق شده را می‌توانید مصرف نمایید.
- آب میوه بدون تفاله مانند آب سیب و آب انگور سفید را می‌توانید مصرف نمایید. آب پرتقال، آب انگور سیاه، آب هویج و آب انار که حاوی رنگدانه هستند را مصرف نکنید.
- لبنیات (شیر و ماست) و نوشابه مصرف نکنید.
- از مصرف مایعات قرمز رنگ به دلیل اینکه ممکن است در طول کولونوسکوپی با خون اشتباه گرفته شوند، خودداری کنید.
- حداقل ۶ ساعت قبل از کولونوسکوپی هیچگونه غذا و یا مایعات مصرف نشود.

داروهای مصرفی مورد نیاز پیش از کولونوسکوپی

کاربرد	دوز	دارو
ملین جهت رفع بیوست و تخلیه روده و رکتوم	یک عدد (۲ عدد برای افراد دارای بیوست مزمن)	شربت سناگراف
شستشوی کامل روده با پلی‌اتیلن گلابیکول و الکتروولیت‌های اضافی	۶ بسته	پودر پیدرولاکس PEG
چربنمودن مقعد	۱ عدد	(Zinc Oxide) پماد اکسید زینک

شیوه مصرف داروها

▪ نحوه مصرف شربت سناگراف

- روز قبل از مراجعه بعد از صرف ناهار سبک ۱ عدد شربت سناگراف را به فاصله دو ساعت میل نمایید.
- مراجعینی که بیوست مزمن دارند ۲ عدد شربت سناگراف تهیه نموده و به فاصله چهار الی پنج ساعت آن را میل نمایند.

▪ نحوه مصرف پودر پیدرولاکس

- روز قبل از مراجعه ۴ بسته پودر پیدرولاکس را داخل ۱۶ لیوان آب حل نمایید (برای خوش طعم شدن مقدار مختصری شکر و آب لیموی تازه اضافه نمایید). هر ۳۰ دقیقه یک لیوان میل کنید تا تمام شود.
- روز مراجعه ۲ عدد پودر پیدرولاکس را داخل ۸ لیوان آب حل کرده و از ساعت ۷/۳۰ صبح هر ۳۰ دقیقه میل کنید تا تمام شود. از ساعت ۹ صبح ناشتا باشید و در زمان تعیین شده مراجعه کنید.
- بهتر است محلول تهیه شده را در یخچال بگذارید.
- برای آمادگی بهتر، در فواصل مصرف راه بروید.

نحوه مصرف پماد اکسید زینک

- ۰ در طول آمادگی مرتب مقعد خود را با پماد چرب نمایید.

دارو دستورالعمل مصرف دارو

روز انجام کولونوسکوپی		روز قبل از انجام کولونوسکوپی		دارو
نحوه مصرف	تعداد	نحوه مصرف	تعداد	
-	-	بعد از صرف ناهار سبک ۱ عدد شربت سنا گراف را به فاصله دو ساعت میل نمایید. در صورت پیوست مزمن دو عدد به فاصله چهار الی پنج ساعت میل کنید.	۱-۲ عدد	شربت سنا گراف
داخل ۸ لیوان آب حل کرده و در ساعتهای ۷/۳۰ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر هر نیم ساعت یک لیوان میل کنید.	۲ بسته	داخل ۱۶ لیوان آب حل کرده و در ساعتهای ۲ بعد از ظهر الی ۱۰ شب، هر ۳ دقیقه یک لیوان میل کنید.	۴ بسته	پودر پیدرولاکس PEG
در طول آمادگی مرتب مقعد خود را با پماد چرب کنید.			۱ عدد	پماد اکسید زینک (Zinc Oxide)

ملاحظات مربوط به مصرف داروهای مصرفی قبلی بیمار

- ۰ از یک هفته قبل از کولونوسکوپی داروهای مسکن (مانند ایبوپروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن، ایندومتاسین و مفnamیک اسید) مصرف نکنید و در صورت لزوم برای تسکین درد از استامینوفن استفاده نمایید.

- ۰ آسپرین و یا کلوبیدوگرل رادر صورتی که برای پیشگیری اولیه (پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی) مصرف می‌نمایید، از ۵ روز قبل از کولونوسکوپی قطع نمایید اما اگر برای پیشگیری ثانویه (بعد از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی) مصرف می‌نمایید، مصرف آن ادامه یابد. اگر مصرف دارو را پیش از کولونوسکوپی قطع کرده‌اید، یک روز بعد از انجام کولونوسکوپی می‌توانید مصرف آنها را مجدد شروع کنید.

- ۰ در صورت نیاز به برداشتن پولیپ (سابقه فامیلی، سن بالای ۵۰ سال و ...)، مصرف داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، Plavix، Osvix با نظر پزشک معالج قلب و عروق از چند روز قبل از قطع و آزمایش انعقاد پلاکت PTT-INP-PT همراه شما باشد.

- ۰ در صورتی که داروهای دیابت مصرف می‌کنید، در زمینه نحوه مصرف داروهای دیابت قبل از انجام کولونوسکوپی با پزشک خود مشورت نمایید.

- ۰ مکمل‌های حاوی آهن و ویتامین E، ویتامین C و کلسیم را از ۵ روز قبل از کولونوسکوپی مصرف نکنید.



موارد دیگری که باید در مورد کولونوسکوپی بدانیم

- از ۴ روز قبل از کولونوسکوپی پیاده روی داشته باشد. داشتن تحرک به تخلیه بهتر روده کمک می‌کند.
در صورت داشتن سابقه بیوست مزمن یا عدم توانایی بیماران مسن برای پیاده روی، مصرف مایعات باید از شش روز قبل از کولونوسکوپی شروع شود.
- در صورت داشتن بیماری قلبی عروقی، دیابت، بیماری‌های کبدی، انواع هپاتیت، ایدز و بیماری‌های کلیوی قبل از تعیین نوبت کولونوسکوپی پزشک خود را مطلع نماید.
- در صورت داشتن حالت تهوع مصرف داروها را ادامه دهید و در صورت استفراغ مکرر با پزشک خود مشورت کنید.
- توجه داشته باشید قبل از انجام کولونوسکوپی محتویات روده باید کاملاً شفاف و آبکی شود و شبیه اسهال آبکی با حجم زیاد و تعداد دفعات بالا گردد.
- شب قبل از مراجعه استحمام کنید.
- از آوردن کلیه فلزات (طلاء، ساعت و....) و دندان مصنوعی خودداری کنید.
- حین انجام کولونوسکوپی از داروهای آرام بخش و یا بیهودشی سبک تحت نظر متخصص بیهودشی استفاده می‌گردد تا شما احساس ناراحتی نکنید به همین دلیل حتماً نیاز به یک نفر همراه دارید.

نکات پس از کولونوسکوپی

- بعد از اتمام کولونوسکوپی بیمار به اتاق ریکاوری منتقل شده و با نظر متخصص بیهودشی پس از خروج آنژیوکت مرخص می‌شود.
- بیمارانی که برای آنها اقدامات درمانی (نظیر برداشتن پولیپ و....) انجام شده است، بر حسب نوع اقدام بعمل آمده، می‌بایست تا ۹ ساعت تحت نظر باشند.
- بیمار بعد از هوشیاری کامل می‌تواند از دستشویی استفاده نماید.
- در ۲۴ ساعت اول بعد از کولونوسکوپی، دفع مقدار کم خون طبیعی است ولی در صورتی که دچار خونریزی زیاد، شکم درد بسیار شدید یا نفخ شدید شکم گردید، فوراً به پزشک خود مراجعه نمایید.
- بعد از ترخیص در صورت برطرف شدن درد شکم، مصرف مایعات و سپس رژیم غذایی سبک بلامانع است.

پیوست ۳

ارزیابی نیاز به کولونوسکوپی، ویزیت متخصص و مشاوره ژنتیک

جدول ۳- تصمیم‌گیری در خصوص نیاز به کولونوسکوپی اولیه، شرایط تکرار آن، ویزیت متخصص گوارش و مشاوره ژنتیک

برنامه ارزیابی‌های بعدی	برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی						
	زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۲	سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نوع	
گروه یکم (ردیف ۱ تا ۶)												
(نتیجه تست FIT مثبت، با یا بدون علامت، سابقه فردی مثبت یا منفی، سابقه خانوادگی منفی)												
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (دست کم ۲ سال بعد)	خیر	خیر	خیر	منفی	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۱
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله ^۲ مشروط ^۳	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۲
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	بله مشروط ^۴	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۳
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	بله مشروط ^۵	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۴
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۶	بله	بله	بله	سرطان روڈه بزرگ	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۵
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	خیر	بله	IBD	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	با یا بدون علامت	یکم	مثبت	۶
گروه دوم (ردیف ۷ تا ۱۳)												
(نتیجه تست FIT مثبت، با یا بدون علامت، سابقه فردی مثبت یا منفی، سابقه خانوادگی مثبت)												
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	بله مشروط ^۷	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله مشروط ^۸	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	بله مشروط ^۹	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	بله مشروط ^{۱۰}	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^{۱۱}	بله مشروط ^{۱۱}	بله	بله	سرطان روڈه بزرگ	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله مشروط ^{۱۲}	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	پولیپ پر خطر	پولیپ پر خطر	منفی	منفی	با یا بدون علامت	منثبت	دوم



برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی						
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	مشاوره گوارش	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۲	ساقیه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	بله	خیر	منفی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۳		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۴		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۵		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۶		
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۷		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۸		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی)	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۱۹		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۰		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۱		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۲		
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۳		

برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۲	سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نوع		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده دو درجه	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۴		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی)	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۵		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۶		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۷		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۸		
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۲۹		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سندرم ارثی	ثبت یا منفی	با یا بدون علامت	ثبت	دوم	۳۰		

گروه سوم (ردیف ۳۱ تا ۳۶)

(نتیجه تست FIT منفی، علایم پر خطر، سابقه فردی منفی، سابقه خانوادگی منفی)

بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (دست کم ۲ سال بعد)	خیر	بله	منفی	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۱
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۲
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۳
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	پولیپ پر خطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۴
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۵
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	خیر	بله	IBD	در اولین نوبت	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	سوم	۳۶

گروه چهارم (ردیف ۳۷)

(نتیجه تست FIT منفی، علایم کم خطر، سابقه فردی منفی، سابقه خانوادگی منفی)

پس از ویزیت گوارش	خیر	بله	پس از ویزیت گوارش	پس از ویزیت گوارش	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	چهارم	۳۷
-------------------	-----	-----	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	-------	----



برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی				
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۱	سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره	
گروه پنجم (ردیف ۳۸ تا ۴۳)											
(نتیجه تست FIT منفی، علایم کم خطر یا پرخطر، سابقه فردی مثبت، سابقه خانوادگی منفی)											
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (دست کم ۲ سال بعد)	خیر	خیر	منفی	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۳۸
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بولیپ معمولی	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۳۹
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	بولیپ کم خطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۴۰
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	بولیپ پرخطر	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۴۱
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۴۲
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۸ تا ۱۵ سال بعد)	خیر	بله	IBD	در اولین نوبت	منفی	منفی	مثبت	کم خطر یا پرخطر	منفی	پنجم	۴۳
گروه ششم (ردیف ۴۴ تا ۵۱)											
(نتیجه تست FIT منفی، علایم کم خطر یا پرخطر، سابقه فردی مثبت یا منفی، سابقه خانوادگی مثبت)											
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۴
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بولیپ معمولی	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۵
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	بولیپ کم خطر	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۶
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	بولیپ پرخطر	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۷
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۸
سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	پولیپ پرخطر	پولیپ	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۴۹
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۰
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بولیپ معمولی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	مثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۱

برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	مشاوره گوارش	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۱	ساقیه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۲	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	بله	پولیپ پرخطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۳	
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۴	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۵	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی)	بله	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۶	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بله	پولیپ معمولی	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۷	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	بله	پولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۸	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	بله	پولیپ پرخطر	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۵۹	
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	بله	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۰	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۱	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی)	بله	بله	بله	منفی	در اولین نوبت	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۱	



برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۲	سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره		
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	بولیپ معمولی	در اولین نوبت	سندرم ارشی	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۳	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	بله	بله	بولیپ کم خطر	در اولین نوبت	سندرم ارشی	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۴	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	بله	بله	بولیپ پرخطر	در اولین نوبت	سندرم ارشی	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۵	
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۳	بله	بله	سرطان روده بزرگ	در اولین نوبت	سندرم ارشی	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۶	
۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	بله	بله	IBD	در اولین نوبت	سندرم ارشی	سندرم ارشی	ثبت یا منفی	کم خطر یا پرخطر	منفی	ششم	۶۷	

گروه هفتم (ردیف ۶۸ تا ۷۲)

(نتیجه تست FIT منفی، بدون علامت، سابقه فردی مثبت ، سابقه خانوادگی منفی)

بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	۵ تا ۱۰ سال بعد از کولونوسکوپی قبلی	منفی	بولیپ معمولی	بدون علامت	منفی	هفتم	۶۸
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	۳ تا ۵ سال بعد از کولونوسکوپی قبلی	منفی	بولیپ کم خطر	بدون علامت	منفی	هفتم	۶۹
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	۱ تا ۳ سال بعد از کولونوسکوپی قبلی	منفی	بولیپ پرخطر	بدون علامت	منفی	هفتم	۷۰
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	۶ ماه تا ۳ سال بعد از کولونوسکوپی قبلی ^۳	منفی	سرطان روده بزرگ	بدون علامت	منفی	هفتم	۷۱
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۸ تا ۱۰ سال بعد از شروع بیماری	منفی	IBD	بدون علامت	منفی	هفتم	۷۲

گروه هشتم (ردیف ۷۳ تا ۹۶)

(نتیجه تست FIT منفی، بدون علامت، سابقه فردی مثبت یا منفی، سابقه خانوادگی مثبت)

بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	درس جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و نه دیرتر از ۴۰ سالگی	پرخطر	منفی	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۳
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی مشروط ^۲	بله	بله	-	درس جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد	پرخطر	بولیپ معمولی	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۴

برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	مشروطه ^۲	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۱	ساقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	مشروطه ^۲	بله	-	در سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد	پولیپ پرخرطر	پولیپ پرخرطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۵	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	مشروطه ^۲	بله	-	در سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد	پولیپ پرخرطر	پولیپ پرخرطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۶	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	مشروطه ^۲	بله	-	حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد	پولیپ پرخرطر	سرطان روده بزرگ	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۷	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	مشروطه ^۲	بله	-	در سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده و نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد	پولیپ پرخرطر	IBD	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۸	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	منفی	بدون علامت	منفی	هشتم	۷۹	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۵ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	پولیپ معمولی	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۰	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	کم خطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۱	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۱ تا ۳ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	پولیپ پرخرطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۲	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۳	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه یک	IBD	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۴	



برنامه ارزیابی‌های بعدی		برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	مشاوره گوارش	ویزیت گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه ^۱	ساقمه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه	نمره	
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	منفی	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۵		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	پولیپ معمولی	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۶		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	پولیپ کم خطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۷		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	پولیپ پخرطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۸		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	بدون علامت	منفی	هشتم	۸۹		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۵۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	سرطان روده بزرگ در خانواده درجه دو	IBD	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۰		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی)	سندرم ارشی	منفی	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۱		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۵ تا ۱۰ سال بعد)	سندرم ارشی	پولیپ معمولی	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۲		
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۳ تا ۵ سال بعد)	سندرم ارشی	پولیپ کم خطر	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۳		

برنامه ارزیابی‌های بعدی	برنامه ارزیابی‌های اولیه					معیارهای گروه‌بندی					
	زمان تکرار کولونوسکوپی ^۱	مشاوره ژنتیک	مشاوره ویزیت	گوارش	نتیجه کولونوسکوپی اولیه	زمان کولونوسکوپی اولیه	سابقه خانوادگی	سابقه فردی	علایم	FIT	گروه
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۱ تا ۳ سال بعد)	سندرم ارثی	پولیپ پرخر	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۳
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (حداکثر ۶ ماه تا ۳ سال بعد) ^۲	سندرم ارثی	سرطان روءو بزرگ	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۵
بر اساس نتیجه کولونوسکوپی	بله	بله	بله	-	۱۰ سال زودتر از سن جوان‌ترین فرد مبتلا در خانواده (نه دیرتر از ۴۰ سالگی و حداقل ۸ تا ۱۰ سال بعد)	سندرم ارثی	IBD	بدون علامت	منفی	هشتم	۹۶
گروه نهم (ردیف ۹۷)											
(نتیجه تست FIT منفی، بدون علامت، سابقه فردی منفی، سابقه خانوادگی منفی)											
بر اساس ارزیابی بعدی دوره‌ای (دست کم ۲ سال بعد)	خیر	خیر	خیر	-	نیاز ندارد	منفی	منفی	بدون علامت	منفی	نهم	۹۷

۱. در مورد گروههایی که نیازمند کولونوسکوپی اولیه هستند (یک، دو، سه، پنج و شش)، مبنای تصمیم‌گیری برای درخواست مشاوره ژنتیک و زمان ارزیابی (و یا کولونوسکوپی) بعدی، نتایج کولونوسکوپی جدیدی است که در همین ویزیت درخواست و انجام شده است.

در افراد با FIT منفی و بدون علامت، اما با سابقه فردی و یا سابقه خانوادگی مثبت (گروه هفتم و هشتم که در ستون "زمان کولونوسکوپی اولیه"، عبارتی به جز "در اولین نوبت" ذکر شده است)، ممکن است لازم باشد در همین ویزیت و در اولین نوبت، برای تعیین وقت کولونوسکوپی اولیه آنها اقدام گردد. در صورتی که نیاز به انجام کولونوسکوپی در همین ویزیت و در اولین نوبت نباشد، بر اساس سوابق فردی و خانوادگی، یافته‌های کولونوسکوپی قبلی و سن، وقت کولونوسکوپی و در نتیجه زمان ارزیابی بعدی آنها تعیین می‌گردد. در همه شرایط، اگر فردی در زمانی کمتر از ۲ سال آینده نیازمند کولونوسکوپی باشد، نوبت ارزیابی بعدی او نیز همان زمان خواهد بود. در غیر این صورت، حداقل، ۲ سال بعد فراخوان و ارزیابی می‌شود.

۲. مشاوره ژنتیک در صورت وجود شرایط زیر درخواست می‌شود:

- پولیپ هاما روم به تعداد ۲ یا بیشتر

- پولیپ آدنوماتوز به تعداد ۱۰ یا بیشتر

- پولیپ بدون پایه (SSP) به تعداد ۵ یا بیشتر

۳. اگر فردی به تارگی درمان شده است و پیش از جراحی سرطان، کولونوسکوپی نشده باشد، به فاصله ۶ ماه از پایان درمان و اگر پیش از جراحی، کولونوسکوپی شده باشد، در فاصله ۳ سال از پایان درمان، برای کولونوسکوپی ارجاع می‌شود.



پیوست ۶

محتوای آموزشی

سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ایران و میلیون‌ها مورد در جهان رخ می‌دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن بسیار زیاد است.

میزان بروز سالیانه سرطان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بوده است که تا سال ۲۰۴۰ میلادی به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید، همچنین عدد مرگ و میر سالیانه از ۱۰ میلیون نفر در همین مدت به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.

در ایران سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر مبتلا به سرطان می‌شوند که این عدد تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ خورشیدی) با افزایش بیش از ۱۱۵ درصدی به بیش از ۲۹۰ هزار نفر خواهد رسید.

مهمنترین دلایل برای افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از:

- افزایش امید به زندگی و تعداد سالمندان (چراکه بروز سرطان با افزایش سن، افزایش می‌یابد)
- تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری و کم تحرکی
- عوامل محیطی مانند افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی



در حال حاضر با وجودی که عدد خام مرگ و میر ناشی از سرطان‌ها افزایش یافته است اما به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت می‌کنند با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتلا، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافته است. نیمی از افرادی که امروز با تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بیش از ۴۰٪ بعد از ده سال هنوز زندگی می‌کنند. متوسط میزان بقای ده ساله برای سرطان دو برابر ۳۰ سال گذشته شده است.

مهم‌ترین دلیل بهبود در بقای بیماران، علاوه بر درمان‌های موثرتری که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش‌های تشخیص زودهنگام است. حتی برای کسانی که احتمال بهبودی آنها کم است، شанс زنده ماندن در زمان تشخیص زودتر، بیشتر خواهد بود. دو جزء اصلی در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: **تشخیص زودهنگام و غربالگری**.

تفاوت تشخیص زودهنگام و غربالگری


معنای تشخیص زودهنگام این است که ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات سلامتی در سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور، عالیم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابی‌های دوره‌ای، اگر فردی را بررسی کردیم و یا در فواصل بین ارزیابی‌ها اگر فردی با این عالیم مراجعه کرد، آمادگی شناسایی این عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در مرحله بعدی موارد مهم را برای اقدامات تشخیصی کامل‌تر به مراکز سطح بالاتر و مجذوب‌تر معرفی کنیم.

اما معنی غربالگری این است که در افرادی که هیچ علامت هشداردهنده‌ای برای سرطان ندارند اما به دلیل شرایط جنسی (مثل سرطان پستان) یا سنی خاص (مثل سن بالا) بالقوه در معرض سرطان هستند، اقدامات تشخیصی را انجام دهیم. بسیاری از سرطان‌ها تنها با معاینه پزشکی و آزمایش‌های تکمیلی تشخیص داده می‌شوند که از جمله آنها سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ هستند. غربالگری به عنوان بخشی از برنامه تشخیص زودرس است. غربالگری به معنی شناسایی بیماری احتمالی ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایش‌های ساده در فردی است که هنوز علائم ندارد. در یک برنامه ملی مدیریت سرطان، بعد از غربالگری، افراد تشخیص داده شده تحت درمان مناسب قرار می‌گیرند.

لازم است هم بیمار و هم ارائه‌دهنگان مراقبت‌های بهداشتی به اهمیت تشخیص زودهنگام از راه آشنایی با عالیم مشکوک سرطان همچنین انجام فعالیت‌های غربالگری سرطان پاییند باشند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتلاف منابع شود. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ (کولورکتال)، پستان و دهانه رحم (سرورویکس)، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به این سرطان‌ها، سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و همچنین ساماندهی نظام ارجاع، درمان و مراقبت بیماران است.

سرطان روده بزرگ

بروز سرطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحله‌ای است و در اثر مجموعه تغییراتی بروز می‌کند که از غشا یا اپی تلیوم طبیعی داخل روده شروع شده و به سمت تکثیر سلول‌های غیرطبیعی می‌رود. در مرحله بعدی زواید قارچ مانندی به نام پولیپ آدنوماتوز اتفاق می‌افتد و سرانجام بدخیمی بروز می‌کند. چون این فرآیند شامل ایجاد تغییرات ژنتیک متعددی است که در طول یک دوره چندساله رخ می‌دهد، برای عوامل مختلف تأثیرگذار باین فرآیند، فرصت‌های زمانی زیادی وجود دارد. علت بروز پولیپ و سرطان بیشتر به دلیل شیوه زندگی نامناسب است که ممکن است در یک زمینه ژنتیکی، تأثیرگذاری آنها بیشتر شود اما برخی بیماری‌های ارشی نیز در درصد اندکی از موارد در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش دارند.



اصول خودمراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ

برای آموزش خودمراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌ها دو اصل مهم باید آموزش داده شود:

۱. راه‌های پیشگیری از سرطان

به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان برخلاف تصور عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری‌اند.

برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ باید بدانیم که علل ایجاد کننده سرطان و راه‌های دوری کردن از آن کدامند؛ همچنین چه عواملی اثر محافظتی در برابر این سرطان دارند. (به ادامه متن توجه فرمایید)

۲. علایم هشدار دهنده سرطان

با شناخت علایم هشدار دهنده سرطان روده بزرگ و مراجعه به موقع به خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشتی می‌توان ضایعات پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان، تشخیص داد.

عوامل خطر سرطان روده بزرگ و پیشگیری از آن

یکی از مهم‌ترین اصول اولیه مبارزه با سرطان روده بزرگ، انجام اقدامات پیشگیرانه است؛ بنابراین لازم است درخصوص عوامل خطر ایجاد کننده این سرطان و راه‌های پیشگیری و کنترل این عوامل، آموزش‌های لازم به بیمار و خانواده وی داده شود.

عوامل خطر سرطان روده بزرگ را می‌توان به دو دستهٔ غیرقابل اصلاح و قابل اصلاح تقسیم کرد. عوامل غیرقابل اصلاح عبارتند از:

◦ افزایش سن

◦ سابقه خانوادگی پولیپ یا سرطان روده بزرگ

◦ بیماری‌های ارثی مانند پولیپ‌های آدنوماتوز فامیلی (Familial Adenomatous Polyposis: FAP)

◦ یا سرطان کولون ارثی بدون پولیپوز (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: HNCC)

بنابراین، باید به افراد آموزش داد که اگر فرد مبتلا به سرطان، به خصوص در خانواده درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان) یا درجه دو (عمه، عمو، خاله، دایی، پدر بزرگ یا مادر بزرگ) دارند، باید توجه بیشتری به علایم خود داشته باشند و به ارزیابی‌های بیشتری از جمله روش‌های غربالگری نیاز دارند. هر چه تعداد فامیل مبتلا بیشتر و سن ابتلای آنها پایین‌تر (به خصوص زیر ۵۰ سال) باشد، میزان خطر بیشتر افزایش می‌یابد.

اما نزدیک به دو سوم افرادی که به سرطان روده بزرگ می‌شوند، هیچ سابقه خانوادگی ندارند و بسیاری از آنها عوامل خطری دارند که می‌توان اصلاح کرد. به این معنی که یا از این عوامل خطر می‌توان دوری کرد و یا اگر مانند بیماری التهابی روده بزرگ، اجتناب ناپذیر باشند، می‌توان با بررسی‌های دقیق پزشکی، از بروز سرطان روده بزرگ در آنها جلوگیری کرد:

• **بیماری التهابی روده (IBD):** شامل کولیت اولسراتیو و بیماری کرون، خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد و میزان خطر با افزایش طول مدت بیماری التهابی روده بزرگ افزایش می‌یابد و معمولاً پس از ده سال از شروع بیماری، به بیشترین میزان خود می‌رسد. با انجام کولونوسکوپی در فواصل مشخص می‌توان در صورت بروز سرطان در این افراد، آن را زودتر تشخیص داد.


• **سابقه فردی پولیپ‌های آدنوماتوز:** در واقع این ضایعات که آدنوم هم نامیده می‌شوند؛ پیش زمینه ایجاد سرطان هستند. هر چند بیشتر آنها هیچ وقت بدخیم نمی‌شوند، اما افرادی که سابقه‌ای از آدنوم‌ها را دارند، در معرض خطر بالاتر سرطان روده بزرگ هستند. برداشتن این پولیپ‌ها با کولونوسکوپ، جلوی ایجاد سرطان را می‌گیرد، اما امکان بروز مجدد پولیپ و حتی سرطان وجود دارد؛ بنابراین باید پس از برداشتن پولیپ، در فواصل منظم کولونوسکوپی تکرار شود.



کولون سالم



کولیت اولسراتیو



بیماری کرون

عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با شیوه زندگی

• **فعالیت بدنی ناکافی:** هر میزان از فعالیت بدنی می‌تواند خطر سرطان روده بزرگ را کم کند. ورزش‌های سنگین مثل دویدن و سبک مثل پیاده روی تند هر دو به سهم خود موثرند، حتی اگر در سنین بالای زندگی شروع شوند. ورزش با روش‌های مختلف از



جمله کاهش وزن، کاهش ماندگاری مواد غذایی زیان آور در دستگاه گوارش، کاهش سطح انسولین خون و در نتیجه کاهش رشد سلول‌های مخاطی روده، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و متابولیسم اسید صفوایی، احتمال سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد.

• **افزایش وزن:** چاقی، به ویژه چاقی دور شکم، یک عامل خطر برای سرطان روده بزرگ محسوب می‌شود. وزن زیاد با سطوح بالاتری از انسولین و دیگر عوامل رشد مرتبط است که ممکن است در رشد سلول‌های روده‌ای، ظهور پولیپ‌های آدنوماتوز و تغییر شکل به بدخیمی دخیل باشند. داشتن وزن متعادل فواید متعددی را برای سلامتی به همراه دارد. به همه باید توصیه کرد که وزنشان را از طریق تعادل در میزان کالری‌های دریافتی و فعالیت بدنی منظم، کنترل نمایند.

• **الک:** حتی اگر روزانه یک بار الکل مصرف شود، خطر سرطان روده بزرگ افزایش می‌یابد و هر چه میزان مصرف بیشتر شود، خطر سرطان روده نیز بیشتر خواهد شد.

• **دخانیات:** مصرف دخانیات از جمله سیگار، خطر پولیپ‌های آدنوماتوز و سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. مواد سرطان‌زا زیادی در دود سیگار وجود دارند که ممکن است روده بزرگ را از طریق سیستم گردش خون تحت تاثیر قرار دهد و منجر به جهش‌های سلولی شوند. از زمان شروع مصرف سیگار تا پدیدار شدن افزایش خطر سرطان روده بزرگ، ممکن است سال‌ها طول بکشد.

• **گوشت قرمز:** دو مسئله در مورد گوشت قرمز می‌تواند بروز سرطان روده بزرگ را زیاد کند. یکی مقدار مصرف گوشت قرمز است و دیگری نحوه پخت آن. افرادی که روزانه بیش از ۹۰ گرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند در مقایسه با مصرف کمتر از ۲۰ گرم در روز، به میزان سی درصد خطر بالاتری برای ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند. بنابراین باید تعادل را در مصرف گوشت قرمز رعایت کرد تا ضمن بهره مندی از فواید آن، از ضررهاش دوری کرد. این میزان برای گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس و کالباس از این هم کمتر است و مصرف بیش از ۵ گرم از این گوشت‌ها خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. یک رژیم غذایی حاوی گوشت قرمز زیاد با تغییر در ترشح اسیدهای صفوایی یا با افزایش غلظت آهن مدفع و تولید رادیکال‌های هیدروکسیل خطر سرطان را افزایش می‌دهد. در مورد نحوه پخت هم، اگر گوشت را در دمای بسیار زیاد آماده کنیم به ویژه در زمان کباب کردن یا درست کردن همبرگر، خطر سرطان بالاتر می‌رود. مواد سرطان‌زا می‌مثل آمین‌های هتروسیکلیک و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای که سرطان را هستند، در طی پخت گوشت در دماهای بالا تولید می‌شوند.

• **صرف کم میوه و سبزیجات:** سبزیجات نه تنها به محافظت در برابر سرطان کمک می‌کنند، بلکه خطر دیگر بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را نیز کاهش می‌دهند. سبزیجاتی مثل کلم بروکلی و گل کلم، اسفناج و کرفس دارای ترکیباتی از جمله آنتی اکسیدان، اسید فولیک و فیبر هستند که می‌توانند خطر سرطان را کاهش دهد. بعضی از داروها از جمله مصرف آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی نیز اثرات محافظتی در برابر ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند.

بنابراین طبق اصول خود مراقبتی، باید به همه افراد حتی افراد با سابقه مثبت خانوادگی، در خصوص عوامل خطر سرطان روده بزرگ و دوری از آنها، آموزش‌های لازم داده شود.

علایم پولیپ و سرطان روده بزرگ و تشخیص زودهنگام آنها

دومین اصل خود مراقبتی، شناخت علایم مشکوک سرطان روده بزرگ و توجه به آنهاست. به هر حال عده‌ای در طی زندگی دچار سرطان روده بزرگ می‌شوند؛ اما همانطور که گفته شد، از آنجایی که ضایعهٔ پیش سرطانی به نام پولیپ، قبل از بروز سرطان در روده رشد می‌کند می‌توان با شناسایی علایم مشکوک پولیپ و یا حتی سرطان در مراحل اولیه، جلوی بروز این بیماری را گرفت و آن را درمان کرد. پس لازم

است در مورد عالیم هشدار دهنده بروز سرطان روده بزرگ و نحوه برخورد و اقدامات اولیه در صورت بروز عالیم به بیمار و اطرافیان وی آموزش‌های لازم داده شود. مهم‌ترین عالیم مشکوک سرطان روده بزرگ عبارتند از:

◦ خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر

◦ بیوست در طی یک ماه اخیر (با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)

◦ کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه همراه با یکی از عالیم فوق

باید به افرادی که در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری شرکت می‌کنند، آموزش داد که اگر در فواصل برنامه‌های تشخیص زودهنگام و غربالگری نیز، این عالیم را داشتنند، زودتر مراجعه کنند. البته در عین حال باید به افراد آموزش داد که بیشتر افرادی که این عالیم را دارند، سرطان ندارند ولی باید بررسی‌های بیشتری انجام دهنند.

شیوه‌های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ

أنواع روش‌ها برای تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ به کار می‌روند که در اینجا فقط به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود از جمله آزمایش خون مخفی در مدفعه به روش ایمونوژنیک (FIT) و کولونوسکوپی. البته باید توجه داشته باشید که در ایران روش توصیه شده برای غربالگری اولیه در سطح شبکه بهداشتی درمانی، همان تست FIT است.

الف. آزمایش خون مخفی در مدفعه به روش ایمونوژنیک (FIT یا IFOBT)

پولیپ و سرطان کولون گاهی خونریزی می‌کنند که سبب ایجاد خون در مدفعه می‌شود، اما این خون آنقدر کم است که با چشم دیده نمی‌شود، بلکه باید با انجام آزمایش آن را تشخیص داد. با آزمایش خون مخفی در مدفعه می‌توان مقادیر ناچیز و نادیدنی خون را در مدفعه شناسایی کرد که به آن تست خون مخفی در مدفعه (FOBT) گفته می‌شود اما یکی از مشکلات این آزمایش این است که اگر در طی روزهای پیش از آزمایش، آسپریین یا مواد غذایی مثل چغندر مصرف کرده باشیم ممکن است تست به صورت کاذب مثبت شود. هم‌چنین این آزمایش را باید سه بار تکرار کرد تا نتیجه مطلوب به دست آید. در عوض تست دیگری وجود دارد به نام تست خون مخفی در مدفعه به روش ایمونوژنیک (IFOBT) که موارد مثبت کاذب در ارتباط با مصرف مواد غذایی و داروها ندارد، چراکه از آنتی‌بادی‌های اختصاصی هموگلوبین انسانی در این تست استفاده شده است که صرفاً به هموگلوبین انسانی به عنوان آنتی‌زن متصل می‌گردد. همچنین نیاز به سه بار تکرار ندارد و به سادگی در خانه بهداشت، مطب و کلینیک قابل انجام است.

ب. کولونوسکوپی

در بین روش‌های مختلف غربالگری، کولونوسکوپی بهترین و مطمئن‌ترین روشی است که اجازه می‌دهد پزشک متخصص، داخل روده بزرگ را به طور کامل و تا آخر بینند. قدرت تشخیصی این روش بسیار بالاست و تقریباً همه پولیپ‌ها و سرطان‌های روده را با کولونوسکوپی می‌توان تشخیص داد اما همانطور که در ادامه توضیح داده می‌شود، انجام کولونوسکوپی آسان نیست بنابراین صرفاً در افراد با عالیم مشکوک و یا دارای پاسخ مثبت آزمایش FIT انجام می‌شود. پس از این که شما فرد مشکوک را مطابق دستورالعمل به پزشک شبکه ارجاع دادید و او نیز تأیید کرد فرد در معرض خطر سرطان روده بزرگ است، این فرد به سطح دو خدمت یعنی بیمارستان‌های عمومی یا مراکز تشخیص زودهنگام سرطان ارجاع داده می‌شود و تحت کولونوسکوپی قرار می‌گیرد. بنابراین اگر این فرد پیش از ارجاع به این مراکز، از شما در مورد کولونوسکوپی سوال کرد، می‌توانید با استفاده از مطالب زیر، اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهید.



برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سلطان روده بزرگ در ایران: سطح یک

در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به سلطان یا ضایعات پیش بدخیم روده بزرگ و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. مشخصات تمامی افراد ۵۰ تا ۶۹ سال که برای ارزیابی فراخوان شده‌اند را در سامانه سیمای سرطان ثبت کنید. در صورتی که سن فردی زیر ۵۰ یا بالای ۶۹ سال باشد یا در هر سنی اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکلات گوارشی مراجعه کند، مشخصات او را نیز ثبت و براساس دستورالعملی که به تفصیل در ابتدای این مستند ذکر شده، بررسی کنید.

برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سلطان روده بزرگ در ایران: سطح دو

۰ افرادی که به هر دلیل به سطح دو ارجاع می‌شوند، تحت ارزیابی‌های کامل‌تر، از جمله ویزیت متخصص و انجام کولونوسکوپی قرار می‌گیرند.

۰ چه کسانی از سطح یک به سطح دو ارجاع می‌شوند؟

* افرادی که دارای علایم مشکوک سلطان روده بزرگ هستند و در ارزیابی‌های اولیه در سطح یک مشکوک تشخیص داده شده‌اند.

* افرادی که سابقه شخصی پولیپ، سلطان یا بیماری التهابی روده بزرگ دارند.

* افرادی که سابقه خانوادگی سلطان یا پولیپ روده بزرگ دارند.


* افرادی که تست خون مخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیک (IFOBT) آن‌ها مثبت است.

اغلب این افراد در صورتی که زمان مناسب برای ارزیابی آن‌ها باشد، کولونوسکوپی می‌شوند. در صورتی که در کولونوسکوپی، پولیپ یافت شود بسته به تعداد آن‌ها در یک یا چند مرحله، برداشته می‌شود و نوبت بررسی بعدی مشخص می‌شود. اگر ضایعه مشکوکی وجود داشت، نمونه برداری و به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می‌شود. در آزمایشگاه نمونه‌ها رنگ آمیزی شده و در زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود و در صورتی که سلول‌های بدخیم در زیر میکروسکوپ دیده شود، فرد برای اقدامات تشخیصی درمانی به سطح سه یعنی بیمارستان تخصصی ارجاع می‌شود.



برنامه تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ در ایران: سطح سه

در سطح سه یا تخصصی که معمولاً یک بیمارستان تخصصی یا یک مرکز سرطان است، ابتدا ارزیابی‌های کامل تری مانند آزمایش خون و CT اسکن انجام می‌شود و در صورتی که درگیری اعضای دور دست مانند کبد و ریه وجود نداشته باشد و تومور در ناحیه انتهای روده بزرگ (راست روده) نباشد، بیمار جراحی و قطعه‌ای از کولون که دارای بد خیمی است برداشته خواهد شد.



اگر تومور در انتهای روده بزرگ باشد، معمولاً ابتدا با پرتو درمانی و شیمی درمانی همزمان درمان، سپس جراحی انجام می‌شود. منظور از پرتو درمانی تاباندن پرتوهای یونیزان به بخشی از بدن است که دارای تومور بد خیم است تا این تومور از بین برود. در بیشتر موارد پس از انجام جراحی و در موقعی که تومور از دیواره روده بزرگ خارج شده باشد یا غدد لنفاوی را درگیر کرده باشد، شیمی درمانی نیز انجام می‌شود. منظور از شیمی درمانی، استفاده از داروهای خاص برای از بین بردن سلول‌های بد خیمی است که از تومور اولیه جدا شده وارد خون شده‌اند.



پس از پایان درمان‌ها، بیمار به فواصل هر ۳ تا ۶ ماه با آزمایش خون پیگیری می‌شود و با فاصله‌های طولانی تر و در صورت لزوم CT اسکن و کولونوسکوپی انجام خواهد شد تا اگر در این بررسی‌ها، نشانه‌هایی از عود وجود داشت، درمان لازم انجام شود.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان

PDF Compressor Free Version

دستورالعمل برنامه ملی
تشخیص زودهنگام

سرطان روده بزرگ

۹۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعاونیت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان



دستورالعمل برنامه ملی
تشخیص زودهنگام

سرطان دهانه رحم





در این برنامه، هدف شناسایی و ثبت افراد در معرض خطر یا مبتلا به سرطان دهانه رحم^۱ و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی و ساماندهی درمان و مراقبت افراد شناسایی شده است.



در این دستورالعمل مراحل اجرایی برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم و غربالگری سرطان دهانه رحم با استفاده از آزمایش تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی HPV^۲ شرح داده شده است. همچنین در این دستورالعمل راهنمای لازم برای بهورز/مراقب سلامت، ماما و پزشک متخصص زنان و نیز مدیریت برنامه توسط مدیر برنامه در سطح دانشگاه و ناظر برنامه در سطح شهرستان ارائه گردیده است.

1. Cervical Cancer
2. Human Papillomavirus

دستورالعمل ویژه بهورز / مراقب سلامت

بر اساس این دستورالعمل، وظایف بهورز / مراقب سلامت شامل موارد زیر است:

- ۱- فرخوان و ثبت
- ۲- تصمیم‌گیری و اقدام
- ۳- پیگیری و مراقبت بیماران

فرخوان و ثبت

پیش از هر اقدامی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

- زنان در گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال، فرخوان شده و مشخصات آنها در سامانه ثبت گردد.
- در صورتی که سن زنی زیر ۳۰ یا بالای ۵۹ سال باشد، یا در هر سنی اما در فواصل بین ارزیابی‌های معمول (هر ۲ سال یک بار) و بدليل خونریزی غیر طبیعی واژینال (از جمله پس از نزدیکی جنسی، در فواصل دوره‌های قاعده‌گی و پس از یائسگی)، ترشحات بدبوی واژینال، درد هنگام نزدیکی جنسی مراجعه کند، مشخصات او نیز ثبت گردد. در این افراد تمامی ارزیابی‌ها مطابق دستورالعمل انجام می‌شود.

تصمیم‌گیری و اقدام

در همه موارد:

- آموزش‌های خود مراقبتی لازم از جمله در خصوص عوامل خطر سلطان دهانه رحم و راه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام و نیز غربالگری سلطان دهانه رحم داده شود (پیوست ۴).
- در صورتی که مراقب سلامت در مرکز مربوطه، مامای آموزش دیده برنامه تشخیص زودهنگام سلطان است و مسئولیت فرخوان و ثبت را به عهده دارد، بیمار را از نظر عالیم سه گانه، سوابق و نیاز به غربالگری با تست HPV ارزیابی نموده و اقدامات بعدی را طبق بخش دستورالعمل ویژه ماما که در ادامه توضیح داده شده است، انجام می‌دهد.
- در صورتی که بهورز / مراقب سلامت، مامای دوره دیده نباشد، در مرکز مربوطه مسئولیت فرخوان و ثبت را به عهده دارد و فرد را به مامای سطح شبکه بهداشت (مرکز خدمات جامع سلامت) جهت شرح حال و معاینه بالینی و همچنین نمونه برداری از دهانه رحم جهت آزمایش غربالگری HPV، ارجاع می‌دهد.


پیگیری و مراقبت بیماران

لازم است افرادی که به ماما ارجاع می‌شوند، برای پیگیری مطابق بازخوردی که از ماما دریافت می‌شود، به صورت دوره‌ای ارزیابی شوند.



فلوچارت ۱- فرایند پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم

فراخوان و ارزیابی دوره‌ای یا بعدی زنان ۳۰ تا ۵۹ سال



دستورالعمل ویژه مامای شبکه

افرادی که هنگام ارزیابی اولیه در گروه هدف برنامه قرار دارند، توسط کارشناس مراقب سلامت یا بهورز، به مامای دوره دیده مرکز خدمات جامع سلامت معرفی شده‌اند. به طور کلی وظیفه مامای دوره دیده در این دستورالعمل از یک سوت‌ تشخیص زودهنگام سلطان دهانه رحم و از سوی دیگر انجام نمونه برداری برای آزمایش غربالگری HPV است. توجه داشته باشید که در هر برنامه گروه هدف و افراد مشمول برنامه، ویژه آن برنامه است. به منظور تشخیص زودهنگام سلطان دهانه رحم، وظیفه ماما این است که با شرح حال دقیق و ارزیابی عالیم بالینی، گرفتن سوابق فرد و در صورت نیاز معاينه بالینی دهانه رحم (سرویکس)^۱ موارد مشکوک را به درستی جدا کند و موارد غیر مشکوک را برای برنامه ریزی جهت ارزیابی دوره‌ای به بهورز/ مراقب سلامت پرگرداند. همچنین براساس دستورالعمل آزمایش غربالگری HPV از افراد واجد شرایط (سن ۳۰ تا ۴۹ سال و هر ده سال یکبار) نمونه برداری انجام داده و برای انجام آزمایش تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به آزمایشگاه مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت ارجاع نماید.

براساس این دستورالعمل، وظایف ماما دوره دیده شامل موارد زیر است:

۱. ارزیابی اولیه
۲. طبقه‌بندی
۳. مراقبت و پیگیری

ارزیابی اولیه

ارزیابی بیمار توسط ماما شامل موارد زیر است:

- شرح حال و عالیم سه‌گانه
- سوابق فردی سلطان یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم
- شرایط غربالگری HPV

شرح حال و عالیم سه‌گانه

عالیم و نشانه‌های بالینی که غیر طبیعی تلقی می‌شوند عبارتند از:

- خونریزی غیر طبیعی واژینال (از جمله پس از نزدیکی جنسی، در فواصل دوره‌های قاعدگی و پس از یائسگی)
- ترشحات بدبوی واژینال
- درد هنگام نزدیکی جنسی

این عالیم به عنوان عالیم سه‌گانه ارزیابی اولیه در این دستورالعمل شناخته شده و لازم است در سامانه ثبت شوند.



سوابق فردی سرطان دهانه رحم یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم

- با پرسش از فرد و نیز بررسی مدارکی که ممکن است همراه فرد باشد، سوابق را ارزیابی و نتیجه را در سامانه ثبت نمایید:
- آیا سابقه فردی سرطان یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم را داشته‌اید؟

◦ بیمار در صورت داشتن سابقه سرطان دهانه رحم، دست کم یکی از اقدامات جراحی، رادیوتراپی یا شیمی درمانی را انجام داده است.

◦ بیمار در صورت داشتن سابقه ضایعات پیش بدخیم، معمولاً بررسی‌های کامل‌تر مانند کولپوسکوپی را انجام داده است.

- نوع ضایعه تشخیص داده شده را مشخص نمایید.

Squamous intraepithelial lesion (SIL) ◦

: Grades *

Low grade SIL (LSIL)(CIN1) -

High grade SIL (HSIL)(CIN 2/3) -

Cervical glandular intraepithelial neoplasia (HG CGIN) ◦

Stratified mucin-producing intraepithelial lesion (SMILE) ◦

Other possible precursor lesions ◦

Adenocarcinoma in situ of gastric type -

Lobular endocervical glandular hyperplasia -

Atypical lobular endocervical glandular hyperplasia -

Others -

- آیا آزمایش غربالگری HPV داشته‌اید؟ نوع عفونت HPV در آخرین آزمایش را مشخص نمایید.

HPV-16 ◦

HPV-18 ◦

Other High Risk-HPV ◦

Other Low Risk-HPV ◦

- آیا آزمایش پاپ اسمر داشته‌اید؟ نوع موارد غیر طبیعی در آخرین آزمایش را مشخص نمایید.

ASCUS ◦

AGUS ◦

LSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion) ◦

HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion) ◦

Unsatisfactory / insufficient ◦

Inflammation or infection ◦

شرایط غربالگری HPV

زنان با شرایط زیر مشمول برنامه غربالگری HPV می‌باشند.

- در فاصله سنی ۳۰ تا ۴۹ سال باشند.
- حداقل سه سال از رابطه جنسی آنها گذشته باشد.
- تاکنون تست پاپ اسمایر انجام نداده باشند یا از تست پاپ اسمایر به تنها یکی با نتیجه طبیعی، بیش از یکسال گذشته باشد.
- تاکنون آزمایش غربالگری HPV انجام نداده باشند یا ده سال و بیشتر از آزمایش غربالگری HPV آنان گذشته باشد.

طبقه‌بندی

در این مرحله برای سهولت در تصمیم‌گیری، لازم است بیماران را بر اساس ارزیابی‌هایی که در بخش پیشین ذکر شد با حالت‌های ذکر شده در زیر طبقه‌بندی کرد.

• شرح حال و علایم سه گانه

- همه منفی
- همه و یا هر یک مثبت

• سابقه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم

- منفی (ندارد)
- مثبت (دارد)

• شرایط غربالگری HPV

- ندارد
- دارد

به این ترتیب بیماران بر اساس نتایج شرح حال و علایم سه گانه، سوابق و شرایط غربالگری HPV به گروه‌های مطابق جدول ۱ طبقه‌بندی می‌شوند.



جدول ۱- گروه‌بندی بیماران براساس ارزیابی اولیه (شرح حال و علایم سه گانه، سوابق بالینی و شرایط غربالگری)

شرایط آزمایش غربالگری HPV	سابقه سرطان یا ضایعات پیش‌بدخیم دهانه رحم	شرح حال و علایم سه گانه	گروه
ندارد	منفی یا مثبت	همه منفی	یکم
دارد	منفی یا مثبت	همه منفی	دوم
ندارد	منفی	همه و یا هر یک مثبت	سوم
دارد	منفی	همه و یا هر یک مثبت	چهارم
ندارد یا دارد	منفی	همه و یا هر یک مثبت	پنجم
ندارد یا دارد	مثبت	همه و یا هر یک مثبت	ششم

گروه‌بندی افراد تعیین کننده اقدامات بعدی ماما در ویزیت اول و نیاز به انجام ارزیابی‌های تکمیلی و انجام غربالگری و یا ارجاع برای کولپوسکوپی و ویزیت متخصص زنان است که در ادامه و در بخش تعیین سیر مراقبت به آن پرداخته می‌شود.

مراقبت و پیگیری

پس از ارزیابی و طبقه‌بندی افراد، مراقبت از بیمار آغاز می‌شود که شامل مراحل زیر است:

مراقبت

- معاینه بالینی لگن و شکم
- درمان دارویی
- نمونه‌برداری جهت آزمایش غربالگری HPV
- ارجاع جهت انجام کولپوسکوپی در صورت لزوم
- ارجاع جهت ویزیت متخصص زنان در صورت لزوم

پیگیری

آموزش

مراقبت

باید توجه کرد که در خصوص هر فردی که وارد فرایند پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم می‌شود و براساس معیارهای طبقه‌بندی (نتیجه شرح حال و علایم سه گانه، سابقه فردی سرطان یا ضایعات پیش‌بدخیم دهانه رحم و شرایط غربالگری HPV) به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:

- آیا فرد نیازمند معاینه لگن و شکم است؟
- آیا فرد نیازمند دریافت درمان دارویی و ویزیت مجدد است؟

- آیا فرد نیازمند انجام غربالگری با آزمایش HPV است؟

- آیا فرد نیازمند ارجاع به سطح دو در همین ویزیت جهت انجام کولپوسکوپی است؟

- آیا فرد نیازمند ارجاع به سطح دو جهت ویزیت متخصص زنان است؟

چه افرادی نیازمند معاینه بالینی و دریافت درمان دارویی و ویزیت مجدد هستند؟

- گروه‌های سوم تا ششم: در تمامی افراد در گروه‌هایی که حداقل یکی از موارد شرح حال و علایم سه گانه مثبت باشد، لازم است فرد را برای تعیین نیاز به ارجاع به سطح دو، ارزیابی‌های کامل ترکرده و در پرونده ثبت نمود.

موارد ارزیابی تکمیلی به قرار زیر است:

الف- علایم و نشانه‌های بالینی (از جمله، تاریخچه، شدت، مدت و پیشرفت علایم بالینی)

- ب- عوامل خطر مرتبط (از جمله داشتن ارتباط جنسی خود و یا همسر با افراد متعدد، عدم استفاده همسر از کاندوم، در معرض دود سیگار بودن، مصرف داروهای ضد بارداری و به ویژه ساقبه ابتلا به HIV)

- ج- تشخیص‌های افتراقی (از جمله سقط در زنان پیش از یائسگی، عفونت‌ها مثل کلامیدیا و گنوکوک، زخم‌های ناحیه تناسلی، التهاب سرویکس، پولیپ رحم، خونریزی عملکردی رحمی و سرطان واژن یا رحم) (در موارد شک به تشخیص‌های افتراقی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سایر بیماری‌ها عمل نمایید).

- د- معاینه با اسپیکولوم (دستورالعمل استاندارد معاینه بالینی با استفاده از اسپیکولوم در پیوست ۱ ارائه شده است)

پس از انجام ارزیابی‌های تکمیلی، حالت‌های زیر ممکن است پیش بیاید:

۰ فرد حداقل یکی از علایم سه گانه را همراه با یکی از موارد زیر دارد که در این صورت به سطح دو جهت انجام کولپوسکوپی ارجاع می‌شود:

* ساقبه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم

* توده شکمی در معاینه

* زخم یا برجستگی در معاینه سرویکس

۰ فرد صرفاً یکی از علایم سه گانه را دارد اما سایر موارد شرح حال و معاینه طبیعی و سوابق منفی هستند که در این صورت، تشخیص‌های افتراقی بررسی می‌شود و در صورت داشتن علایم مرتبط با عفونت، درمان دارویی مورد نیاز صورت می‌گیرد و در عرض دو هفته بیمار دوباره ویزیت می‌شود. در ویزیت مجدد اگر علایم وی همچنان پایدار بود، جهت انجام ویزیت متخصص زنان ارجاع می‌شود. این افراد در صورت نیاز به کولپوسکوپی بر اساس تایید متخصص زنان مجدد به ماما ارجاع می‌شوند تا برای تعیین زمان کولپوسکوپی آنان اقدام گردد. برای افرادی که بهبود علایم دارند، در صورت دارا بودن شرایط غربالگری، برای نمونه برداری HPV در همین ویزیت اقدام نمایید.

۱. افرادی که مطابق دستورالعمل نیاز به ارجاع به سطح دو دارند به بیمارستان یا مرکز تشخیص زودهنگام سرطان ارجاع داده می‌شوند تا توسط متخصص زنان کولپوسکوپی انجام شود.



چه افرادی نیازمند نمونه برداری از دهانه رحم جهت انجام آزمایش غربالگری HPV هستند؟

نمونه برداری دهانه رحم برای آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم برای تمامی زنان از گروه دوم و زنانی از گروه چهارم که پس از درمان دارویی، عالیم بالینی در آنها بهبود یافته است و شرایط غربالگری را دارا هستند (زنان ۳۰ تا ۴۹ سال که سه سال و یا بیشتر از رابطه جنسی آنها گذشته باشد) انجام می‌گیرد. انجام آزمایش غربالگری HPV برای زنان سالم^۱ در سن زیر ۳۰ سال توصیه نمی‌شود.

برای انجام آزمایش غربالگری HPV نمونه برداری از دهانه رحم (ناحیه سرویکس) را مطابق راهنمای نمونه برداری دهانه رحم برای آزمایش غربالگری HPV (پیوست ۲) انجام دهید. نمونه برداشته شده در محلول نگهدارنده را مطابق دستورالعمل مدیریت نمونه (پیوست ۳) برای انجام آزمایش غربالگری HPV به آزمایشگاه موردتایید آزمایشگاه مرجع سلامت ارجاع دهید.

مراحل مراقبت و پیگیری در غربالگری سرطان دهانه رحم مطابق با دستورالعملی است که در فلوچارت ۱ نمایش داده شده است. بدین ترتیب که در همه افراد، غربالگری اولیه^۲ با تست تشخیص مولکولی ویروس HPV برای ژنتوتیپ‌های پرخطر آغاز می‌شود. این ژنتوتیپ‌ها که با سرطان دهانه رحم مرتبط هستند با عنوان High Risk HPV (HR-HPV) شناخته می‌شوند. در مرحله بعد نمونه‌های مثبت و آلوده به ویروس HPV برای تعیین ژنتوتیپ‌های پر خطر ۱۶ و ۱۸ (HPV-16 و ۱۸-HPV) بررسی می‌شوند. نمونه‌هایی که آلوده به ژنتوتیپ‌هایی غیر از ۱۶ و ۱۸ باشند با عنوان non 16/18 HPV شناخته شده و صرفاً برای این گروه نمونه اخذ شده برای پاپ اسمیر بررسی می‌شود.

چه افرادی نیازمند ارجاع به سطح دو جهت انجام کولپوسکوپی یا تعیین نوبت ویزیت متخصص زنان هستند؟

• **گروه یکم:** شرح حال و عالیم سه گانه منفی و سوابق منفی و فرد شرایط غربالگری HPV را ندارد. فرد در این ویزیت نیازمند ارجاع به سطح دو انجام کولپوسکوپی و یا ویزیت متخصص زنان نیست و صرفاً براساس فاصله از شروع رابطه جنسی و نتیجه آزمایش سیتوولوژی پاپ اسمیر ظرف یک سال گذشته، برای ارزیابی دوره‌ای ۲ سال بعد به بهورز / مراقب سلامت ارجاع می‌گردد. همچنین نمونه برداری برای آزمایش غربالگری HPV در این افراد نیاز نیست.

• **گروه دوم:** شرح حال و عالیم سه گانه منفی و سوابق منفی و فرد شرایط غربالگری HPV را دارد. در این افراد نمونه برداری از دهانه رحم برای آزمایش غربالگری HPV انجام گرفته و پس از دریافت نتایج آزمایش غربالگری طبق فلوچارت ۱، در صورت نیاز تعیین نوبت کولپوسکوپی و ارجاع به سطح دو انجام پذیرد.

• **گروه‌های سوم تا ششم:** در گروه‌هایی که حداقل یکی از موارد شرح حال و عالیم سه گانه مثبت باشد، پس از ارزیابی‌های تکمیلی از طریق معاینه و در صورت نیاز درمان دارویی، بر اساس نتیجه معاینه بالینی و یا پاسخ به درمان تجویز شده توسط ماما، برای ارجاع به ویزیت متخصص زنان یا کولپوسکوپی اقدام شود (جدول ۲).

پیگیری

باید توجه کرد که در خصوص هر بیماری که وارد فرایند پیشگیری و تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم می‌شود، بر اساس ارزیابی اولیه و تکمیلی و همچنین نتایج آزمایش غربالگری HPV موارد زیر را پیگیری و زمان ارزیابی دوره‌ای و شیوه پیگیری فرد در آینده را تعیین نمایید:

• دریافت بازخورد ویزیت پزشک متخصص زنان

۱. در مبتلایان به ایدز سن شروع غربالگری HPV، ۲۵، ۲۵ سال می‌باشد.

2. Primary Screening

3. High Risk HPV including types 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, and 70.

- دریافت بازخورد نتایج کولپوسکوپی
- دریافت نتایج آزمایش غربالگری HPV

- دریافت بازخورد و نتایج کولپوسکوپی و ویزیت پزشک متخصص زنان

◦ **در همه افراد گروه‌های دوم تا ششم** از جدول طبقه‌بندی (جدول ۱) که مطابق فلوچارت تشخیص

زود هنگام سرطان دهانه رحم (فلوچارت ۱) و آنچه در بخش مراقبت شرح داده شد، نیازمند انجام کولپوسکوپی و یا ویزیت پزشک متخصص زنان باشند، نوبت کولپوسکوپی و یا ویزیت را از طریق سامانه درخواست کنید. پس از دریافت بازخورد از متخصص زنان و نتیجه کولپوسکوپی از طریق سامانه، افرادی که نتیجه کولپوسکوپی آنها طبیعی است را برای ارزیابی دوره‌ای پس از ۲ سال به بهورز یا مراقب سلامت ارجاع دهید. در افرادی که کولپوسکوپی غیر طبیعی دارند زمان ارزیابی دوره‌ای توسط متخصص زنان تعیین می‌گردد.

- دریافت نتایج آزمایش غربالگری HPV

◦ در همه افراد که آزمایش غربالگری HPV برای آنها انجام گرفته است، پس از دریافت نتیجه آزمایش، آن را در سامانه ثبت نمایید. (در صورتی که قبل از صورت الکترونیک دریافت نشده باشد)، سیر مراقبت و پیگیری در آزمایش غربالگری HPV در ادامه ذکر می‌شود.

◦ در همه افرادی که تست HPV برای آنها منفی است، به بهورز / مراقب سلامت معرفی نمایید تا پس از دو سال برای ارزیابی مجدد در قالب برنامه تشخیص زودرس (Early Diagnosis) و ده سال برای آزمایش غربالگری HPV ارجاع شود. بدیهی است با وجود اینکه برای این افراد همزمان با نمونه HPV، نمونه پاپ اسمر نیز برداشته شده است، نیاز به بررسی تست پاپ اسمر نخواهد بود.

◦ در همه افرادی که نتیجه آزمایش آنها برای ژنتیک ۱۶ و یا ۱۸ از ویروس پاپیلومای انسانی مثبت باشد (Positive HPV-18 و Positive HPV-16) فرم ارزیابی را در سامانه تکمیل و به سطح دو جهت انجام کولپوسکوپی ارجاع دهید.

◦ در همه افرادی که نتیجه آزمایش آنها برای ژنتیک ۱۶ و یا ۱۸ از ویروس پاپیلومای انسانی (HPV 16/18) مثبت و نتیجه آزمایش پاپ اسمر آنها غیر طبیعی (ASCUS, AGUS, LSIL, HSIL) باشد، فرم ارزیابی را در سامانه تکمیل و به سطح دو جهت انجام کولپوسکوپی ارجاع دهید.

◦ در همه افرادی که نتیجه آزمایش آنها برای ژنتیک ۱۶ و یا ۱۸ از ویروس پاپیلومای انسانی (HPV 16/18) مثبت و نتیجه آزمایش پاپ اسمر آنها طبیعی باشد، به بهورز / مراقب سلامت معرفی نمایید تا برای تکرار آزمایش پس از دو سال اقدام گردد. بدیهی است این افراد در این ویزیت نیازی به ارجاع به سطح دو ندارند.

◦ در همه افرادی که نتیجه آزمایش آنها برای ژنتیک ۱۶ و یا ۱۸ از ویروس پاپیلومای انسانی (HPV 16/18) مثبت و نتیجه پاپ اسمر آنها unsatisfactory باشد، به بهورز / مراقب سلامت معرفی نمایید تا برای تکرار آزمایش پس از ۶ تا ۱۲ هفته اقدام گردد.

◦ در همه افرادی که نتیجه آزمایش HPV آنها inconclusive است، به بهورز / مراقب سلامت معرفی نمایید تا برای تکرار آزمایش پس از ۶ تا ۱۲ هفته اقدام گردد.



• زمان ارزیابی دوره‌ای و شیوه پیگیری فرد در آینده

- در صورتی که شرح حال و علایم سه گانه منفی و سوابق منفی باشد (گروه یکم و دوم) در صورتی که بیش از سه سال از رابطه جنسی فرد و کمتر از یکسال از تست پاپ اسمیر به تنها ی و یا کمتر از ده سال از آزمایش غربالگری HPV وی گذشته باشد، فرد برای ارزیابی ۲ سال بعد، به بهورز / مراقب سلامت ارجاع می‌گردد.
- در صورتی که فرد جهت غربالگری، تنها تست پاپ اسمیر در کمتر از یکسال گذشته انجام داده و نتیجه آن طبیعی است فرد را جهت ارزیابی دوره‌ای ۲ سال بعد به بهورز / مراقب سلامت ارجاع دهید (فلوچارت ۱).
- در صورتی که فرد تست پاپ اسمیر در کمتر از یکسال گذشته انجام داده و نتیجه آن غیرطبیعی (ASCUS, AGUS, LSIL, HSIL) باشد، نتیجه آزمایش را در سامانه ثبت و فرد را در صورتی که کولپوسکوپی انجام نداده است به سطح دو برای انجام کولپوسکوپی ارجاع دهید. در شرایطی که کولپوسکوپی متعاقب نتیجه تست پاپ اسمیر انجام شده باشد و نتیجه آن غیرطبیعی بوده است، فرد را صرف برای ویزیت به متخصص زنان ارجاع دهید.
- در صورتی که فرد تست پاپ اسمیر در بیش از یکسال گذشته انجام داده و نتیجه آن طبیعی باشد، در زنان ۳۰ تا ۴۹ سال که تاکنون آزمایش غربالگری HPV انجام نداده اند و شرایط غربالگری را دارند، در همین ویزیت برای انجام آزمایش غربالگری HPV و نمونه برداری از دهانه رحم اقدام نمایید. زمان ارزیابی دوره‌ای در این گروه بر اساس نتیجه آزمایش غربالگری HPV خواهد بود. در خارج از این گروه سنی فرد را جهت ارزیابی دوره‌ای ۲ سال بعد به بهورز / مراقب سلامت ارجاع دهید.
- در صورتی که فرد قبل آزمایش غربالگری HPV انجام داده و نتیجه آن منفی باشد، در زنان رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال، ارزیابی دوره‌ای آزمایش غربالگری HPV هر ۱۰ سال خواهد بود.
- در زنان که سابقه ابتلا به HIV را دارند، سن شروع غربالگری از ۲۵ سال و فواصل انجام غربالگری هر ۳ تا ۵ سال می‌باشد.
- در صورتی که فرد آزمایش غربالگری HPV انجام داده و نتیجه آزمایش غربالگری HPV برای ژنتیپ‌های غیر از ۱۶ و ۱۸ مثبت و نتیجه پاپ اسمیر منفی باشد، زمان تکرار آزمایش غربالگری HPV دو سال بعد خواهد بود. در زنان که سابقه ابتلا به HIV را دارند، زمان تکرار آزمایش غربالگری HPV یک سال بعد خواهد بود.
- در صورتی که هر یک از شرح حال و علایم سه گانه مثبت و سوابق منفی باشد (گروه سوم) در آنان که پس از دریافت دوز درمانی بهبود یافته اند، در صورتی که تاکنون آزمایش غربالگری HPV انجام نداده اند و اجد شرایط غربالگری هستند برای نمونه برداری اقدام نمایید. زمان ارزیابی دوره‌ای در این گروه بر اساس نتیجه آزمایش غربالگری HPV خواهد بود.
- در همه موارد آموزش‌های خود مراقبتی لازم درخصوص علایم مشکوک سرطان دهانه رحم مطابق بسته آموزشی، داده شود.


جدول ۲- تعیین سیر مراقبت ماما، انجام کولپوسکوپی و ویزیت متخصص زنان براساس نتایج شرح حال
و علایم بالینی و سوابق پزشکی و شرایط غربالگری HPV

زمان ارزیابی بعدی	ارزیابی اولیه متخصص زنان		اقدامات ماما براساس نتایج ارزیابی اولیه				ارزیابی اولیه ماما				گروه شرح حال و علایم بدخیم دهانه‌رحم سه‌گانه
	ویزیت	کولپوسکوپی	نمونه برداری غربالگری HPV	جهت آزمایش HPV	درمان دارویی	معاینه لگن و شکم	شرایط غربالگری HPV	سابقه سرطان و ضایعات پیش از بخوبی	شرح حال و علایم سه‌گانه		
۲ سال بعد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	منفی یا مثبت	همه منفی	۱	
بر اساس نتیجه آزمایش HPV غربالگری	بر اساس نتیجه آزمایش HPV غربالگری	بر اساس نتیجه آزمایش HPV غربالگری	در همین ویزیت نیاز است	نیاز نیست	نیاز است	نیاز نیست	دارد	منفی یا مثبت	همه منفی	۲	
در صورت بهبود علایم: پس از درمان دارویی: ۲ سال بعد	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی: نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز است	نیاز است و نتیجه طبیعی است	نیاز نیست	منفی	همه یا هر یک مثبت	۳	
در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی: بر اساس بازخورد ویزیت متخصص زنان	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی	در صورت عدم بهبود علایم پس از درمان دارویی: بر اساس بازخورد ویزیت متخصص زنان	در صورت بهبود علایم پس از درمان دارویی: بر اساس نتایج آزمایش غربالگری HPV	در صورت بهبود علایم پس از درمان دارویی: نیاز نیست	نیاز است و نتیجه طبیعی است	دارد	منفی	همه یا هر یک مثبت	۴	
بر اساس نتیجه آزمایش غربالگری HPV و یا کولپوسکوپی و یا بازخورد ویزیت متخصص زنان	در همین ویزیت نیاز است	در همین ویزیت نیاز است	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز است و نتیجه غیرطبیعی است	نیاز نیست	دارد یا ندارد	منفی	همه یا هر یک مثبت	۵	
بر اساس نتیجه کولپوسکوپی	بر اساس نتیجه کولپوسکوپی	در همین ویزیت نیاز است	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز است و نتیجه طبیعی / غیرطبیعی است	نیاز نیست	دارد یا ندارد	منفی	همه یا هر یک مثبت	۶	




فلوچارت ۲- انواع توالی برای تعیین سیر مراقبت بیمار توسط مامای شبکه

توالی الف: گروه یکم و دوم



توالی ب: گروه سوم و چهارم



توالی ج: گروه پنجم و ششم



آموزش

- آموزشی که مامای آموزش دیده در آن دخالت دارد را می‌توان به دو دسته آموزش پرسنل و آموزش بیماران تقسیم کرد:

۱۰۴ آموزش پرسنل (سایر ماماها) شامل:

* نحوه گرفتن شرح حال و معاینه بالینی دهانه رحم (سرویکس)

* نحوه نمونه برداری از دهانه رحم (سرویکس) برای آزمایش غربالگری HPV

۱۰۵ آموزش بیماران شامل:

* آموزش علل بروز سرطان دهانه رحم و تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری از آن

* آموزش علایم هشدار دهنده سرطان دهانه رحم تا اگر در فواصل ارزیابی‌های دوره‌ای این علایم را داشتند، زودتر مراجعه کنند.

* آموزش در خصوص مراقبت‌های لازم و نحوه برخورد با نتایج مثبت HPV

۱۰۶ آموزش عوامل خطر و شیوه‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت HPV

دستورالعمل ویژه متخصص زنان

- مطابق شرایطی که در قسمت مراقبت گفته شد، بیمار جهت ویزیت و بررسی بیشتر به متخصص زنان ارجاع داده می‌شوند و در سامانه نوبت کولپوسکوپی و یا ویزیت زنان تعیین می‌گردد.
- در مواردی که بیمار برای کولپوسکوپی ارجاع شده باشد، اقدام کولپوسکوپی انجام و گزارش آن در فرم ساختارمند سامانه ثبت می‌گردد.
- در صورت انجام نمونه برداری بافتی، مشخصات را در سامانه ثبت و از طریق سامانه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی ارجاع دهید.
- در هر شرایطی که نتیجه کولپوسکوپی ناکافی یا ضایعه در ناحیه ترازنیشنال وجود داشت بیوپسی اندوسرویکال توصیه می‌گردد.
- در مواردی که بیمار نیازمند مداخله درمانی باشد، اقدامات تخصصی انجام و زمان ارزیابی دوره‌ای تعیین و از طریق سامانه (فرم سیر بیماری) به اطلاع ماما می‌رسد تا در این خصوص اقدام نماید.
- در مواردی که اقدام تخصصی خاصی نیاز نباشد، از طریق سامانه (فرم سیر بیماری) به ماما شبکه اعلام می‌کند و می‌نویسند نوبت ارزیابی دوره‌ای را برای فرد تعیین می‌کند.
- برای جزئیات مداخلات مرتبط با نتایج کولپوسکوپی به "راهنمای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم" مراجعه نمایید.

دستورالعمل مدیریت برنامه

به طور کلی مدیریت برنامه بر بستر الکترونیک (سامانه سیمای سرطان) صورت می‌گیرد. هر فرد ارائه‌دهنده خدمت، موارد مرتبط با ارزیابی‌ها و وظایفش را در سامانه ثبت می‌کند.

نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برای ساماندهی نظام ارجاع و جلوگیری از به اصطلاح گم شدن بیمار (فرد) در طی مسیر مراقبت و پیگیری، ارائه‌دهنده خدمت، لازم است فرد گیرنده ارجاع را مشخص و در صورت لزوم نوبت ویزیت یا هر اقدام دیگر مورد نیاز بیمار را در سامانه ثبت نماید. به این ترتیب، بهوژ و مراقب سلامت پس از ثبت فرد در سامانه، وقت ویزیت مامای آموزش دیده شبکه را تعیین و به فرد اعلام می‌کند. سپس مامای شبکه، پس از ارزیابی اولیه و در صورت لزوم معاینه، نتایج ارزیابی مربوط به خود را در سامانه ثبت می‌کند و در صورت نیاز وقت کولپوسکوپی و ویزیت متخصص زنان را تعیین و به فرد اعلام می‌کند. همچنین در افرادی که مشمول انجام آزمایش HPV می‌باشند، اقدام به نمونه‌گیری از دهانه رحم می‌نماید. اجرای کامل دستورالعمل مدیریت نمونه بر اساس دستورالعمل استاندارد آزمایشگاه مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت، بر عهده ناظر دانشگاه می‌باشد.

عمده موارد مورد نظرارت به شرح ذیل است:

- توزيع بسته‌های نمونه برداری آزمایش HPV در شهرستان هدف برنامه و مراکز ارائه خدمت بر اساس بارکد اختصاصی مرکز ارائه خدمت.
- استفاده از تمامی بسته‌های نمونه برداری آزمایش غربالگری HPV در مراکز ارائه خدمت برای گیرنده‌گان خدمت در شهرستان هدف برنامه.
- بازگشت تمامی بسته‌های دارای بارکد به آزمایشگاه تامین کننده بسته‌های آزمایش غربالگری HPV.
- نگهداری نمونه‌ها در مراکز در شرایط مناسب تا زمان ارسال به آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل مدیریت نمونه.
- ارسال استاندارد و به موقع نمونه به آزمایشگاه و پیگیری دریافت به موقع نتایج آزمایش غربالگری HPV و ثبت آنها در سامانه.
- اجرای کامل برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم و ثبت در سامانه.

نکته مهم این است که بازخورد همه ارجاعات و نتایج معاینات تخصصی و کولپوسکوپی در پرونده الکترونیک فرد، به مامای آموزش دیده شبکه منعکس می‌شود و کانون تصمیم‌گیری برای زمان و نوع خدمات بعدی، بر اساس دستورالعمل برنامه، مامای آموزش دیده شبکه است. زمان ارزیابی دوره‌ای خدمات تشخیص زودهنگام و همچنین آزمایش غربالگری HPV توسط ماما به بهوژ / مراقب سلامت اعلام شده تا بر آن اساس برای ارزیابی‌های بعدی و فراخوان بیمار برنامه ریزی نماید.

به جز راه‌های معمول اطلاع‌رسانی، تلاش خواهد شد هم ارائه‌دهنده و هم گیرنده خدمت با ارسال پیامک از روند و تاریخ مراقبت مطلع گرددند. در عین حال لازم است هر دانشگاه برای مدیریت و نظرارت بر روند اجرای برنامه در سه سطح اقدام نماید که شامل:

- سطح ۱.** مرکز خدمات جامع شهری با معرفی یک نفر به عنوان ناظر بر عملکرد پایگاه‌های سلامت و مراکز ارائه‌دهنده خدمت.
- سطح ۲.** ستاد شبکه بهداشت شهرستان با معرفی یک نفر به عنوان مدیر و ناظر برنامه در سطح شهرستان.
- سطح ۳.** ستاد معاونت بهداشت دانشگاه با معرفی یک نفر به عنوان مدیر و ناظر در سطح معاونت بهداشت.

اهم وظایف ناظرین و مدیران در حوزه مدیریت برنامه به شرح زیر می‌باشد:

مدیر و ناظر ستاد شبکه بهداشت شهرستان


- ثبت تغییرات در مراکز و مشخصات ارائه‌دهنگان خدمت شامل بهوژ یا مراقب سلامت، ماما و متخصص زنان به عنوان ادمین ستاد شهرستان
- تنظیم بار فراخوان سطح یک

- تنظیم بار ارجاع تخصصی^۱
- مدیریت ارجاع به موقع
- اطمینان از تعیین نوبت در سیستم‌های بیمارستانی و در صورت لزوم تغییر نوبت ویزیت بنا به درخواست پزشک متخصص یا بیمار هماهنگی با بیمار و ارائه دهنده خدمت ۴۸ ساعت پیش از انجام پروسیجر یا ویزیت
- گزارش دوره‌ای از عملکرد و اجرای برنامه در سطح یک و ثبت آن در سامانه گزارش روزانه از عملکرد بهورز/ مراقب سلامت و ماما در مرکز، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت همکار برنامه در منطقه تحت پوشش

مدیر و ناظر ستاد معاونت بهداشت دانشگاه

- ثبت اولیه مراکز و مشخصات ارائه دهنگان خدمت شامل بهورز یا مراقب سلامت، ماما، متخصص زنان به عنوان ادمین ستاد دانشگاه
- ارزیابی عملکرد در سطح یک و دو و ثبت گزارش جامع دوره‌ای از اجرای برنامه در سطح شهرستان
- تنظیم بار ارجاع تخصصی^۱
- مدیریت ارجاع به موقع
- اطمینان از تعیین نوبت در سیستم‌های بیمارستانی و در صورت لزوم تغییر نوبت ویزیت بنا به درخواست پزشک متخصص یا بیمار هماهنگی با بیمار و ارائه دهنده خدمت ۴۸ ساعت پیش از انجام پروسیجر یا ویزیت
- نظارت بر ارتباط با متخصص توسط دبیرخانه از طریق:
 - ارسال پیامک جلب مشارکت
 - ارسال پیامک فیدبک خدمات
 - وب سایت دبیرخانه
- برنامه‌ریزی برای جلب متخصصین

فلوچارت ۳- نمای جامع مدیریت برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم



۱ در شهرستان‌هایی که امکان ارائه خدمات تخصصی میسر نمی‌باشد، این وظیفه بر عهده مدیر و ناظر در ستاد دانشگاه می‌باشد.



پیوست ۱

دستورالعمل معاينه باليني لگن و شكم

معاينه لگن ، معاينه بصری و فيزيکي اندام توليدمثل زنان توسط پزشك متخصص زنان است. پزشك در اين روش واژن، دهانه رحم، فرج، تخمدان و رحم را معاينه مي کند.

- تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز جهت معاينه دهانه رحم و لگن

◦ تخت زنيکولوزى

◦ منبع نوري و كولپوسكوب

◦ محلول اسيد استيک ۳ تا ۵ درصد يا Lugol's iodine (محلول لوگل) ۴ تا ۵ درصد (۵ گرم يد، ۱۰ گرم يادات پتابسيم در ۱۰۰ ميلي ليتر آب استيريل)

◦ سواپ پنبه ای بزرگ

◦ و پنبه Forceps

- نحوه معاينه

معاينه واژينال در حالت ليتوتومي(خوابیده به پشت) انجام مي شود، در حالى که پاهای بيمار پوشانده شده است. از بيمار بخواهيد به پشت دراز بکشد و آرامش داشته باشد. در اين زمان، قسمت انتهای شكم را فشار داده ها و اندامها را از بيرون لمس نمایيد. برای مشاهده اندام هاي داخلی از اسپيكولوم استفاده کنيد. سرويکس (دهانه رحم) و واژن با يك اسپيكولوم استاندارد و با نور روشن به صورت کلى رویت می شود. در ادامه اسپيكولوم را برداشته و سپس معاينه دودستي واژن و دهانه رحم به صورت دوطرفه از طريق واژن و شكم به طور هم زمان انجام می شود و در صورت احتمال توده در هر قسمتی از نظر محل، اندازه، قوام، شكل، تحرك، حساسيت، دوطرفه يا يكطرفه مورد بررسی دقیق قرار می گيرد.

در معاينه باليني با استفاده از كولپوسكوبی پروتکل استاندارد به شرح زير است :

كولپوسكوبی در حالت ليتوتومي به پشت انجام مي شود در حالى که پاهای بيمار پوشانده شده است. سرويکس و واژن با يك اسپيكولوم استاندارد با نور روشن به صورت کلى رویت می شود. موکوس يا ترشحات واژينال با پنبه آغشته به نرمال سالين پاک شده سپس پنبه آغشته به محلول اسيد استيک ۳ تا ۵ % به مدت ۶ ثانие استفاده می شود. سپس تمامی نواحي با دقت توسط كولپوسكوب مشاهده می گردد. در حضور اسيد استيک، سلول دهیدراته شده و سلول هاي سنگفرشی با هسته درشت و متراكم (سلول هاي متاپلاستيک، سلول هاي ديسپلاستيک و يا سلول هاي آلوده به ويروس HPV) نور تابيده شده را منعکس و به رنگ سفيد قابل رویت می شود. سلول هاي خونی و سلول هاي پوششی استوانه ای با اسيد استيک تحت تاثير قرار نمي گيرند و به آسانی از زمینه سفيد قابل افتراق می باشند. توجه داشته باشيد که تمامی لکه هاي سفيد ايجاد شده با اسيد استيک بيانگر ضایعات پيش سلطاني و سرطاني دهانه رحم نمي باشند، بلکه تشخيص افتراقی با توجه به تغييرات سلولی ايجاد شده با عفونت HPV ، متاپلازی سلول هاي سنگفرشی و Leukoplakia ايجاد شده در اثر التهاب مزمن، انجام مي پذيرد.

پیوست ۲

دستورالعمل نمونه برداری از دهانه رحم برای آزمایش غربالگری HPV



در نمونه برداری برای آزمایش غربالگری، ماما یا پزشک نمونه‌ای از سلول‌های دهانه رحم برداشته و آن را در محلول نگهدارنده نمونه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش HPV و یا پاپ اسمیر در موارد لزوم ارسال می‌کند. توجه داشته باشید که یک نمونه برای انجام آزمایش HPV و نیز پاپ اسمیر کافی است.

مواردی که پیش از نمونه‌گیری می‌بایست در نظر گرفته شود

- دوره خونریزی عادت ماهیانه: زمان تست را طوری تنظیم نماییم که در دوره خونریزی عادت ماهیانه نباشد. نمونه‌های حاوی خون برای آزمون‌های مولکولی غیر معتبر می‌باشند.
- فعالیت جنسی: حداقل دو روز قبل از تست فعالیت جنسی نداشته باشد.
- شستشوی واژینال: دو روز قبل از تست شستشوی واژن نداشته باشد.
- استفاده از تامپون، کرم‌های واژینال و دارو: حداقل دو روز قبل از تست، از تامپون، کرم‌های واژینال و داروها استفاده نکرده باشد.
- مهارکننده واکنش‌های تشخیص مولکولی می‌باشد. مطمئن شوید پیش و هنگام نمونه برداری از Lubricant استفاده نشود.


آماده سازی بیمار پیش از برداشتن نمونه

- برای بیمار باید توضیحات لازم برای انجام و نحوه انجام نمونه‌گیری داده شود و اطمینان داده شود که این آزمون خطرناک نیست و ظرف مدت چند دقیقه به پایان می‌رسد و امکان دارد کمی احساس ناراحتی کند. همچنین به بیمار توضیح دهید که ممکن است لکه بینی خفیفی پس از آزمون رخ دهد. بدین ترتیب بیمار آرامش لازم برای انجام آزمون را پیدا می‌کند.




چگونگی برداشتن نمونه از دهانه رحم


- ابتدا بیمار بروی تخت معاینه جهت معاینه خوابانده شده و آماده نمونه برداری می‌شود.
- از یک اسپکولوم یک بار مصرف برای مشاهده دهانه رحم استفاده می‌شود.
- در صورت نیاز به Lubrication برای کارگذاری اسپکولوم از آب گرم استفاده کنید. توجه داشته باشید که استفاده از مواد Lubricant موجب تداخل در آزمایشات مولکولی و سیتوالوژی می‌شود.



- از برس یا سیتوبراش برای برداشتن نمونه استفاده نمایید. به این منظور سیتوبراش را در داخل کanal اندوسرویکس وارد نموده و در یک جهت به میزان ۴/۲ یا ۲/۱ بچرخانید. از چرخش کامل و بیش از اندازه سیتوبراش خودداری نمایید. سلول‌های دهانه رحم با چرخاندن برس در اطراف ناحیه اتصال سنگفرشی-ستونی Transformation zone به صورت دورانی خراشیده و رها می‌شود.



- سپس برس را خارج کرده و در درون محلول نگهدارنده نمونه در ویال با حرکت چرخشی به مدت ۱۰ دقیقه شستشو می‌دهیم.
- سربرس در داخل ویال حاوی ماده محافظ شکسته و در ویال گذاشته می‌شود.
- نمونه به آزمایشگاه ارسال می‌گردد.
- پیشنهاد می‌شود ارسال نمونه‌ها و دریافت گزارش توسط مرکز انجام شود.





پیوست ۳

دستورالعمل مدیریت نمونه

مقدمه

آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم به روش HPV molecular assay، از طریق تشخیص ماده ژنتیکی ویروس پاپیلومای انسانی و با استفاده از روش‌های مولکولی انجام می‌گیرد. به منظور ارتقا کیفیت آزمون تشخیصی، انجام آزمایش توسط آزمایشگاه معترض و نیروهای متخصص و مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت و نیز استفاده از ملزمات استاندارد و اختصاصی آزمون‌های تشخیص مولکولی ضروری است.

معیارهای پذیرش نمونه برای آزمایش غربالگری HPV

معیارهای پذیرش نمونه مناسب برای آزمایش غربالگری HPV به شرح جدول ۳ می‌باشد.

جدول ۳- معیارهای عدم پذیرش نمونه برای آزمایش

ردیف	معیار عدم پذیرش نمونه
۱	نشت مایع از ویال محلول نگهدارنده نمونه
۲	وجود خون در نمونه به نحوی که رنگ نمونه به قرمز و یا قهوه‌ای تیره تغییر کند.
۳	وجود موکوس فراوان در نمونه برداشت شده
۴	عدم نمونه‌گیری (با یا بدون حضور سیتوبراش در ویال)

شرایط نگهداری نمونه پس از نمونه‌برداری

- نمونه برداشت شده از ناحیه سرویکس پس از تلقیح در محلول نگهدارنده نمونه به مدت ۱ هفته در دمای محیط (دماه ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و ۳ ماه در دمای یخچال (دماه ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد) پایدار خواهد بود. از یخ‌زدگی نمونه‌ها ممانعت نمایید. نمونه‌ها باید به دور از نور خورشید نگهداری شوند.
- در مناطق و فصول گرم توصیه می‌شود نمونه‌ها در دمای یخچال (۸-۲ درجه سانتی‌گراد) و در صورت عدم امکان در داخل یخدان که حاوی کیسه‌های یخ باشد، نگهداری شود و هر ۲۴ ساعت یک بار کیسه‌های یخ^۱ عوض شوند.

1. Ice Pack



مراحل حمل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و دریافت نتایج

نمونه‌ها پس از برداشت و بر اساس دستورالعمل آزمایشگاه مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت به آزمایشگاه منتقل و پس از دریافت نتایج غربالگری از آزمایشگاه مطابق فلوچارت ۱ دستورالعمل برنامه ارجاع و ارزیابی بیمار را تعیین می‌نمایید.



پیوست ۶

محتوای آموزشی

سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ایران و میلیون‌ها مورد در جهان رخ می‌دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن بسیار زیاد است.

میزان بروز سالیانه سرطان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بوده است که تا سال ۲۰۴۰ میلادی به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید همچنین عدد مرگ و میر سالیانه از ۱۰ میلیون نفر در همین مدت به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.

در ایران سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر مبتلا به سرطان می‌شوند که این عدد تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ خورشیدی) با افزایش دست کم بیش از ۱۱۵ درصدی به بیش از ۲۹۰ هزار نفر خواهد رسید.

مهم‌ترین دلایل برای افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از:

- افزایش امید به زندگی و تعداد سالمندان (چراکه بروز سرطان با افزایش سن، افزایش می‌یابد)
- تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری و کم تحرکی
- عوامل محیطی مانند افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی



در حال حاضر با وجودی که عدد خام مرگ و میر ناشی از سرطان‌ها افزایش یافته است اما به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت می‌کنند با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتلا، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافته است. نیمی از افرادی که امروز با تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بیش از ۴۰٪ بعد از ده سال هنوز زندگی می‌کنند. متوسط میزان بقای ده ساله برای سرطان دو برابر ۳۰ سال گذشته شده است.

مهم‌ترین دلیل بهبود در بقای بیماران، علاوه بر درمان‌های موثرتری که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش‌های تشخیص زودهنگام است. حتی برای کسانی که احتمال بهبودی آنها کم است، شناسن از زنده ماندن در زمان تشخیص زودتر، بیشتر خواهد بود. دو جزء اصلی در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: تشخیص زودهنگام و غربالگری.

تفاوت تشخیص زودرس و غربالگری

لازم است بین **تشخیص زودرس** (Early Diagnosis) و **غربالگری** (Screening) افتراق قابل شد. هر دوی این مداخلات در ذیل تشخیص زودهنگام (Early Detection) قرار می‌گیرند:

• **تشخیص زودرس** به مجموع مداخلاتی گفته می‌شود که منجر به تشخیص زودتر سرطان در افرادی می‌شود که عالیم مشکوک سرطان را دارند. مجموعه اقدامات ذیل تشخیص زودرس، ضروری و از ظایف اصلی نظام‌های سلامت و بسیار مقویون به صرفه است. به طور عام معنای تشخیص زودرس این است که ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات سلامتی در سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور، عالیم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابی‌های دوره‌ای، اگر فردی را بررسی کردیم و یا در فوایل بین ارزیابی‌ها اگر فردی با این عالیم مراجعه کرد، آمادگی شناسایی این عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در مرحله بعدی موارد مهم را برای اقدامات تشخیصی کامل تر به مراکز سطح بالاتر و مجذبه‌تر معرفی کنیم و در عین حال نظام سلامت آمادگی پاسخگویی به ارجاعات و ثبت دقیق خدمات و مراقبت‌ها و پیگیری فرد را داشته باشد.

• **غربالگری** به مجموع مداخلاتی گفته می‌شود که منجر به تشخیص زودتر سرطان در افرادی می‌شود که هیچ علامت مشکوکی ندارند اما به دلیل شرایط جنسی (مثلًا سرطان پستان) یا سنی خاص (مثلًا سن بالا) بالقوه در معرض خطر هستند. غربالگری می‌تواند در دو گروه با خطر متوسط و با خطر بالا انجام شود. ضرورت انجام خدمات غربالگری به بروز و شیوع بیماری و منابع مالی هر کشوری بستگی دارد و علی‌غم اثربخشی ممکن است هزینه اثربخش نباشد. غربالگری به معنی شناسایی بیماری احتمالی ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایشات ساده در فردی است که هنوز عالیم ندارد. در یک برنامه ملی مدیریت سرطان، بعد از غربالگری، افراد تشخیص داده شده تحت درمان مناسب قرار می‌گیرند.

بسیاری از سرطان‌ها تنها با معاینه پزشکی و آزمایش‌های تکمیلی تشخیص داده می‌شوند که از جمله آنها سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ هستند.

لازم است هم بیمار و هم ارائه دهنگان مراقبت‌های بهداشتی به اهمیت تشخیص زودهنگام از راه آشنایی با عالیم مشکوک سرطان همچنین انجام فعالیت‌های غربالگری سرطان پاییند باشند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتلاف منابع شود.



اهداف برنامه‌های غربالگری شامل موارد زیر است:

۰ کاهش واژ بین بردن کامل تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان

۰ کاهش تعداد افرادی که به سرطان مبتلا می‌شوند

در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ (کولورکتال)، پستان و دهانه رحم (سرویکس)، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به این سرطان‌ها و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی همچنین ساماندهی نظام ارجاع، درمان و مراقبت بیماران است.

اپیدمیولوژی سرطان دهانه رحم

سلامت زنان و به ویژه مادران از مفاہیم زیر بنایی در توسعه است. زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نه تنها مسئول سلامت خود هستند بلکه بیشترین مراقبت‌ها را برای بهداشت خانواده انجام می‌دهند. به این ترتیب وضعیت سلامت زنان تأثیر به سزاگی بر سلامت فرزندان، خانواده و جامعه پیرامون آنها دارد و چنانچه این موضوع نادیده گرفته شود، سلامت خانواده و جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد.

سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان پربروز زنان و هفتمین سرطان پربروز در بین هر دو جنس در جهان است. سرطان دهانه رحم یکی از علل مهم مرگ ناشی از سرطان در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود، چراکه در اکثر موارد در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود. خوشبختانه میزان بروز سرطان دهانه رحم در ایران پایین است اما به نظر می‌رسد بروز آن در سال‌های آینده افزایش یابد. نسبت مرگ و میر به بروز، شاخص مهمی در کنترل این بیماری است. در کشورهای پیشرفته که برنامه‌های موثر غربالگری وجود دارد بیشتر بیماران در مراحل اولیه تشخیص داده شده و درمان به موقع بیماران از مرگ و میر آنان جلوگیری می‌کند در حالی که در کشورهای در حال توسعه، این بیماران در مراحل بسیار پیشرفته مراجعه می‌کنند و معمولاً به دلیل عدم درمان به موقع و یا عدم دسترسی به درمان‌های مناسب، میزان مرگ در اثر سرطان دهانه رحم بالا می‌باشد.

سن بروز سرطان دهانه رحم

هرچند امکان وقوع سرطان دهانه رحم در هر سنی وجود دارد، اما این سرطان دارای دو پیک سنی ۳۵-۳۸ و ۶۴-۶۰ سالگی است.

چگونگی شکل گیری سرطان دهانه رحم و انواع آن

سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه کاملاً بدون علامت می‌باشد. سرطان دهانه رحم زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌های سالم روی سطح دهانه رحم طی دیسپلазی تغییر می‌کنند و رشد آنها از کنترل خارج و باعث ایجاد تومور می‌شود. روند ایجاد سرطان دهانه رحم بسیار آهسته رخ می‌دهد. در ابتدا تغییرات غیر طبیعی در سلول‌های ایجاد می‌شود که با بررسی آزمایشگاهی سلول‌های ریزش کرده از دهانه رحم قابل تشخیص است. این تغییرات غیر طبیعی اولین گام در یکسری تغییرات آهسته هستند که می‌توانند منجر به سرطان شوند. با این حال برخی از این سلول‌های غیر طبیعی خود به خود و یا از طریق مراقبتها کمکی و مداخلات درمانی ساده رفع می‌شوند و بعضی دیگر می‌توانند سرطانی شوند و باید برای جلوگیری از پیشرفت و تبدیل شدن به سرطان از بین بروند.

دو نوع اصلی سرطان دهانه رحم وجود دارد که براساس نوع سلولی که سرطان از آنجا آغاز می‌شود نامگذاری شده‌اند: کارسینوم سلول سنگفرشی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سرطان‌های دهانه رحم را تشکیل می‌دهد. این نوع سرطان سرویکس در سلول‌های پوشش خارجی دهانه رحم به وجود می‌آیند. آدنوکارسینوما که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرطان‌های دهانه رحم را تشکیل می‌دهد. این نوع سرطان دهانه رحم از سلول‌های غددی تولید کننده موکوس در بخش درونی گردن رحم (اندوسرویکس) ایجاد می‌شود. موارد نادر سرطان سرویکس شامل مثل لنفوم، سارکوم، ملانوم و کارسینوم با منشا نورواندوکراین و کارسینوم کیستیک آدنوئید می‌باشد.

اصول خودمراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم

برای آموزش خودمراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌ها دو اصل مهم باید آموزش داده شود:

۱. راه‌های پیشگیری از سرطان

- به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان برخلاف تصور عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری اند.
- برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم باید بدانیم که علل ایجاد کننده سرطان و راه‌های دوری از آن کدامند همچنین چه عواملی اثر محافظتی در برابر این سرطان دارند.

۲. علایم هشداردهنده سرطان

- سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه کاملاً بدون علامت می‌باشد. غربالگری منظم بهترین راه شناسایی زودهنگام خطر ابتلاء سرطان دهانه رحم می‌باشد.

◦ براین مبنای زنان باید به مشارکت در برنامه‌های غربالگری سرطان دهانه رحم و انجام منظم آزمایش غربالگری HPV ترغیب شوند و به شبکه بهداشتی مراجعه کنند.

- تعدادی از علایم هشداردهنده سرطان دهانه رحم که معمولاً با شروع شکل گیری تغییرات غیر طبیعی سلولی شکل می‌گیرد عبارتند از:
 - خونریزی غیر طبیعی واژینال (از جمله پس از نزدیکی جنسی، در فواصل دوره‌های قاعده‌گی و پس از یائسگی)
 - ترشحات بدبوی واژینال
 - درد هنگام نزدیکی جنسی

- با شناخت علایم هشداردهنده سرطان دهانه رحم و مراجعه به موقع به خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشتی می‌توان ضایعات پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان، تشخیص و مداخلات درمانی را آغاز نمود.
- تأکید می‌گردد که بهترین راه کاهش خطر سرطان دهانه رحم ضمن آشنایی با عوامل خطر و رعایت شیوه زندگی سالم، انجام غربالگری دوره‌ای و منظم است.



عوامل خطر سرطان دهانه رحم و پیشگیری از آن

هر کسی می‌تواند برای کاهش خطر سرطان و دیگر بیماری‌های مزمن، تغییراتی را در شیوه‌ی زندگی خود ایجاد کند. افراد در معرض خطر باید به خاطر داشته باشند که ترکیبی از عوامل برای ایجاد سرطان لازم است از جمله عوامل ژنتیک، محیطی و شیوه‌ی زندگی. بعضی از این عوامل می‌توانند اصلاح شوند و بعضی دیگر خارج از اراده افراد هستند بنابراین افراد می‌توانند قدم‌هایی را برای کاهش خطر بیماری بردارند.

- عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (Human Papillomavirus: HPV): مهمترین و شناخته شده‌ترین علل محیطی ایجاد سرطان دهانه رحم، عفونت ویروس HPV می‌باشد. این عامل در سال ۱۹۷۰ میلادی به عنوان عامل اصلی بروز سرطان دهانه رحم معرفی گردید و مطالعات مختلف صورت گرفته در سراسر جهان نشان دهنده ارتباط قوی میان HPV و تغییرات پیش سرطانی و سرطانی در سلول‌های اپیتلیالی می‌باشد. عفونت ویروس پاپیلومای انسانی عامل بیش از ۹۹ درصد موارد سرطان دهانه رحم و ۹۵ درصد سرطان مقعد در زنان می‌باشد. عفونت با HPV همچنین عامل سرطان penile در مردان و سرطان زبان، لوزه و حنجره (oropharyngeal cancer) در هر دو جنس می‌شود. فعالیت جنسی با فردی که مبتلا به HPV است شایع ترین شیوه ابتلاء به این ویروس است.
- ضعف سیستم ایمنی: زنان مبتلا به ضعف سیستم ایمنی خطر ابتلاء به سرطان دهانه رحم را افزایش می‌دهند. ضعف سیستم ایمنی می‌تواند ناشی از سرکوب سیستم ایمنی توسط داروهای کورتیکواستروئید، پیوند اعضاء، درمان انواع دیگر سرطان و یا ویروس نقص ایمنی بدن (ایdz) باشد.
- سیگار کشیدن و مصرف قلیان: احتمال ابتلاء به سرطان دهانه رحم در زنان سیگاری نسبت به زنان غیر سیگاری، ۲ برابر می‌باشد.
- سن: دختران زیر ۱۵ سال به ندرت به سرطان دهانه رحم مبتلا می‌شوند. خطر ابتلاء این اواخر نوجوانی و اواسط دهه ۳۰ افزایش می‌یابد. زنان بالای ۴۰ سال بیشتر در معرض خطر قرار دارند و نیاز به برنامه‌های غربالگری سرطان دهانه رحم دارند.
- عوامل اجتماعی-اقتصادی: سرطان دهانه رحم در میان گروهی از زنان که احتمال دسترسی کمتری به غربالگری‌های سرطان دهانه رحم دارند، شایع تر است.
- پیشگیری از بارداری توسط قصه‌های ضد بارداری: بعضی از مطالعات نشان می‌دهند که قصه‌های ضد بارداری ممکن است با افزایش خطر سرطان دهانه رحم همراه باشد.
- قرار گرفتن در معرض رژیم (DES): مصرف DES در دوران بارداری به منظور ممانعت از سقط جنین خطر بروز نوع نادرتری از سرطان در ناحیه واژن و سرویکس از نوع Adenocarcinoma را افزایش می‌دهد.

بر مبنای عوامل خطری که در بالا گفته شد، مهمترین توصیه‌های خود مراقبتی برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم عبارتند از:

- تاخیر در اولین مقایب جنسی تا نوجوانی و سنین بالاتر
- محدود کردن تعداد شرکای جنسی
- اجتناب از مقایب جنسی با افرادی که شرکای جنسی بسیاری داشته‌اند.
- اجتناب از مقایب جنسی با افرادی که آشکارا مبتلا به زگیل‌های تناسلی بوده و علایم دیگر را نشان می‌دهند.
- ترک سیگار

◦ واکسیناسیون: هدف واکسیناسیون جلوگیری از عفونت پایدار HPV پس از اینکه یک فرد در معرض ویروس قرار گرفت، می‌باشد. دریافت واکسن HPV خطر ابتلا به عفونت پایدار را کاهش می‌دهد و بسته به نظر متخصص به صورت دوزهای ۲ تا ۳ مرحله‌ای تزریق می‌گردد. واکسن HPV برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم، واژن در دختران و زنان و همچنین برای جلوگیری از سرطان مقعد در زنان و مردان و زگیل‌های تناسلی در مردان و پسران توصیه می‌شود. تزریق این واکسن بويژه در سنین ۹ تا ۲۵ سال و قبل از شروع روابط جنسی توصیه می‌شود. در نظر داشته باشید که تاثیر این واکسن‌های پیشگیری نمی‌توانند عفونت HPV موجود را درمان کنند.

◦ غربالگری: غربالگری HPV بويژه در سنین ۵ تا ۴۹ سال به عنوان روش موثر پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم پیشنهاد می‌گردد.

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و راه‌های انتقال آن

- ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یک ویروس بدون پوشش و دارای ژنوم دورشته ای حلقوی از نوع DNA به طول ۸ Kb می‌باشد که سلول‌های پوستی و مخاطی را آلوده می‌کند. این ژنوم الگوی بیان شش پروتئین غیرساختاری و مسؤول تکثیر و پاتوژنی ویروس (E1, E2, L1, L2, E4, E5, E6 and E7) و دو پروتئین ساختاری (L1, L2) را کد می‌نماید. پروتئین‌های غیرساختاری در کراتینوسیت‌های غیرتمایز یافته و یا در حال تمایز بیان می‌شوند، در حالیکه بیان پروتئین‌های ساختاری تنها پس از تکمیل مراحل تمایز کراتینوسیت‌ها آغاز می‌شود.
- ویروس‌های پاپیلوما معمولاً از طریق تماس مستقیم پوست به پوست از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شوند. اکثر مردان و زنان مبتلا به HPV هیچ نشانه یا مشکلات سلامتی آشکاری را بروز نمی‌دهند.
- عفونت ویروس پاپیلومای انسانی برای ایجاد فرم تهاجمی سرطان سرویکس ضروری است. تقریباً تمام سرطان‌های سرویکس توسط عفونت ویروس HPV ایجاد می‌شوند. سرطان زایی ویروس پاپیلومای انسانی علاوه بر سرطان سرویکس در برخی سرطان‌های دیگر مانند واژن، آنال، حنجره، سینه و ریه نیز اثبات شده است.

◦ تا به امروز بیش از ۲۰۰ نوع پاپیلوما ویروس به طور کامل توالی یابی شده‌اند که قریب به ۴ نوع آن به بافت‌های دستگاه تناسلی تزوییسم دارند.

◦ پاپیلوما ویروس‌ها به دو زیرگروه می‌توانند تقسیم شوند:

* ۱- گروه کم خطر (Low-Risk HPV): این انواع زگیل پوستی و تناسلی، عفونت پاپیلومای حنجره و ضایعات خوش خیم دهانه رحم را ظاهر می‌نماید. شایعترین انواع کم خطر شامل HPV-6 و HPV-11 می‌باشد که عامل بیشترین موارد زگیل‌های تناسلی گزارش شده‌اند. این گروه از ویروس‌ها انکوژنیک نبوده ولی می‌توانند در صورت پایداری، محیط را برای تهاجم و تکثیر انواع انکوژنیک فراهم نمایند.

* ۲- گروه پر خطر (High-Risk HPV): این گروه قابلیت انکوژنیک بالایی دارند. حداقل ۱۴ ژنوتیپ (۱۶, ۱۸, ۳۱, ۳۳, ۳۵, ۳۹, ۴۵, ۵۱, ۵۲, ۵۶, ۵۸, ۵۹, ۶۸, ۸۲) از این ویروس می‌توانند سرطان سرویکس را ایجاد کنند. انواع پر خطر ویروس HPV با ۹۹ درصد موارد سرطان دهانه رحم (سرویکس) و ۹۵ درصد موارد سرطان مقعد در زنان مرتبط می‌باشند. عفونت با HPV پر خطر همچنین عامل سرطان penile در مردان و سرطان زبان، لوزه و حنجره (Oropharyngeal cancer) در هر دو جنس می‌باشد. شایعترین و مهاجم ترین انواع ویروس به ترتیب ژنوتیپ‌های HPV-16 و HPV-18 می‌باشند که مسؤول اکثریت موارد سرطان‌های سرویکس در سراسر جهان گزارش شده‌اند. این رو در بسیاری از برنامه‌های غربالگری سراسر دنیا در مرحله تریاژ، ژنوتایپینگ ۱۶ و ۱۸ پیشنهاد می‌شود. بدین معنا افرادی که از نظر آلودگی به ویروس مثبت تشخیص داده می‌شوند، برای حضور آلودگی به این دو ژنوتیپ می‌باشند بررسی گردند.



روش‌های غربالگری سرطان دهانه رحم

- آزمایش پاپ اسمیر (Pap Smear Test): آزمایش پاپ اسمیر از دهه ۱۹۴۰ به عنوان روش Gold Standard جهت تشخیص ضایعات پیش سرطانی برای غربالگری سرطان دهانه رحم پیشنهاد شد. آزمون پاپ اسمیر سلول‌های ناهنجار و پیش سرطانی را در داخل یا اطراف رحم شناسایی می‌کند. علی‌رغم موفقیت بررسی‌های غربالگری در سطح وسیع، انجام غربالگری با سیتولوزی به دلیل حساسیت کمتر و تشخیص دیرهنگام ارزش محدودی دارد. در غربالگری سرطان سرویکس به روش پاپ اسمیر دو خطای عمده باعث کاهش حساسیت آزمون می‌شود. اولین خطای در نمونه‌گیری است که ممکن است از ضایعه نمونه‌برداری نشود یا اگر نمونه هم برداشته شود به لام منتقل نشود. خطای بعدی در تشخیص است، هنگامی که سلول‌های بد خیم در نمونه وجود دارد ولی تشخیص داده نمی‌شوند همچنین این تست پس از بروز آسیب‌های سلولی قادر به تشخیص می‌باشد. تست پاپ اسمیر اگر به تنها یک تجویز گردد، هر سه سال یکبار می‌بایست انجام گیرد.
- آزمایش HPV (HPV Test): آزمایش HPV، در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به عنوان غربالگری اولیه سرطان دهانه رحم پذیرفته شد. این آزمایش عفونت ویروس پاپیلومای انسانی را از طریق حضور ماده ژنتیکی (DNA و یا RNA) در نمونه‌های انسانی سال‌ها قبل از بروز آسیب سلولی (۱۰ الی ۱۵ سال) و در مراحل بسیار ابتدایی تشخیص می‌دهد. در زنان بالای ۳۰ سال، این روش از حساسیت تشخیصی بسیار بالایی در مقایسه با آزمایش پاپ اسمیر برای تعیین استعداد ابتلاء به سرطان دهانه رحم برخوردار است تا با تشخیص به موقع، درمان موثر انجام گردد. آزمون مولکولی HPV هر ده سال یکبار پیشنهاد می‌گردد.

آزمایش HPV به چه افرادی توصیه می‌شود؟

- در زنان ۳۰-۴۹ سال انجام غربالگری با استفاده از آزمایش HPV هر ۵ الی ۱۰ سال یکبار توصیه شده است. انجام آزمایش غربالگری HPV و پاپ اسمیر برای زنان ۳۹-۵۹ سال حداقل هر ۱۰ سال یکبار ضروری می‌باشد.
- زنانی که هیسترکتونی انجام داده اند و رحم آنها برداشته شده است نیز نیاز به غربالگری جهت پیشگیری و تشخیص بهنگام سرطان دهانه رحم دارند.
- غربالگری با استفاده از آزمایش HPV در سنین زیر ۲۱ سال توصیه نمی‌شود. چراکه سیستم ایمنی در افراد بسیار جوان می‌تواند آلدگی HPV را زیین ببرد. همچنین زنان بالای ۶۵ سال که غربالگری‌های منظم داشته اند و نتایج آزمون HPV آن‌ها در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است و در معرض خطر ابتلاء سرطان دهانه رحم نیستند، نیازی به انجام غربالگری ندارند.
- در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی (مانند افراد مبتلا به HIV) و یا مبتلا به ضایعات پیش سرطانی و سرطان، انجام غربالگری از سنین زیر ۲۱ سال با روش پاپ اسمیر و زنان بالای ۲۱ سال از طریق آزمایش HPV ضروری می‌باشد.

برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح یک

تشخیص زودهنگام و انجام مراقبت و درمان بهنگام، مهمترین عامل کنترل سرطان دهانه رحم است. در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک یا مبتلا به سرطان دهانه رحم و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما که دوره اختصاصی تشخیص زودهنگام سرطان را دیده باشد، ارائه می‌شود. جزئیات وظایف ماما در دستورالعمل تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم ذکر شده است.


برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح دو

- افرادی که به هر دلیل به سطح دو یعنی متخصص زنان در بیمارستان یا مراکز تشخیص زودهنگام سرطان ارجاع می‌شوند، تحت ارزیابی‌های کامل تراز جمله ویژت متخصص و انجام کولپوسکوپی قرار می‌گیرند.
- افرادی که به دلیل علایم بالینی و معاینه غیرطبیعی و یا سابقه ابتلا به سرطان دهانه رحم و یا ضایعات بدخیم دهانه رحم و یا افرادی که آزمایش غربالگری برای آنها انجام شده و نتیجه آن برای ژنتیک‌های پر خطر ۱۶ و ۱۸ مثبت است و یا تست پاپ اسمر غیرطبیعی که آزمایش غربالگری برای آنها انجام شده و نتیجه آن برای آنها کولپوسکوپی انجام شود و اگر ضایعه مشکوک وجود داشت، در صورت نیاز نمونه‌برداری و همچنین اقدامات درمانی برای فرد انجام گیرد و در صورت نیاز فرد برای اقدامات تشخیصی درمانی به سطح سه یعنی بیمارستان تخصصی جهت جراحی ارجاع می‌شود.

تنها راه مطمئن تعیین این که فرد در چه مرحله‌ای از بیماری از مرحله پیش سرطان تا سرطان پیشرفته قرار دارد، نمونه‌برداری از آن توده است. این کار مستلزم برداشتن نمونه حین کولپوسکوپی و ارسال یه آزمایشگاه پاتوبیولوژی است تا در آزمایشگاه بر روی آن بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که آیا توده سرطانی است و اگر سرطانی می‌باشد از چه نوع و در چه مرحله‌ای است.

برنامه تشخیص و درمان سرطان دهانه رحم در ایران: سطح سه

سطح سه یا تخصصی معمولاً یک بیمارستان فوق تخصصی یا یک مرکز سرطان مجهرز به اتاق جراحی و بخش انکولوژی زنان است. در بیمارانی که به سطح سه می‌رسند تحت گاید کولپوسکوپی نواحی درگیر از طریق لوب الکتروسرجیکال (LEEP) یا کونیزاسیون با نایف برداشته می‌شود. نمونه برداشت شده ضمن جراحی برای پاتولوژی ارسال می‌شود و بر اساس نتایج پاتولوژی مارجین مناسب جراحی بررسی و برداشت می‌شود. ۸ هفته پس از جراحی فالو سرویکس برای بررسی ترمیم سرویکس انجام می‌شود و ارزیابی دوره‌ای بعدی هر ۶ ماه خواهد بود.



معاینه بالینی و مداخله بالینی در سرطان دهانه رحم (سرویکس)
A. کولپوسکوپی B. LEEP، روش اکسیزیون الکتروسرجیکال C. روش کونیزاسیون (مخروط‌برداری)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت، دفتر مدیریت بیماری‌های غیروگیر، اداره سرطان

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version




Islamic Republic of Iran

Ministry of Health and Medical Education
Deputy of Health, Non-Communicable Diseases
Control Department, Cancer Office



Protocols for National Program of Cancer Early Detection in Iran



Winter 2023