

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



راهنمای آموزش مادران باردار در مورد تغذیه با شیرمادر

بازنگری و تدوین بترتیب حروف الفبا:

دکتر سید حامد برکاتی، دکتر محمود راوری، دکتر ناهید عزالدین زنجانی سوسن سعدوندیان، دکتر خلیل فریور

ناشر: اندیشه ماندگار

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۴-۷۹-۸

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۷


تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه



**راهنمای آموزش
مادران باردار
در مورد
تغذیه با شیر مادر**

فهرست

۵	پیشگفتار.....
۷	مقدمه.....
۹	فصل اول - اهمیت و مزایای تغذیه با شیرمادر.....
۱۳	فصل دوم - برتری تغذیه با شیرمادر بر تغذیه مصنوعی.....
۱۷	فصل سوم - چگونگی شروع تغذیه با شیرمادر و تداوم آن.....
۲۳	فصل چهارم - وضعیت صحیح شیردهی
۲۷	فصل پنجم - دوشیدن شیرمادر، نحوه نگهداری و مصرف شیردشیده شده
۳۳	فصل ششم - اقدامات اولیه برای موفقیت شیردهی
۳۵	فصل هفتم - ضمیمه برای آگاهی کارکنان
۴۰	منابع



پیشگفتار

تغذیه با شیر مادر در سطح جهان می‌تواند جان شیرخواران را نجات داده و بار بیماری‌های کودکان و همچنین مادران را کاهش دهد و در ارتقا سلامت آنان نقش کلیدی دارد. ترویج تغذیه با شیر مادر از ارکان اساسی خدمات و مراقبت‌های بهداشتی مادر و شیرخوار محسوب می‌شود.

ملاقات‌های مادر در دوران بارداری و قبل از زایمان زمان بسیار مناسبی جهت حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر است. آموزش‌های قبل از تولد در مورد روش‌ها و اداره شیردهی بویژه اگر با حمایت‌های پس از زایمان همراه باشد سبب تغییرات موثر و مثبت از جمله شروع موفق شیردهی پس از زایمان، انحصاری بودن آن و تداوم شیردهی خواهد شد.

تدوین راهنمای کارکنان جهت آموزش مادران در دوره بارداری و کنترل کیفیت آموزش‌های ارائه شده به آنان ضرورتی برای موفقیت مادران در تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول و تداوم آن تا ۲ سالگی محسوب می‌شود.

راهنمای حاضر حاوی مطالب آموزشی ویژه مادران در مقطع بارداری است که نسخه اولیه آن در سال ۱۳۸۸ با تلاش همکاران معاونت بهداشتی وقت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از جمله خانم میترا هاشمی کارشناس برنامه کودکان، خانم مهوش امیر حکیمی کارشناس امور بهورزی با همکاری سایر کارشناسان بهداشت خانواده، مراکز بهداشت و مریبیان آموزشگاه بهورزی و کارکنان بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مازندران تهیه شد که توسط اداره سلامت کودکان با استفاده از رهنمودهای برخی از اعضاء کمیته کشوری شیر مادر سرکار خانم‌ها دکتر ناهید عزالدین زنجانی، دکتر سوسن پارسایی و دکتر بلقیس اولادی و توسط جناب آقای دکتر خلیل فریور و سرکار خانم سوسن سعدوندیان تکمیل، چاپ و توزیع شد که از آن موقع تاکنون با عنوان «راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی» مورد استفاده است. این راهنمای اینک با توجه به مطالب علمی روز بازنگری و در اختیار قرار می‌گیرد.

هدف این راهنمای ارتقا آگاهی و آماده کردن مادران باردار برای شیردهی و همچنین ارتقا عملکرد کارکنان عهده دار مراقبت‌های بهداشتی مادران و کودکان و مراقبین سلامت برای فراهم نمودن حمایت‌های ضروری و ارائه توصیه‌های لازم و استاندارد به مادران در طول بارداری، و نیز ایجاد انگیزه و تحکیم اعتماد به نفس و رفع نگرانی‌های مادران برای شروع و تداوم تغذیه با شیر مادر است تا دسترسی شیرخواران را به شیر مادران شان ارتقاده دهد. بعلاوه شناسایی مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی، به منظور ارائه حمایت‌های لازم در حین زایمان و پس از آن مد نظر است که موجب موفقیت بیشتر برای برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان و شروع تغذیه با شیر مادر در لحظات طلایی ساعت اول تولد می‌گردد که منجر به افزایش طول مدت شیردهی و ارتقاء سلامت مادر و کودک خواهد شد.

ضمنا از سرکار خانم فاطمه راهی مشاور شیردهی و کارشناس محترم پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ساوه برای در اختیار قرار دادن عکس‌های وضعیت‌های مختلف شیردهی تشكرو قدردانی می‌گردد.

مقدمه

علیرغم آنکه شیردهی یک فرآیند فیزیولوژیکی است، اما نباید تصور کرد که هر مادری به عنوان یک عمل طبیعی می‌تواند بدون آمادگی یا حمایت از عهده آن برآید، چون این تصور در مورد همه زنان صدق نمی‌کند. شیردهی موفق نیاز به آموزش، حمایت و نگرش مثبت در محیط زندگی مادر دارد. به ویژه که معمولاً یک سری پیام‌ها در جامعه از اجرای چنین رفتارهای طبیعی جلوگیری می‌کنند. لذا کارکنان نظام سلامت باید امکانات آموزش، حمایت و تشویق مناسب برای شیردهی را فراهم آورند.

در برخی فرهنگ‌ها آموزش و حمایت توسط مادر بزرگ‌ها، نزدیکان و سایر اقوام رایج است اما در جوامع مدرن نقش پدر مهم تر شده است و برنامه‌های آموزشی باید شامل پدران و تشویق آنها به درک مزایای تغذیه با شیرمادر و ضرورت حمایت از مادر باشد. آموزش زن باردار درباره تولد کودک و تغذیه با شیرمادر، بخش ضروری مراقبت خوب دوران بارداری و اقدام سوم از ده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک است. از طرفی می‌توان علاوه بر پدر، سایر اعضاء خانواده را نیز که قادر به حمایت تغذیه با شیرمادر هستند، آموزش داد.

کارکنان نظام سلامت اعم از متخصصین زنان، متخصصین کودکان، ماماهای پرستاران، مشاورین شیردهی و نیز گروه‌های حمایتی مادر و سازمان‌های مردمی نقش مهمی در آموزش و حمایت مادر در مراحل و سطوح مختلف دارند و بویژه اهمیت توصیه پزشکان راه را نگز نباید دست کم گرفت. فواید شیرمادر برای ارتقا سلامت، تلاش برای همکاری و هماهنگی حرفه‌ای در میان همه کارکنان نظام سلامت را می‌طلبند تا زنان و خانواده‌هایشان را برابر انتخاب تغذیه با شیرمادر آموزش داده و تشویق کنند.

اولین ویزیت دوران بارداری بهترین زمان جهت تشویق یا تقویت تصمیم مادر برای شیردهی و همچنین زمان مناسبی است که اجازه دهیم مادر مزایای شیرمادر و برتری آن بر شیر مصنوعی و اقدامات اولیه برای شیردهی موفق را بداند. اگر مادر باردار هنوز تصمیم به تغذیه با شیرمادر نگرفته باشد این ملاقات و ملاقات‌های بعدی می‌تواند فرصتی برای تصمیم گیری ایجاد کند.

امروزه با کوتاه تر شدن زمان بستری در بیمارستان ضروری است که زنان باردار با دانش پایه مناسب که در طول بارداری بدست آورده اند برای زایمان در بیمارستان حاضر شوند و این به ویژه در موفقیت اقدامات بیمارستانی و افزایش مدت شیردهی مؤثر است و بدین ترتیب آموزش‌ها در بیمارستان می‌توانند بیشتر بر جوانب عملی شیردهی مثل چگونگی پستان گرفتن و روش‌های شیردهی متمرکز گردد. سازمان جهانی بهداشت برای آموزش تغذیه با شیرمادر به مادران باردار، حداقل ۸ موضوع را تعیین کرده است. از جمله:

- فواید تغذیه با شیرمادر
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد و شروع شیرمادر ظرف ساعت اول
- اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد
- وضعیت صحیح شیردهی
- تغذیه بر حسب تقاضای شیرخوار
- راه پی بردن به کفایت شیرمادر

- تغذیه انحصاری با شیرمادر در ۶ ماه اول
- خطرات تغذیه مصنوعی

در فصول مختلف این کتاب، مطالب لازم در مورد موضوعات فوق بعلاوه نکات مهم دیگری (مثل کمیت و کیفیت آگوژ، نیاز نوزاد در روزهای اول و دوشیدن شیر و ...) برای شما کارکنان بهداشتی درمانی جهت آموزش مادران در بارداری بحث شده است. چنانچه مادر نسبت به این موارد آگاهی قبلی داشته باشد، پس از زایمان با اعتماد بنفس بیشتری نسبت به کفایت شیرش برای تامین نیازهای نوزاد، می‌تواند به شیردهی ادامه دهد و با کمک کارکنان دوشیدن را عمل تجربه نماید.

در نظر راست این کتاب راهنمایی ۴ جلسه به مادران در دوران بارداری آموزش داده شود، به گونه‌ای که آموزش‌ها براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت تا هفته ۳۲ بارداری پایان پذیرد. با توجه به توالی مراقبت‌های دوران بارداری در برنامه مادران به شرح ذیل:

- مراقبت اول: هفته ۱۰-۱۶ بارداری
- مراقبت دوم: هفته ۱۶-۲۰ بارداری
- مراقبت سوم: هفته ۲۶-۳۰ بارداری
- مراقبت چهارم: هفته ۳۱-۳۴ بارداری
- مراقبت پنجم: هفته ۳۵-۳۷ بارداری
- مراقبت‌های ششم تا هشتم: هفته ۳۸-۴۰ بارداری

آموزش‌های این مجموعه از مراقبت اول آغاز شود و در مراقبت چهارم پایان پذیرد. لازم است در مراقبت پنجم مروری بر آموزش‌های ارائه شده و اشاره به مطالب با توجه به نیازهای آموزشی مادر و کنترل آموخته‌های او انجام شود. با استفاده از روش‌ها و مهارت‌های برقراری ارتباط به مادر فرست بیان نگرانی‌ها داده شود تا مادر سئوالات خود را مطرح نموده و اطلاعات لازم را کسب نماید. برای موثر واقع شدن آموزش‌ها با توجه به بافت فرهنگی مناطق مختلف و سطح سواد مادران از وسائل کمک آموزشی در دسترس و تصاویر مرتبط استفاده شود.

ضروری است در هر مرحله از آموزش، چک لیست آموزش‌ها برای هر مادر تکمیل گردد و از حضور مادر در آموزش‌ها و کسب آگاهی‌های او اطمینان حاصل شود.

لازم به ذکر است که آموزش‌های شیردهی قبل از زایمان اگر به صورت کارگاهی اداره شود می‌تواند شروع شیردهی، تداوم آن و توانمندی مادر را به خوبی افزایش دهد. اگر در این آموزش‌ها از وسائل کمک آموزشی مانند عروسک مدل شیرخوار و پستان، فیلم‌های ویدئویی... استفاده شود موثرتر خواهد بود. آموزش گروهی قبل از زایمان، ملاقات‌های اختصاصی در مورد شیردهی، مشاوره با مادران موفق در شیردهی اقداماتی هستند که شانس شروع شیردهی از پستان، طول مدت و انحصاری بودن آن را افزایش می‌دهد.

شما کارکنان بهداشتی درمانی در حوزه بهداشت و درمان باید آگاه باشید که حمایت از تغذیه با شیرمادر که از دوران بارداری شروع می‌شود وقتی بیشترین اثر را دارد که همچون حلقه‌های یک زنجیره با اقدامات مناسب حین زایمان، آموزش‌های پس از تولد و هنگام ترخیص، مراقبت‌های دوره‌ای و مشاوره شیردهی و نیز مقابله با ترویج شیر مصنوعی همراه باشد. شما دست اندکاران مراقبت‌های بهداشتی که از اثرات منفی تبلیغات کمپانی‌های شیر مصنوعی آگاه هستید، تلاش برای حفاظت مادران در برابر بازاریابی و تبلیغات شیر مصنوعی یکی از وظایف مهم شماست تا مادران بتوانند با اعتماد به نفس و اطمینان به توانایی خود شیوه طبیعی تغذیه شیرخوار را انتخاب و با موفقیت عمل کنند.

فصل اول - اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر

اهداف آموزشی

- آگاهی از اهمیت تغذیه با شیر مادر در دین مبین اسلام
- شناخت مزایای تغذیه با شیر مادر برای مادر و خانواده
- شناخت مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک
- شناخت دیگر مزایای بی نظیر شیر مادر (تغییر ترکیبات شیر مادر در مراحل مختلف و در هر عده شیردهی، عوامل ایمنی بخش شیر مادر، ترکیب خاص شیر مادر برای نوزاد نارس...)

اهمیت تغذیه با شیر مادر در دین مبین اسلام: شیردادن عبادت است.

- مطالب مهمی در مورد تغذیه با شیر مادر و احکام آن، حدود ۱۴ قرن پیش در قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم ﷺ و معصومین علیهم السلام و نیز کتب فقهی که مطابق با توصیه‌ها و علم روز می‌باشد، بیان شده است.
- شیر مادر بویژه آغوز حق نوزاد و اولین تغذیه حلال و طیب از مائدہ الهی برای شیرخواران است. در قرآن کریم در ۸ آیه مستقیماً بحث شیر مادر مطرح شده که مهمترین آنها آیه ۲۳۳ سوره بقره است. طبق این آیه: مادرانی که می‌خواهند به نحو کامل به فرزندان خود شیردهنند، لازم است ۲ سال تمام آنها را از پستان خود شیردهند. اگر پدر و مادر با مشورت و رضایت یکدیگر خواستند کودک را زودتر از شیر بگیرند، گناهی برای آنها محسوب نمی‌شود و هر گاه خواستند برای شیردادن دایه بگیرند در صورتی که خوراک و پوشاش اوراد را در حد متعارف و نیکوتامین کنند مانع نیست... حتی در صورت طلاق لازم است پدر خوراک و پوشاش مادر را به طور شایسته در مدت شیردادن فراهم نماید.
- همچنین در این آیه برای والدات حق حضانت، حق دوچانبه شیردادن (هم برای رعایت حال فرزند و هم مادر)، حق رعایت عواطف مادر، بهره مند شدن از فواید و آثار فیزیولوژیک شیردادن ذکر شده است.
- حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: حد واجب شیردادن ۲۱ ماه است و آنچه از آن کم شود به کودک ستم شده است و اگر اراده اتمام دوران شیردهی را دارد دوسال کامل مطلوب است....، زن در دوران بارداری، زایمان، شیردادن، اجر مجاهد در راه خدا را دارد و اگر در این زمان از دنیا برود برای او اجر شهید است.
- هر گاه برای مادر، حدی لازم شود اجرای حکم تا پایان دوره شیردهی به تأخیر می‌افتد.
- در دوران شیردهی روزه ماه رمضان، بدون پرداخت کفاره به تأخیر می‌افتد و مادر پس از پایان شیردهی روزه خواهد گرفت.
- حضرت رسول اکرم ﷺ می‌فرماید: بیدار شدن مادر و شیردادن او در شب، ثواب و اجری دارد و برای هر جرعة

شیری که می‌دهد، پاداش او معادل است با آنکه هفتاد بنده را در راه خدا آزاد کرده است...، خداوند متعال روزی کودک را در دوپستان مادر قرار داده است. در بخشی آب و در بخش دیگر غذای او را واز هنگام ولادت کودک به تناسب نیاز هر روز وی، روزی متناسب آن روز او را مقرر فرموده است.

مزایای شیردهی برای مادر و خانواده

تغذیه با شیر مادر بر سلامت حال و آینده مادر و کودک اثرات بسیار مهمی دارد. هم عمل شیردهی از پستان و هم تغذیه با شیر مادر حائز اهمیت است.

- مکیدن پستان بلا فاصله بعد از تولد توسط نوزاد موجب جمع شدن رحم و در نتیجه کاهش خونریزی و کاهش کم خونی مادر می‌شود.
- مادرانی که شیر می‌دهند کمتر دچار سرطان پستان و تخمدان و دهانه رحم می‌شوند.
- مادرانی که شیر می‌دهند، به واسطه مصرف شدن تدریجی مقدار چربی که در دوران بارداری در بدن آنان ذخیره شده، زودتر به وزن قبل از بارداری خود بر می‌گردند و در نتیجه چاقی در آنان کمتر است. شیردهی اثر نامطلوب بر تغییر اندام مادر و اندازه پستان ندارد.
- مادرانی که شیر می‌دهند در هنگام کھولت به پوکی استخوان و شکستگی استخوان ران که در افراد مسن شایع است، گرفتار نمی‌شوند. بعلاوه با شیردهی احتمال بروز عود آرتریت روماتویید و MS کاهش می‌یابد.
- قند خون مادر بهتر کنترل می‌شود و به پیشگیری از دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.
- مادرانی که شیر می‌دهند در خانه و هنگام مسافرت برای تغذیه شیرخوار راحت تر هستند و کمتر دچار استرس و اضطراب می‌شوند.
- تغذیه با شیر مادر منجر به ایجاد رابطه عاطفی مستحکم و دو طرفه بین مادر و فرزند می‌گردد و هر دو از نظر عاطفی ارضامی شوند و احتمال کودک آزاری و خشونت مادر خیلی کمتر می‌شود، این مادران طفل خود را به فرزند خواندگی نمی‌سپارند و سرراه نمی‌گذارند.
- در ۶ ماه اول بعد از زایمان اگر تغذیه با شیر مادر بطور احصاری و مکرر در روز و شب صورت گیرد و عادت ماهیانه مادر هنوز شروع نشده باشد، و از دادن مایعات و سایر شیرها به شیرخوار پرهیز شود، حاملگی مادر به تعویق می‌افتد.
- مادرانی که شیر می‌دهند به دلیل ترشح هورمون اکسی توسمین، از امنیت خاطر و شادابی بیشتری برخوردار بوده و کمتر افسرده می‌شوند.
- به لحاظ سالم بودن کودک و کمتر بیمار شدن او؛ صرف وقت و مراجعه مادر به مرکز درمانی کمتر است و هزینه‌ای که برای درمان بیماری و یا خرید تغذیه جایگزین لازم است، برای خانواده پس انداز می‌شود. بعلاوه مادر شاغل نیز کمتر از کار غیبت می‌کند.

مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک

- تغذیه با شیر مادر سبب رشد و تکامل مطلوب و بقاء کودک می‌شود.
- شیر روزهای اول (کلستروم، آگوز یا ماک) بسیار مغذی و حاوی بیشترین مواد ایمنی بخش و حفاظتی برای مقابله در برابر بیماری‌ها است که اولین ایمن سازی کودک محسوب می‌شود. آگوز ملین است و به دفع مدفوع سیاه و چسبنده ابتدایی (مکونیوم) کمک کرده و از زردی نوزاد پیشگیری می‌کند.
- تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفی صمیمی بین مادر و فرزند فراهم می‌کند که منجر به ارتقا تکامل عاطفی روانی

- کودک شده و در دوران بلوغ موجب امنیت روانی بیشتری می‌گردد.
- شروع شیر مادر در ساعت اول تولد، امکان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد را تسهیل می‌نماید و این در گرم نگهداشتن و بهبود رشد و تکامل بویژه برای نوزادان نارس و بیمار نقش حیاتی دارد.
- شیر مادر تمام نیازهای تغذیه‌ای شیرخواران را در ۶ ماه اول تأمین می‌کند و شیرخوار حتی به آب هم نیاز ندارد.
- هضم شیر مادر بسیار خوب و آسان است و شیرخواران بویژه نوزادان زود به زود گرسنه می‌شوند و هر ۲-۵ ساعت یکبار و گاه بیشتر به تغذیه از پستان نیاز دارند.
- تغذیه با شیر مادر بروز سرطان‌های دوران کودکی، آسم، اگزما، آلرژی و بسیاری بیماری‌های دیگر را کاهش می‌دهد.
- شیر مادر از سوء تغذیه پیشگیری می‌کند و احتمال چاقی کودک و چاقی مراحل بعدی زندگی در آینده را کاهش می‌دهد.
- شیر مادر احتمال بروز دیابت نوجوانان، پرفشاری خون و چاقی که نشانگرهای بیماری‌های قلبی و عروقی در سنین بزرگسالی هستند را کاهش می‌دهد.
- مرگ ناگهانی در کودکانی که شیر مادر می‌خورند، بسیار کمتر است.
- تکامل بینایی و تکامل راه رفتن در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌شوند، خیلی سریع تر است.
- ضریب هوشی در کودکانی که شیر مادر می‌خورند، بالاتر است.
- ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار و نیازهای تغذیه‌ای و در هر وعده شیردهی تغییر می‌کند.
- تغذیه با شیر مادر منجر به کاهش بروز عفونت‌های تنفسی می‌گردد و از عفونت‌های کلیه و مجرای ادراری نیز پیشگیری می‌کند.
- مرگ و میرناشی از عفونت‌های گوارشی و بیماری‌های اسهالی در بین شیرخوارانی که مستقیماً از پستان مادر تغذیه می‌کنند تا ۲۵ برابر کمتر از شیرخوارانی است که با شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند. ضمن اینکه میزان ابتلاء به اسهال و بیماری‌های انگلی نیز در آنان کمتر است.
- کودکی که با شیر مادر تغذیه می‌شود، کمتر دچار ناهنجاری‌های فک، رویش نابجا و پوسیدگی دندان‌ها می‌شود.
- تغذیه با پستان مادر به دلیل عملکرد زبان و عضلات دهانی صورت، تکامل دهان را تقویت نموده و این امر بویژه برای شیرخوارانی که مشکل ضعف عضلانی دارند مفید است. سلامت دهان و دندان، کاهش عفونت گوش و تکلم سلیس تراز مزایای تغذیه از پستان مادر است.

دیگر مزایای بی نظیر شیر مادر: شیر مادر بی نظیر و مناسب‌ترین تغذیه برای شیرخواران است

تغییرات ترکیب شیر مادر در مراحل مختلف و در هر وعده شیردهی:

- ترکیب شیر مادر بر حسب سن و نیاز شیرخوار و همچنین از شروع تا پایان هر وعده تغذیه با شیر مادر، مابین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز تغییر می‌کند.
- کلستروم یا آغوز که از ماه هفتم بارداری در پستان‌ها تولید می‌شود و در ۲-۳ روز اول پس از زایمان ادامه می‌یابد، بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش فراوان است و برای محافظت نوزاد در برابر بیماری‌ها حیاتی است. میزان آغوز کم است اما برای معده خیلی کوچک نوزاد کافی و مناسب می‌باشد. بعلاوه کلیه‌های نوزاد هنوز تکامل لازم را پیدا نکرده‌اند تا از عهده دفع زیاد برآیند.
- پس از آغوز، شیر انتقالی از ۷ تا ۱۰ روز پس از تولد و سپس شیر رسیده ترشح می‌شود. تمام مواد مغذی مورد

نیاز شیرخوار و موادی که به هضم، رشد و تکامل و پیشگیری از عفونت‌ها کمک می‌کند، در شیرمادر موجود است و با تغذیه مکرر شیرخوار بر حسب نیازوی، تولید آن افزایش می‌یابد و به تنها یا تا پایان ۶ ماهگی نیازهای شیرخوار را تامین و امکان بهترین الگوی رشد کودک را فراهم می‌کند.

- شیرمادر در ابتدای هروعده (شیرپیشین) آبکی و روشن تر بنظر می‌رسد اما به تدریج که شیرخوار به مکیدن ادامه می‌دهد، چربی شیرتر شده (شیرپسین) بیشتر از ۳ برابر شیر اول می‌شود که غنی از انرژی و سفید رنگ است و به سیرشدن شیرخوار و وزن‌گیری او کمک می‌کند.

عوامل ایمنی بخش شیرمادر بی نظیر است:

- ورود انواع عوامل بیماری‌زای موجود در محیط زندگی به دستگاه گوارش و تنفس مادر، سبب ساخت پادتن‌های اختصاصی بر علیه عوامل بیماری‌زا می‌شود. این مواد از طریق شیرمادر به شیرخوار می‌رسند بنابراین شیرخوار پیوسته از پادتن‌های حفاظتی برخوردار است و تجویز هرنوع شیر مصنوعی یا مایعات دیگر حتی به مقدار کم می‌تواند این مکانیسم حفاظتی را مختل کند.
شیرمادر برای نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد:
- شیرمادری که نوزادش قبل از ۷ هفته بارداری به دنیا می‌آید حاوی پروتئین و چربی بیشتر و میزان بالاتری مواد معدنی شامل آهن و عوامل ایمنی بخش بیشتری نسبت به شیر نوزاد رسیده است که برای تامین نیازهای نوزاد نارس مناسب تر است.
- نوزادان نارس حتی قبل از آنکه بتوانند مستقیم پستان مادر را دردهان بگیرند، می‌توانند با شیرمادر تغذیه شوند. در این موارد مادر می‌تواند بر حسب شرایط نوزاد نارس، او را زیرپستان گذاشته و شیر را دردهان او بدوشد و یا شیر دوشیده شده را با قاشق، فیجان یا لوله معده به او بدهند.

شیرمادر دارای همه مواد مورد نیاز شیرخوار با نسبت‌های صحیح همراه با مواد ایمنی بخش می‌باشد و به عنوان غذایی بی نظیر برای تغذیه شیرخواران شناخته شده است. تنها و بهترین جایگزین شیرمادر، شیر دایه است.

فصل دوم - برتری تغذیه با شیر مادر بر تغذیه مصنوعی

اهداف آموزشی:

- شناخت اختلافات عمدۀ ترکیب شیر مادر و شیر مصنوعی و برتری شیر مادر
- خطرات تغذیه مصنوعی
- خطرات تغذیه با بطری و استفاده از گول زنک

شناخت اختلافات عمدۀ ترکیب شیر مادر و شیر مصنوعی و برتری شیر مادر

شیر مصنوعی عموماً از شیر گاو تهیه می شود و اختلافات بسیار زیادی با شیر مادر دارد:

تفاوت شیر مادر با شیر گاو

- شیر مادر حاوی انواع سلول های زنده دفاعی و عوامل مهم حفاظتی و ضد میکروبی است که شیر گاو و در نتیجه شیر مصنوعی قادر آن می باشد.
- میزان پروتئین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده اند آسیب نمی رساند ولی شیر گاو پروتئین بیشتری دارد و دفع مقادیر اضافی برای کلیه های نارس نوزاد دشوار است. رشد شیرخوار انسان نسبت به شیرخوار سایر پستانداران کندتر است لذا به پروتئین کمتری نیاز دارد. بعلاوه ترکیب پروتئین شیر گاو نیز مناسب با نیاز شیرخوار انسان نیست، بطوري که پروتئین شیر گاو بیشتر از نوعی است که در معده شیرخوار بصورت غیرقابل هضم درمی آید اما پروتئین شیر انسان ضعیفونت و هضم آن آسان است.
- مقدار آب موجود در شیر مادر کافی است و شیرخواران در ۶ ماه اول حتی در آب و هوای گرم نیاز به آب اضافی ندارند. اما شیرخوارانی که با شیر گاو تغذیه می شوند به علت دریافت مقادیر زیادی از نمک ها نیاز به آب اضافی دارند و دفع نمک های اضافی برای کلیه های آنها مشکل است.
- ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغز، چشم و سلامت عروقی شیرخوار بی نظیر است و بهتر از سایر شیرها هضم و جذب می شود، در حالی که مقدار چربی غیر اشبع شیر گاو بالا است و بدن را با مشکل افزایش کلسیم کلسترون در سال های بعد مواجه می کند.
- جذب املاح مثل کلسیم، آهن و روی شیر مادر بیشتر از شیر گاو است. حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد آهن شیر مادر جذب بدن شیرخوار می شود، در حالی که جذب آهن شیر گاو خیلی ناچیز است. بطوري کلی مواد معدنی در شیر مادر برای تأمین نیاز شیرخوار کافی است.
- ویتامین های شیر گاو کمتر از شیر مادر است، جذب ویتامین های شیر مادر نیز بهتر است.

خطرات تغذیه مصنوعی

- شیرخوارانی که با شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های تنفسی و گوارشی (اسهال و استفراغ، دل دردهای قولنجی و جمع شدن گاز)، عفونت گوش، عفونت ادراری، منثیت، اگزما، آسم و... قرار دارند.
- با مصرف شیر مصنوعی احتمال ابتلاء به چاقی، بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری قند در بزرگسالی بیشتر می‌شود.
- ترکیب شیر مصنوعی یکسان است و همانند شیر مادر در هروعده و با رشد شیرخوار بر حسب نیازهای او تغییر نمی‌کند و الگوی رشد و تکامل مناسب کودک را فراهم نمی‌کند.
- کودکان از فواید عاطفی تغذیه با شیر مادر و امنیت روانی ناشی از آن در دوران بلوغ محروم می‌شوند و این امر بر تکامل روانی اجتماعی کودک در آینده تاثیر می‌گذارد.
- شیرخوار از فواید شیر مادر در ارتقاء بهره هوشی نیز محروم می‌شود.
- شیر مصنوعی در هنگام تهیه به سهولت آلوده می‌شود و یا اگر سریع مصرف نشود فاسد می‌گردد و این احتمال ابتلاء به بیماری‌های گوارشی را افزایش می‌دهد.
- طرز تهیه نادرست یعنی رقیق یا غلیظ درست کردن شیر مصنوعی کودک را با دریافت ناکافی یا زیاد مواد مغذی (سوء تغذیه و چاقی) مواجه می‌کند.
- مادر از فواید شیردهی (وضع روحی روانی بهتر، دیر شروع شدن عادت ماهانه و تاخیر حاملگی مجدد، از دست دادن وزن اضافی، کاهش ابتلاء به سرطان پستان و تخم丹 و شکستگی لگن، کاهش پوکی استخوان، بیماری قند و MS...) محروم می‌گردد.
- هزینه خرید شیر مصنوعی چندین برابر هزینه مورد نیاز برای تغذیه مطلوب مادر است، علاوه هزینه بیشتر بیمار شدن کودک به خانواده تحمیل می‌شود.
- تولید و مصرف شیر مصنوعی سبب آلودگی محیط زیست می‌شود. شیر مصنوعی نیاز به بسته بندی و حمل و نقل دارد و مصرف آن نیاز به بطری و سرشیشه، آب سالم و سوخت دارد که علاوه بر تحمیل بار مالی به خانواده و مراجعات بیشتر درمانی، موجب آلودگی محیط زیست و صرف منابع طبیعی می‌گردد.

خطرات استفاده از گول زنک و بطی

- نحوه مکیدن گول زنک و بطی با مکیدن پستان مادر متفاوت است. بویژه در ماه‌های اول سبب سردگمی شیرخوار در مکیدن و امتناع از گرفتن پستان و در نتیجه کاهش تحریک پستان و کاهش تولید شیر و درنهایت قطع شیر مادر می‌شود.
- استفاده از گول زنک خطر عفونت گوش میانی، عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان را افزایش می‌دهد.
- استفاده از گول زنک با حرکات غیرطبیعی و تداخل در رشد طبیعی فک و دهان موجب رشد نامناسب دندان‌ها و در نتیجه سبب جفت نشدن دندان‌ها می‌شود.
- گول زنک بر تمايل کودک برای تقلید صدای هوشمندی او اثر سوء دارد و باعث وابستگی مدام می‌شود و تکامل اجتماعی را با اشکال مواجه می‌کند.



سایر مشکلات عبارتند از:

- خس خس سینه، سرفه و اختلال در تنفس
- اسهال و استفراغ
- تب و کولیک (دل درد قولنجی)
- وزن گیری ناکافی
- احتمال جدا شدن لاستیک گول زنک و خفگی و پیدایش آرژی به لاستیک آن
- اختلال خواب بدلیل بیرون افتادن گول زنک از دهان
- افزایش احتمال حاملگی زودرس به دلیل کمتر شدن میل شیرخوار به مکیدن پستان

در صورت محرومیت شیرخوار از شیر مادر به هر چهلت از جمله در بحران‌ها و مواقع اضطراری

بهترین جایگزین برای تغذیه کودک، شیر مادر دیگر (شیر دایه) است.

فصل سوم- چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تداوم آن

اهداف آموزشی:

- شناخت مزایای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافصله پس از زایمان
- شناخت مزایای شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
- شناخت مزایای هم اتاقی مادر و نوزاد
- شناخت روش صحیح تغذیه با شیر مادر (دفعات و مدت شیرخوردن در هر عده، تغذیه انحصاری با شیر مادر، تداوم شیردهی...)
- شناخت نشانه های گرسنگی و سیری شیرخوار
- شناخت علائم کفایت شیر مادر

مزایای تماس پوست مادر و نوزاد بلافصله پس از تولد

- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافصله پس از تولد، نوزاد را گرم نگاه داشته و از کاهش دمای بدن نوزاد بoviژه نوزاد نارس و کم وزن جلوگیری می کند.
- سبب آرامش مادر و نوزاد می شود.
- پیوند عاطفی مادر و کودک را تسريع و تسهیل می کند.
- تعداد تنفس و ضربان قلب نوزاد را منظم می کند و باعث ثبات قند خون می شود.
- نوزاد با میکروب های بدن مادر که برای او بیماری زانیست، آشنا شده و در نتیجه دفاع بدنش بهتر می شود.
- گریه نوزاد و استرس و صرف انرژی او کاهش می یابد.
- به نوزاد اجازه می دهد پستان را پیدا کند و اولین تغذیه از پستان را شروع کند. به شروع موفق تغذیه انحصاری با شیر مادر کمک می کند.
- از مرگ و میر نوزادان پیشگیری می کند.

مزایای شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد:

بهترین زمان شروع تغذیه با شیر مادر، طی ساعت اول تولد است زیرا نوزادان در این هنگام بسیار هشیار و فعال هستند. پس از زایمان طبیعی و یا سزرارین با بی حسی موضعی غالب تغذیه با شیر مادر را می توان بلافصله شروع کرد. پس از سزرارین با بیهودی عمومی، تغذیه با شیر مادر به محض هشیاری مادر انجام می شود.

- نوزاد سالم نیاز به هیچ نوع غذا یا آشامیدنی ندارد و باید اولین تغذیه او با شیر مادر (آغوز) شروع شود.
- با شروع شیردهی در ساعت اول تولد نوزاد آغوز را دریافت می کند که بسیار مغذی و ایمنی بخش است و به تولید

شیرکافی برای تغذیه بعدی کمک می‌کند. تغذیه مکرر با آغوز یا کلستروم در روزهای اول تمام نیازهای تغذیه‌ای نوزادان را بطرف می‌کند.

- نوزادانی که پس از تولد خیلی زود تغذیه می‌شوند ممکن است در وضعیت صحیح را راحت‌تر آموخته و مدت طولانی‌تری با شیر مادر تغذیه می‌شوند و احتمال بروز مشکلاتی که منجر به توقف تغذیه آنها با شیر مادر در هفته‌های اول زندگی شود، بسیار کمتر است.
- باعث کاهش قابل توجه مرگ و میر نوزادان می‌شود. برای نوزاد کم وزن مفیدتر است چون احتمال مرگ و میر آنها بیشتر است و هنگام تولد به حمایت بیشتری نیاز دارند.
- نوزادانی که بعد از تولد، موادی غیر از شیر مادر دریافت می‌کنند، ممکن است پستان مادر را نگیرند و احتمال مواجه شدن با مشکلات تغذیه‌ای و توقف تغذیه آنها با شیر مادر بیشتر است. حتی یک یا دوبار تغذیه نوزاد آب قند می‌تواند در تغذیه با شیر مادر و سلامت نوزاد تداخل ایجاد کند.
- با انقباض رحم، خروج جفت و کاهش خونریزی مادر همراه است.

هم اتاقی مادر و نوزاد

هم اتاقی مادر و نوزاد مزایای بسیاری دارد که باید مادر بداند. در بیمارستان مادر و نوزاد در یک اتاق و در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند، مادر در خانه نیز باید فرزندش را در کنار خود نگهدارد زیرا:

- شیرخوار بهتر می‌خوابد و کمتر گریه می‌کند.
- تغذیه با شیر مادر به خوبی برقرار می‌شود و به مدت طولانی‌تری ادامه می‌یابد و وزن گیری شیرخوار سریع تر است.
- شیردهی در پاسخ به رفتارهای شیرخوار سریع ترانجام می‌شود و این موجب افزایش تولید شیر مادر می‌شود.
- مادر در مراقبت از فرزندش اعتماد به نفس پیدا می‌کند.
- مادر می‌تواند ببیند که فرزندش خوب و سالم است (در صورت جدایی نوزاد صدای گریه او از اتاق نوزادان موجب نگرانی مادر می‌شود).
- چنانچه نوزاد نزد مادر باشد نسبت به اینکه در اتاق نوزاد نگهداری شود، کمتر در معرض خطر عفونت‌ها قرار می‌گیرد.
- سبب ارتقا پیوند عاطفی مادر و نوزاد می‌شود.

روش صحیح تغذیه با شیر مادر

بهداشت پستان‌ها

- قبل از تغذیه شیرخوار و یا دوشیدن شیر شستشوی دست‌های مادر با آب و صابون لازم است اما شستشوی پستان لازم نیست و استحمام روزانه مادر کافی است. طی استحمام نیز نباید نوک پستان و هاله با صابون شسته شود چون سبب خشکی و زخم شدن آن می‌شود.

زمان شروع تغذیه با شیر مادر

- پس از تولد باید نوزاد بلا فاصله روی قفسه سینه مادر در تماس پوست با او قرار گیرد و مادر ظرف یک ساعت اول زایمان با مشاهده علائم آمادگی نوزاد، اولین شیردهی را شروع کند. همانطور که گفته شد شیر روزهای اول یا آغاز برای تغذیه نوزاد و پیشگیری از ابتلا او به انواع بیماری‌ها حیاتی است.

تعداد دفعات تغذیه با شیر مادر و مدت تغذیه در هر عده

- تغذیه با شیر مادر باید بطور مکرر و بحسب تقاضای شیرخوار انجام شود، در نوزادان و تا سن ۶-۸ هفتگی که زمان استقرار شیردهی است دفعات تغذیه با شیر مادر ۱۰-۱۲ بار یا بیشتر در شبانه روز معمول است و نباید کمتر از ۸ بار باشد.
 - مدت تغذیه شیرخوار در هر عده نباید محدود شود زیرا شیر کافی دریافت نخواهد کرد و تولید شیر مادر نیز کاهش می‌یابد، پس باید اجازه داد به شیرخوردن ادامه دهد و خود پستان را رها کند. معمولاً نوزادان رسیده ۱۵-۲۰ دقیقه یا بیشتر بشرط آنکه پستان را به خوبی گرفته باشند، از هر پستان می‌کنند. اما برخی شیرخواران هم‌زمان با کسب مهارت زودتر تمام می‌کنند.
- مهمترین عامل در افزایش شیر مادر، مکیدن مکرر، صحیح و موثر و تخلیه مرتب پستان‌ها بر حسب میل و تقاضای شیرخوار در شب و روز می‌باشد که از بروز مشکلات پستانی مانند احتقان و زخم نوک پستان جلوگیری می‌کند. اگر مادری دو قلو داشته باشد و هردو قل را هم‌زمان برای مکیدن به پستان بگذارد، پستان‌ها شیر بیشتری تولید می‌کنند. در صورت جدایی مادر و شیرخوار به هر علت و عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان، شیر باید دوشیده شده و به کمک فنجان و یا قاشق به شیرخوار داده شود تا هم شیرخوار از شیر مادر محروم نگردد و هم تولید شیر ادامه یابد.

در صورت بروز مشکلات پستانی مانند احتقان، درد، زخم و شقاق نوک پستان که معمولاً علت آن پستان گرفتن نادرست و یا کشیدن پستان از دهان شیرخوار است، توصیه می‌شود مادر ضمن ادامه شیردهی برای گرفتن کمک و آموزش عملی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نماید.

نکته مهم: پیشگیری از احتقان و مشکلات بعدی

شروع شیردهی بلا فاصله پس از زایمان و شیردهی مکرر بحسب تقاضای شیرخوار در وضعیت صحیح، به جریان یافتن سریع ترشیم‌دار و برقراری آن و همچنین پیشگیری از بروز احتقان پستان و مشکلات بعدی کمک می‌کند.

تفاوت پستان پر و محتقن: پستان محتقن با پستان پر متفاوت است، در روزهای اول پس از زایمان که شیر مادر رو به افزایش است، بعد از ۳-۴ روز هردو پستان ممکن است گرم و سنگین شوند وقتی شیرخوار با مکیدن‌های مکرر به تخلیه شیر از پستان کمک کند، بعد از چند بار تغذیه، حالت سنگینی و احساس سفتی و پری پستان بهتر می‌شود. اما پستان‌های محتقن فوق العاده در دنک اند، پوست آنها کشیده و براق و ممکن است قرمزنگ باشد. شیر خوب جریان ندارد و شیرخوار هنگام شیرخوردن دچار مشکل می‌شود و ممکن است مادر تدبی داشته باشد. بهترین درمان احتقان پستان نیز تخلیه شیر از پستان با مکیدن شیرخوار یا بوسیله دوشیدن شیر است. برای اینکه شیرخوار بتواند پستان را بگیرد باید هاله پستان را با کمی دوشیدن یا فشردن به عقب نم کرد.

تغذیه از هردو پستان

- شیرخوار باید در هفته‌های اول زندگی تا زمان برقراری کامل شیر مادر و اطمینان از مناسب بودن منحنی رشد، در هر عده از هردو پستان و بحسب میل و تقاضای شیر تغذیه شود. باید به طفل اجازه داد تا شیر چرب انتهایی که باعث وزن گیری بهتر او می‌شود را دریافت نماید و خودش پستان را رها کند، سپس مادر پستان دیگر را به او عرضه کند تا اگر تمایل به مکیدن داشت از پستان دوم نیز تغذیه شود.
- در عده بعد، شیردادن باید از پستانی شروع شود که شیرخوار در عده قبل کمتر از آن شیرخوردگی یا اصلاً نخورده است.

تغذیه انحصاری با شیر مادر

- تغذیه انحصاری با شیر مادر یعنی شیرخوار از تولد تا پایان ۶ ماهگی فقط با شیر مادر تغذیه شود. شیر مادر به تنها یی برای تامین نیازهای او کافی است و به هیچ وجه نباید آب، آب قند، شیر مصنوعی و یا جوشاندها و سایر مایعات دیگر و مواد گیاهی سنتی را به شیرخوار داد. فقط دادن قطره ویتامین (AD) از ۳-۵ روزگی توصیه می‌شود.
- از بطری و پستانک (گول زنک) نباید استفاده شود. زیرا سبب کاهش میل مکیدن پستان و کم شدن شیر مادر، انتقال آلوگی، عفونت و بیماری، تغییر فرم دندان‌ها و قالب فک شیرخوار می‌گردد.
- در تغذیه انحصاری با شیر مادر دفعات تغذیه و مدت مکیدن در هر روزه نباید محدود شود. تغذیه بطور مکرر در روز و شب مطابق نیاز شیرخوار بیدار نشود. اگر شیرخوار بیدار نشود باید بعد از ۳ ساعت او را بیدار کرده و شیر بدنه‌ند تا با تغذیه مکرر وی جریان شیر برقرار شود.

تغذیه با شیر مادر در روزهای اول تولد

- مادر باردار باید از مقدار آغوز و حجم معده نوزاد در روزهای اول تولد و ضرورت تغذیه مکرروی آگاه باشد، در این صورت آمادگی لازم را پس از تولد نوزاد برای شیردهی مکرر دارد و با تصور ناکافی بودن شیرش، شیر کمکی را خودسرانه در روزهای اول شروع نخواهد کرد.
- یکی دو روز اول پس از زایمان پستان‌ها مقدار کمی کلسیتروم یا آغوز به اندازه حجم معده و نیاز نوزاد تولید می‌کنند. اما بعد از چند روز (۴۰-۳۵ ساعت) ترشح شیر بیشتر می‌شود. اگر به نوزاد اجازه داده شود بلافاصله بعد از تولد پستان مادر را بمکد، افزایش شیر مادر سریع تر رخ می‌دهد.
- میزان آغوز برای معده خیلی کوچک نوزاد که در روز اول تولد به اندازه یک تیله بزرگ و در روز سوم به اندازه یک توپ پینگ پونگ است، کافی و مناسب می‌باشد.
- تغذیه مکرر نوزاد با شیر مادر، با توجه به حجم معده او که در روز دهم به اندازه یک تخم مرغ بزرگ و در روز سی ام (به اندازه ۱۲۰-۱۵۰ سی سی) می‌شود، نیازهای تغذیه‌ای وی را تامین می‌نماید.
- ویزیت ۳-۵ روزگی نوزاد برای ارزیابی وضعیت سلامت و کفایت تغذیه نوزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این ویزیت تأکید می‌شود مادر شخصاً نوزادش را همراهی کند. چون نحوه شیردهی مادر مشاهده و ارزیابی می‌شود و در صورت لزوم، برای رفع مشکل احتمالی و تدام موفق شیردهی راهنمایی می‌شود.

روز اول
به اندازه تیله بزرگ ۵-۷ سی سی
تولید شیر مادر حداقل ۷ سی سی در هر نوبت
متوسط در رات شیر در هر نوبت تغذیه ۱-۷ سی سی

روز سوم
به اندازه توپ پینگ پونگ ۲۴-۳۶ سی سی
تولید شیر مادر حداقل ۳۸ سی سی در هر نوبت
متوسط در رات شیر در هر نوبت تغذیه ۱۵-۳۰ سی سی

روز دهم
به اندازه تخم مرغ بزرگ ۸۱-۹۰ سی سی
تولید شیر مادر از روز یجم حداقل ۱۷ سی سی در هر نوبت
روزهای ام ۱۲-۱۵ سی سی
تولید شیر مادر از ده ۷۵-۱۰۵ سی سی روزانه

تداوم تغذیه با شیر مادر

- از پایان ۶ ماهگی به بعد باید تغذیه با شیر مادر همراه با شروع غذاهای کمکی ادامه یابد. در سال دوم عمر نیز شیر مادر نقش اساسی در تامین نیازهای شیرخوار همراه با غذاهای خانواده دارد.
- شیر مادر تا پایان ۲ سالگی باید ادامه یابد و سپس در صورت تمایل شیرخوار می‌توان او را به تدریج از شیر گرفت.

نشانه‌های گرسنگی و سیری شیرخوار

- مادر باید به نشانه‌های گرسنگی و تمایل شیرخوار برای تغذیه از جمله: حرکت کرده چشم، بهم زدن پلک‌ها، نگاه کردن به اطراف، حرکات دهان و اندام‌ها، مکیدن انگشتان و بردن هر چیزی به دهان توجه نماید و صبر نکند تا شیرخوار بخاطر گرسنگی گریه کند. چون گریه و جیغ و کمانه زدن علامت دیررس گرسنگی وزجر شیرخوار است.
- شیرخوار هنگامی که سیرشود دفعات مکیدن او کم و با فاصله بیشتر و غیر تغذیه‌ای شده، صدای بلع او کم و متوقف می‌شود، علائم گرسنگی برطرف می‌شود و با احساس راحتی و رضایت، به خواب می‌رود و خودش پستان را رها می‌کند و نیازی به خارج کردن پستان از دهان او نیست.

علائم کفایت شیر مادر

کفایت تغذیه شیرخوار با شیر مادر را به وسیله مقدار افزایش مورد انتظار وزن شیرخوار، تعداد دفعات ادرار و مدفعه، و وضعیت عمومی او می‌سنجد.

وزن گرفتن شیرخوار

بهترین راه تشخیص کفایت شیر مادر وزن کردن دوره‌ای شیرخوار و رسم منحنی رشد اور روی کارت رشد است. معمولاً نوزادان در روزهای اول تولد کمی وزن از دست می‌دهند که نباید بیشتر از ۷ تا ۱۰ درصد وزن تولدشان باشد. این کاهش وزن در صورتی مجاز است که حال عمومی نوزاد خوب باشد و مشکلی از جمله علائم کم آبی نداشته باشد، پستان مادر به شیرآمده و پروخالی شود و مکیدن‌های نوزاد با بلع همراه باشد و دفعات به پستان گذاشتن نوزاد کمتر از ۸ بار در شبانه روز نباشد.

همزان با افزایش شیر مادر در روزهای ۴ و ۵ نوزادان شروع به وزن‌گیری می‌کنند و طی یک تا دو هفتگی به وزن هنگام تولد خود و یا بیشتر می‌رسند. پس از آن طی ۶ ماه اول زندگی، افزایش وزنی حدود ۱۰۰-۲۰۰ گرم در هفته (و یا ۶۰۰ گرم در ماه) در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادر مطلوب و نشان دهنده تغذیه کافی است.

دفع ادرار

در طول ۲ روز اول عمر تعداد ۱ یا ۲ کهنه خیس در روز برای نوزادانی که بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند طبیعی است. از روز چهارم تولد تعداد ۶ کهنه مرتبط یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمزنگ نشانه دریافت کافی شیر مادر در شیرخوارانی است که بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند.

اجابت مزاج

از طریق تعداد دفعات مدفعه و خصوصیات آن نیز می‌توان به میزان دریافت شیر مادر پی برد. اولین مدفعه نوزاد سبز سیاه تیره و قیری شکل است در روز اول و دوم یک بار دفعه دارد و تا روز ۴ یا ۵ پس از تولد به مدفعه بینایینی سبز و سپس نرم و دانه دانه و زرد تبدیل می‌شود. از روز چهارم تولد تا یک ماهگی ۳-۸ بار اجابت مزاج در ۲۴ ساعت

طبیعی است. (بعد از یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد و حتی هرچند روز یک بار یک اجابت مزاج داشته باشد).

وضع عمومی

در صورت تغذیه کافی با شیر مادر، شیرخوار هشیار است، قدرت عضلانی مناسب و پوست شاداب دارد.

مادران آگاه باشند که مراجعات بموقع برای مراقبت‌های دوره ای کودک که مراقبین سلامت در هر بار مراجعت زمان آن را یادآوری می‌کنند، برای حفظ سلامت کودکان، پیشگیری از مشکلات احتمالی و مداخلات بموضع برای ارتقا سلامتی و تغذیه کودک حیاتی است. در مراجعات کارت رشد کودک را همراه داشته باشند.

فصل چهارم - وضعیت صحیح شیردهی

اهداف آموزشی

- شناخت وضعیت صحیح بغل کردن شیرخوار برای شیردهی
- شناخت وضعیت‌های مختلف شیردهی
- شناخت نحوه عرضه پستان به شیرخوار
- شناخت نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار
- شناخت علائم مکیدن موثر پستان

وضعیت صحیح بغل کردن شیرخوار برای شیردهی



مادر هنگام شیردهی (چه به حالت نشسته و یا خوابیده) باید در وضعیت کاملاً راحتی قرار گیرد تا بتواند به آسانی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسباند. در حالت نشسته روی مبل یا صندلی راحت، داشتن تکیه گاه زیر پا و استفاده از بالش برای حمایت شیرخوار و هم سطح کردن سر شیرخوار با پستان، و در حالت خوابیده گذاشتن بالش سفتی در پشت و بالشی زیر سر معمولاً وضعیت راحتی را برای مادر فراهم می‌کند.

چهار نکته کلیدی وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی باید رعایت شود:

- سر، گردن، گوش‌ها، تنہ و باسن شیرخوار در یک امتداد قرار گیرد.
- بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن او باشد.
- صورت شیرخوار روبروی پستان مادر بطوری که بینی او هم سطح نوک پستان قرار گیرد.
- بدن شیرخوار با دست مادر حمایت شود. (در ماه اول علاوه بر حمایت شانه‌ها و سرنوzaD باید باسن او نیز در آغوش مادر باشد).

شناخت وضعیت‌های مختلف شیردهی

از آنجا که مادران معمولاً بغل کردن شیرخوار به روش گهواره‌ای را می‌شناسند، بهتر است با روش‌های مختلف آشنا شوند تا پس از زایمان بتوانند بطور عملی تمرین کرده و بهترین وضعیت‌هایی که برای مادر و شیرخوار راحت تر است انتخاب کنند.

وضعیت گهواره‌ای متقابل: روشی ایده‌آل برای اوایل شیردهی، کنترل سر شیرخوار و آوردن او به طرف پستان و همچنین برای شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند. استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که



عضلات شل دارند و مادرانی که نوک پستان شان آزده شده بهترین روش شیردادن می‌باشد. اگر مادر از پستان چپ می‌خواهد کودک را شیر بدهد، شیرخوار را با دست راست نگه دارد و بالعکس. دست مادر قاعده گردن و بالای شانه شیرخوار را نگه می‌دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار می‌گیرد. از دست طرف پستان مورد استفاده، برای نگه داری پستان استفاده می‌شود. بدن شیرخوار به پهلو رو به مادر است و دهان او زیر نوک پستان و بینی او هم سطح با نوک پستان مادر است.



وضعیت گهواره‌ای (معمولی یا سنتی): یکی از مرسوم‌ترین روش‌های نگهداشت کودک برای شیردهی است. سر شیرخوار در خم آرنج مادر قرار می‌گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می‌شود. این روش برای زمانی که شیرخوار رشد می‌کند و بخوبی سر خود را کنترل می‌کند مناسب است. در این روش باید مراقب بود که مادر به سمت شیرخوار خم نشود، دست زیرین شیرخوار در پهلوی مادر قرار گیرد و بین مادر و شیرخوار واقع نشود، استفاده از بالش روی ران‌های مادر برای هم سطح نمودن شیرخوار با پستان توصیه می‌شود.

وضعیت زیربغلی: در این وضعیت، مادر می‌نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلوی وی قرار می‌گیرد. با سن کودک روی بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در این وضعیت برای راحتی بیشتر، پشت شانه‌های مادر هم بالش گذاشته شود تا بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تکیه دهد. در شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستان‌ها یا نوک پستان صاف یا فورفته، این وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتری بر شیرخوار و کنترل بیشتری بر سر او دارد. این وضعیت برای مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته‌اند، و در مواردی که بچه خواب آلو است یا در یادگیری تغذیه با شیر مادر مشکل دارد، همچنین برای کودکان نارس و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، و برای تغذیه همزمان دو قولوها مفید می‌باشد.



وضعیت خوابیده به پهلو: در این وضعیت مادر و کودک به پهلو رو بروی هم می‌خوابند. می‌توانید چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف بالا است بگذارید. بچه به پهلو رو بروی مادر طوری قرار می‌گیرد که پشتش بر بازوی اوتکیه دارد و زانوهایش به طرف مادر کشیده شده است. ممکن است لازم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حolle تا شده در پشت شیرخوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شده‌اند گاهی لازم است برای محافظت بخیه‌ها، بین مادر و شیرخوار یک بالش کوچک یا یک حolle تا شده کوچکی قرار بگیرد.



وضعیت خوابیده به پشت: گرچه این روش، وضعیت مناسبی برای شیردهی نیست اما ممکن است در ساعات اولیه پس از زایمان یا شرایط دیگری که مادر نیاز به خوابیدن به پشت داشته باشد، استفاده شود. در وضعیت خوابیده به پشت مادر می‌تواند به یک پهلو غلطیده و از یک پستان شیر بدهد، سپس به پهلوی دیگر غلطیده و از پستان دوم شیر بدهد. توصیه می‌شود مادر راه‌های مختلف را تجربه کرده و آسان‌ترین وضعیت را برای خود و کودکش پیدا کند، معمولاً گذاشتن یک بالش زیر سر لازم است. بعضی از مادران ترجیح می‌دهند چندین



بالش یا کوسن را زیر بالاتنه و سر خود بگذارند تا این قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتری را فراهم می‌کند.

نحوه عرضه پستان به شیرخوار

مادر پس از قرار گرفتن در وضعیت مناسب باید پستانش را بشرح زیر نگهداشته و به کودک عرضه کند: پستان باید به گونه‌ای در دست مادر قرار گیرد که انگشتانش عقب ترو با فاصله از هاله قرار گیرند. در صورتی که به شکل حرف C پستانش را حمایت می‌کند باید انگشت شست در بالا و سایر انگشتانش (بر حسب اندازه پستان) با رعایت نکات ذکر شده، زیر پستان و یا چسبیده به قفسه سینه قرار گیرند.

- اگر مادر مایل است پستانش را با دو انگشت اشاره و میانی (به حالت قیچی) بگیرد باید انگشتان او به اندازه کافی عقب هاله قرار گیرند تا مزاحم پستان گرفتن شیرخوار نشوند. این نوع گرفتن برای مادری که انگشتان بلند یا پستان کوچک دارد، مفیدتر است.



درست



نادرست

نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار

مادر باید لب فوقانی شیرخوار را با نوک پستانش لمس کند تا اودهانش را بازنماید. برای گرفتن قسمت زیادی از پستان و هاله باید دهان او کاملاً باز شود. سپس او را به سرعت و به آرامی به طرف پستان خود بیاورد و نباید خودش یا پستان را به طرف او حرکت دهد. باید به نحوی شیرخوار را جلو بیاورد که لب تحتانی او زیر نوک پستان قرار بگیرد در اینصورت ابتدا چانه کودک، پستان را لمس خواهد کرد.



چهار نکته کلیدی وضعیت پستان گرفتن صحیح

- دهان شیرخوار کاملاً باز است.
- لب تحتانی به سمت بیرون برگشته است.
- چانه کودک در تماس با پستان مادر است.
- اگر هاله دیده می‌شود قسمت بیشتری از هاله در بالای لب فوقانی شیرخوار در مقایسه بالب پائینی دیده می‌شود.



ب: شیرخوار پستان را نادرست در دهان گرفته است الف: شیرخوار پستان را درست در دهان گرفته است

علائم مکیدن موثر پستان

هنگامی که شیرخوار به خوبی به پستان نزدیک است و مقدار زیادی از بافت پستان را به دهان می‌برد، قادر خواهد بود نوک پستان را به عقب دهان (کام نرم) برساند. با این عمل رفلکس مکیدن تحریک می‌شود. هنگامی که شیرخوار پستان را خوب گرفته باشد، احتمالاً خوب می‌مکد و شیر کافی دریافت می‌کند. علائمی نشان می‌دهد که مکیدن موثر و صحیح است.

چهار نکته کلیدی مکیدن موثر

- با ورود شیر به دهان شیرخوار، مکیدن ها آرام و عمیق و گاهی با مکث است.
- صدای قورت دادن شیرخوار به خوبی شنیده می‌شود یا بلع او مشاهده می‌شود.
- گونه‌هایش گرد و برآمده است، در طول تغذیه فرورفته نیست و توکشیده نمی‌شود.
- شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می‌کند و راضی به نظر می‌رسد.
- ضمناً مادر متوجه علائم بارتاب جهش شیر می‌شود.



فصل پنجم - دوشیدن شیر مادر، نحوه نگهداری و مصرف شیر دوشیده شده

اهداف آموزشی:

- شناخت نکات مهم در دوشیدن شیر مادر
- آشنایی با روش‌های دوشیدن شیر
- آگاهی از مدت و دفعات و نحوه نگهداری شیر دوشیده شده
- آگاهی از نحوه تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده

نکات مهم در دوشیدن شیر مادر

موقع دوشیدن شیر

- در شرایط مختلف از قبیل جدایی مادر و شیرخوار مثل مادر شاغل، نوزاد بستری که نتواند مستقیم از پستان شیر بخورد و یا احتقان پستان و به منظور افزایش تولید شیر، مادر باید شیرش را بدوشد. پس باید تمام مادران اعم از شاغل یا خانه دار روش صحیح دوشیدن شیر را بدانند.
- معمولاً دوشیدن شیر پس از هروعده تغذیه کودک راحت تراست زیرا شیر به جریان افتاده است و با تخلیه پستان به تولید شیر کمک می‌شود. گفته می‌شود با دوشیدن شیر در بعداز ظهر شیر کمتری نسبت به صبح بدست می‌آید که این امر طبیعی است. از طرفی ماساژ پستان در حین دوشیدن شیر سبب افزایش حجم شیر دوشیده شده می‌شود.
- برخی مادران چندین هفته قبل از شروع بکار، شیر خود را دوشیده و ذخیره می‌کنند. مادران خانه دار نیز اگر بدلایلی قرار باشد چند ساعت در خانه نباشند، می‌توانند ۱ یا ۲ بار شیرشان را دوشیده و برای تغذیه شیرخوار نگهداری کنند.
- شیردهی مکرر در تعطیلات و شب‌ها که مادر و شیرخوار با هم هستند، تولید شیر را بیشتر می‌کند.

آمادگی مادر و نکاتی که قبل از دوشیدن شیر باید به آن توجه نمود:

- مادر باید محل راحت و مناسبی را برای دوشیدن شیر انتخاب نماید.
- دوشیدن شیر باید در آرامش انجام شود بنابراین باید وقت کافی برای آن منظور گردد.
- مادر باید قبل از دوشیدن شیر دستهایش را با آب و صابون بشوید.
- مادر قبل از دوشیدن از روش‌های جریان انداختن شیر کمک بگیرد. وقتی مادر شیرش را می‌دوشد مانند موقعی که شیرخوار پستان را مکد، بازتاب جاری شدن شیر تحریک نمی‌شود بنابراین مادر موقع دوشیدن باید خود به تحریک و جریان انداختن شیرش کمک کند. از جمله: استراحت قبل از دوشیدن، دوش گرفتن، صرف

نوشیدنی گرم (بجز قهوه)، فکر کردن به کودک، شنیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او، عدم اضطراب، در صورت امکان برقراری تماس پوستی با شیرخوار، ماساژ پشت مادر و ماساژ پستان، گذاشتن حوله گرم روی پستان بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه کمک کننده است.

- اگر مادر شاغل است هنگام صبح باید زودتر بیدار شود و شیرخوار را تغذیه نماید و سپس بقیه شیرش را بدوشد تا در طول روز به شیرخوار داده شود.
- شیرخوار هنگام دوری مادر، حدود نصف فنجان یا ۱۰۰ سی سی شیر دوشیده شده برای وعده بعدی نیاز دارد.

آماده کردن ظرف برای جمع آوری شیر

- مادر لیوان، فنجان، یا شیشه دهان گشادی از جنس شیشه یا پلاستیک که بتواند درب آن را بپوشاند انتخاب نماید و آن را با آب و صابون بشوید.
- اگر شیر برای شیرخوار بیمار یا نارس جمع آوری می شود، ظرف باید استریل باشد.

روش های دوشیدن شیر

روش های متفاوتی برای دوشیدن شیر وجود دارد: دوشیدن شیر با دست، دوشیدن با پمپ دستی یا برقی (شیردوش)، روش ترکیبی دست و پمپ.

دوشیدن شیر با دست، ساده و در هر محل قابل اجرا می باشد و مادر به مرور مهارت لازم را کسب می نماید. باید تمام مادران آموزش دوشیدن شیر با دست را بینند.

انتخاب نوع مناسب پمپ (بر حسب نیاز مادر و شیرخوار) و نحوه دوشیدن شیر با پمپ را بعد از زایمان در بیمارستان به مادر آموزش خواهند داد. اما مادر باردار بداند جزو وسایلی که معمولاً در بارداری تدارک می بیند، از پمپ هایی که ته آن بادکنک لاستیکی دارد و شبیه بوق دوچرخه هستند خریداری نکند که مناسب نیستند. با شیردوش هایی که دوتایی هستند و همزمان هر دو پستان را می دوشند، شیربیشتری بدست می آید. روش ترکیبی دست و پمپ برای مادران دارای نوزاد نارس روش بسیار مفیدی است.

دوشیدن شیر با دست

مادر باید دست هایش را بشوید. پس از اقدامات کمکی برای جریان انداختن شیر (که در بالا گفته شد)، دوشیدن شیر را می توان به دو روش انجام داد:

روش اول


۱. موقعیت قرار گرفتن دست: شست در بالا و دوانگشت اول و یا سایرانگشتان زیر پستان روی لبه هاله به شکل حرف C طوری قرار گیرد که حدود ۳ سانتی متر (به اندازه یک بند انگشت شست) از قاعده نوک پستان فاصله داشته باشد به طوری که ذخایر شیر درست زیرانگشتان واقع شوند. شست و سایرانگشتان باید در دو طرف پستان و در مقابل هم قرار گیرند.

۲. پستان باید به طور مستقیم کمی به طرف قفسه سینه فشار داده شود. پستان های بزرگ را می توان قدری بالا آورده و سپس فشار داد.

۳. سپس پستان را به کمک شست و انگشتان به طرف جلو آورد و بعد به قسمت لبه هاله فشار وارد نمود تا شیر به آسانی خارج شود.

۴. مراحل ۳ - ۱ مرتب تکرار شود.

۵. بعد از چند دقیقه دوشیدن، محل شست و انگشتان را باید دوره‌اله در تمام قسمت‌ها تغییر داد یعنی به صورت افقی، مایل راست، مایل چپ (مانند تصاویر) هم با دست راست و هم با دست چپ پستان دوشیده شود.



روش دوم

۱. انگشت شست شست در بالای پستان و انگشت پنجم چسبیده به قفسه سینه مادر و سایر انگشتان در زیر پستان بنحوی که روی هاله و نوک پستان نباشد.
۲. حرکت موجی شکل انگشتان به روی پستان به نحوی است که ابتدا انگشت پنجم سپس انگشت چهارم سپس انگشت سوم و نهایتاً انگشت اشاره از زیر و همراه با انگشت شست از بالا پستان را می‌فشارند. دوشیدن شیر نباید به پستان صدمه بزند. لذا باید از فشار دادن سایر نقاط پستان، کشیدن پستان و نوک آن، لغزاندن دست روی پستان که موجب کوفتگی و آسیب بافت پستان می‌شود، پرهیز نمود.

مدت و دفعات دوشیدن و نحوه نگهداری شیر دوشیده شده

طول مدت دوشیدن شیر

دوشیدن شیر معمولاً ۳۰-۴۰ دقیقه وقت می‌گیرد. در حین دوشیدن پس از احساس خستگی دست، محل دوشیدن را با جابجایی دست تغییر دهید. دوشیدن تا زمان کند شدن جریان شیر ادامه می‌یابد.

در ابتدای دوشیدن پستان، ممکن است شیری خارج نشود اما پس از چند دقیقه شیر شروع به چکیدن می‌کند و اگر بازتاب جاری شدن شیر (رفلکس اکسیتوسین) فعال باشد، شیر بیشتری جاری می‌شود.

- زمان دوشیدن آگوز برای نوزادی که قادر به مکیدن نباشد باید اندکی بعد از زایمان و ترجیحاً طی مدت ۶ ساعت اول تولد انجام شود.
- دوشیدن آگوز با دست به نحوی است که با ۱۰-۲۰ حرکت، دوشیدن تا زمان کند شدن جریان شیر از یک پستان ادامه دارد و سپس ادامه دوشیدن از پستان دیگر نیز به همین روش انجام می‌شود.

دفعات دوشیدن شیر

تعداد دفعات دوشیدن شیر، بستگی به دلایل دوشیدن در شرایط مختلف دارد. از جمله:
تغذیه با آغوز: برای نوزادی که قادر به مکیدن نیست، مادر می‌تواند آغوز موردنیاز او را که معمولاً به اندازه ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری است از پستان دوشیده و وی را تغذیه نماید. با توجه به گنجایش خیلی کم معده نوزاد، هر ۱ تا ۲ ساعت عمل دوشیدن شیر و تغذیه نوزاد ادامه یابد.

تغذیه نوزادان کم وزن در هنگام تولد و شیرخواران بیمار: برای شیرخواران بحسب نیاز آنان به تغذیه که معمولاً هر ۳ ساعت یکبار یا ۸ بار در ۲۴ ساعت است شیر باید دوشیده شود. نوزادان نارس و کم وزن در ابتداء نیاز به شیر کمتری دارند باید ضمن تشویق مادر به دادن آغوز از همان مقدار کم، و با استفاده از روش‌هایی از قبیل جمع آوری مستقیم شیر با سرنگ از نوک پستان، دوشیدن در قاشق و یا فنجان کوچک، یا دوشیدن مستقیم در دهان، تغذیه شیرخوار انجام شود و هر ۲-۳ ساعت یکبار آغوز را بدوشند.



نحوه جمع آوری آغوز

تداوم تولید شیر در هنگام بیماری مادر یا شیرخوار: به تعداد دفعاتی که شیرخوار به طور طبیعی (حداقل هر ۳ ساعت یکبار) تغذیه می‌شود، دوشیدن لازم است.

دoshidende shirbehمنظور افزایش تولید شیر: در این حالت دوشیدن شیر به مدت ۲۰ دقیقه هر ۲-۳ ساعت یک بار حداقل ۶ بار در روز و با حداقل یک نوبت در شب توصیه می‌شود به‌طوری که کل مدت دوشیدن شیر در شبانه روز کمتر از ۱۰۰ دقیقه نباشد.

برای برقراری شیردهی مجدد: دوشیدن شیر ۸ تا ۱۲ بار در شبانه روز و هر بار به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه توصیه می‌شود.
تسکین احتقان پستان: هر چند بار و هر مقدار شیر که برای تسکین پستان‌ها و کاهش تورم هاله و کشش نوک پستان لازم است، باید شیر دوشیده شود تا شیرخوار بتواند به راحتی پستان را بمکد. بعضی از مادران ممکن است موقتاً قبل از هر بار تغذیه شیرخوار نیاز به دوشیدن شیر داشته باشند و برای برخی دیگر دوشیدن ۱ یا ۲ بار در روز کافی باشد. وقتی پستان‌ها محقق و در دنک هستند دوشیدن با دست مشکل است ولی استفاده از بطری گرم دوشیدن را راحت‌تر می‌کند که کارکنان بهداشتی درمانی شیوه انجام آن را به موقع ضروری به مادر نشان می‌دهند.

رفع نشت شیر از پستان: دوشیدن مقدار زیاد شیر لازم نیست فقط به مقداری که فشار داخل پستان‌ها کاهش یابد، کافی است.

تغذیه شیرخوار هنگام اشتغال به کار مادر در خارج از منزل: مادر می‌تواند قبل از خروج از منزل، بخشی از شیر مورد نیاز شیرخوار را بدوشد که بستگی به ساعات دوری، وزن و سن شیرخوار دارد. بعضی از مادران شیر مورد نیاز شیرخوار را در مدت ۱۵ دقیقه و بعضی همان مقدار شیر را در مدت ۳۰ دقیقه از پستان تخلیه می‌نمایند. ضمناً مادر می‌تواند از شیرهای دوشیده شده قبلی نیز استفاده نماید و به مراقب کودک نشان دهد که چگونه شیر دوشیده شده را با فنجان به شیرخوار بدهد.

مدت ذخیره کردن شیردوشیده شده

برای شیرخوار سالم

- شیردوشیده شده در حرارت اتاق (۱۵-۲۵ درجه که در معرض منبع حرارتی و نور نباشد) تا ۸ ساعت قابل نگهداری است.
- دریخچال (دما ۴ درجه) تا ۴۸ ساعت، و اگر دمای یخچال ثابت است و نوسان ندارد تا ۳-۵ روز قابل استفاده است.
- در جای خی یخچال تا ۲ هفته و در فریزر خانگی تا ۳ ماه قابل نگهداری می باشد.
- شیر منجمد ذوب شده دریخچال کمتر از ۲۴ ساعت.

برای نوزادان نارس و یا بستره

نگهداری شیر تازه در دمای اتاق تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۴ ساعت، دریخچال ۴۸ ساعت و شیر ذوب شده در یخچال حداقل به مدت ۱۲ ساعت و مصرف فوری شیر منجمدی که ذوب شده در دمای اتاق طی ۱ ساعت توصیه می شود.

نحوه ذخیره کردن و نگهداری شیردوشیده شده

- ظرف نگهداری شیر باید دارای درب و در درجه اول از جنس شیشه باشد و در درجه دوم از جنس پلاستیک سخت شفاف توصیه می شود.
- برای نگهداری شیر در فریزر، باید سه چهارم حجم ظرف از شیر پر شود و در آن را بسته و پس از نوشتن تاریخ دو شیدن شیر، در فریزر بگذارند. باید شیرهای قدیمی را زودتر استفاده نمایند. بهتر است ۳۰ تا ۶۰ میلی لیتر در هر ظرف برای هروعده و حداقل ۱۲۰ میلی لیتر نگهداری شود.
- در صورت تمایل، شیردوشیده شده تازه را پس از گذاشتن حداقل ۱ ساعت دریخچال به شیر قبلی که همان روز دو شیده شده و دریخچال نگهداری شده را می توان افزود. شیردوشیده شده گرم را به شیر فریز شده قبلی اضافه نکنید.
- در طی نگهداری شیر مادر، چربی شیر به صورت یک لایه سفید رنگ ضخیم در قسمت بالای شیر نمایان خواهد شد که می توان آن را به آرامی توسط چرخانیدن ظرف محتوی شیر مخلوط نمود ولی از تکان دادن شدید آن پرهیز نمایید.
- رنگ شیر روزانه ممکن است متفاوت باشد و برحسب رژیم مادر به رنگ آبی، زرد و یا قهوه ای باشد و همچنین شیر فریز شده ممکن است بوی متفاوتی (مثل بوی صابون) داشته باشد و اگر شیرخوار تمایل به خوردن آن دارد، اشکالی ایجاد نمی کند.
- برای استفاده از شیردوشیده منجمد شده، باید ظرف را زیر آب و لرم تکان داده تا کم کم یخ آن باز شود و طی یک ساعت همچنان که گرم است مصرف کرد، یا شب قبل آن را دریخچال قرار داد تا به آرامی ذوب شود و طی ۲۴ ساعت (که دریخچال نگهداری می شود) استفاده کرد.
- شیر ذوب شده را باید مجدداً منجمد نمود.
- شیردوشیده شده را باید جوشانید یا با ماکروفر گرم کرد تا عوامل حفاظتی شیر از بین نرود.

نحوه تغذیه شیرخوار با شیردوشیده شده

شیردوشیده شده را می‌توان با قاشق، سرنگ، قطره چکان، فنجان یا وسیله کمکی که لوله آن به پستان چسبانده می‌شود، به شیرخوارداد. از قاشق، سرنگ، قطره چکان معمولاً برای مقدار کم در روزهای اول استفاده می‌شود و هر گاه حجم شیردوشیده شده حداقل ۱۰ میلی لیتر باشد، استفاده از فنجان توصیه می‌شود.

به هیچ وجه از بطری نباید استفاده کرد. تغذیه با فنجان مثل بطری سبب سردرگمی شیرخواردر مکیدن پستان نمی‌شود و شیرخوار می‌تواند به خوبی پستان را گرفته و بمکد. در تغذیه با فنجان احتمال ابتلا به اسهال، عفونت‌ها و تأخیرشد دندانی کمتر است. تمیز کردن فنجان با آب و صابون راحت تر است. هنگام تغذیه با فنجان شیرخوار در بغل گرفته می‌شود و قدری از نیازهای عاطفی او را می‌شود. بعلاوه شیرخوار شیر دریافتی خود را کنترل می‌کند.

روش تغذیه با فنجان

- دست‌هایتان را بشوید.
- شیرخوار باید بیدار و هشیار باشد. دست‌های شیرخوار را در ملافه‌ای مثل قنداق بپیچید تا به فنجان دست نزنند.
- شیرخوار باید به حالت نشسته با حمایت پشت وی در بغل نشانده شود.
- لب‌های فنجان کوچک شیر را روی لب شیرخوار نگهدازید. فنجان را کج نموده تا شیر بالب شیرخوار تماس پیدا کند.
- نوزاد نارس شیر را با زبانش به داخل دهان خود می‌کشد و نوزاد رسیده یا شیرخوار بزرگتر شیر را می‌کند و یا جرعه جرعه می‌نوشد و در این حالت مقداری شیر از اطراف دهانش می‌ریزد.
- از ریختن شیر در درون دهان شیرخوار خودداری شود.



فصل ششم - اقدامات اولیه برای موفقیت شیردهی

اهداف آموزشی:

- آگاهی از برخی اقدامات مهم اولیه برای موفقیت شیردهی
- آشنایی با بیمارستان‌های دوستدار کودک

آگاهی از برخی اقدامات مهم اولیه برای موفقیت شیردهی:

مادر باید خود را برای زایمان طبیعی آماده کند و خود داوطلب سزارین نباشد مگر در مواردی که اجتناب ناپذیر است و پزشک توصیه می‌کند. چون علاوه بر خطرات دیگر تماس اولیه مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر را بويژه در صورت بیهوشی به تاخیر می‌اندازد.

مادر باید در آموزش‌های دوران بارداری شرکت کند و یکی از نزدیکان خود را در این آموزش‌ها سهیم نماید. این فرد می‌تواند مادر را در صورت امکان در هنگام درد زایمان، زایمان و پس از آن همراهی کند. حضور یک همراه طی مرحله درد و زایمان سبب کاهش احساس درد و اضطراب مادر و کاهش نیاز به مداخلات پزشکی می‌شود و آرامش و اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد. فرد همراه می‌تواند مادر را به راه رفتن و تحرك و خوردن غذاهای سبک و مایعات طی مرحله درد زایمان تشویق و کمک کند. مادر احساس امنیت و حمایت می‌کند و این حمایت‌ها در توانمندی وی برای شروع تغذیه شیر مادر طی ساعت اول زایمان کمک کننده است.

مادر باید همواره از عادات مضر مثل سیگار کشیدن و تغذیه نامناسب و استفاده خودسرانه از داروها بويژه در بارداری پرهیزد.

بیمارستان‌های دوستدار کودک


مادر باید برای زایمان بیمارستان‌های دوستدار کودک را انتخاب نماید. در این بیمارستان‌ها ده اقدام برای موفقیت شیردهی انجام می‌شود. لازم به ذکر است این اقدامات نه فقط در بخش زایمان بلکه در بخش‌های کودکان و مراقبت‌های ویژه نوزادان هم انجام می‌شود و تغذیه شیرخواران را با شیر مادر حمایت و ترویج می‌کنند تا شیرخواران بسترسی از شیر مادر محروم نشوند.

مادر با کارکنان بیمارستان برای انجام مطلوب اقدامات دهگانه همکاری نماید که موجب تامین سلامت خود و نوزادش خواهد بود.

در این بیمارستان‌ها

- پوستر ۱۰ اقدام را که به شیردهی موفق کمک می‌کند در معرض دید عموم نصب کرده‌اند.
- کارکنان آموزش‌های لازم را برای حمایت از مادر و نوزاد و اجرای ۱۰ اقدام و شروع موفق تغذیه با شیر مادر دیده‌اند.

- مادران باردار را در زمینه مزایا و چگونگی تغذیه با شیر مادر و عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و پستانک آموزش می‌دهند.
- کارکنان کمک می‌کنند تا بلافاصله پس از تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد برقرار و اولین تغذیه با شیر مادر طی ساعت اول انجام شود.
- روش تغذیه کودک با شیر مادر، وضعیت صحیح شیردهی، دوشیدن شیر و نگهداری آن را به مادر آموزش می‌دهند تا شیرخوار هنگام جدایی مادر با شیر دوشیده شده تغذیه شود.
- تغذیه انحصاری با شیر مادر را رعایت می‌کنند و از دادن هر نوع آشامیدنی از جمله شیر مصنوعی به نوزادان بدون دلیل پزشکی جلوگیری می‌کنند.
- به مادر و شیرخوار اجازه می‌دهند شبانه روز در کنار هم باشند.
- تغذیه مکرر با شیر مادر بر حسب میل و تقاضای شیرخوار را تشویق می‌کنند.
- از بطری شیر و پستانک استفاده نمی‌کنند.
- مادران را به هنگام ترجیح به گروه‌های حمایت از مادران شیرده و مراکز جامع سلامت معرفی می‌نمایند.



فصل هفتم - ضمیمه برای آگاهی کارکنان

اهداف آموزشی:

- آگاهی از نحوه آماده کردن مادر در دوران بارداری برای شیردهی
- آگاهی از چگونگی معاینه پستان و اشکال مختلف نوک پستان
- شناخت شرایط نیاز به مشاوره و مراقبت ویژه برای شیردهی
- آگاهی از اهمیت و نحوه گفتگوی دوران بارداری
- شناخت نقش مردان در حمایت همسر برای شیردهی

آماده کردن مادر در بارداری برای شیردهی

- آماده کردن ایده آل مادر در بارداری آن است که با وی در مورد عقاید و باورها و احساس مادر گفتگو کنید و در وی اعتماد به نفس ایجاد کنید. اگر آموزش و آگاهی دادن به مادر هرچه زودتر شروع شود و مادران و شیرخواران نیازمند مراقبت ویژه شناسایی و حمایت شوند، موفقیت مادر در شیردهی افزایش می یابد.
- آماده کردن پستانها در دوران بارداری لازم نیست.
- از مهارت‌های برقراری ارتباط استفاده کنید.
- با یک سؤال باز شروع کنید مثلا «در مورد تغذیه با شیر مادر چه می دانید؟» این نوع سؤال باز، فرصت و امکان بحث در مورد نظر مادر و موانع و مشکلات احتمالی در شیردهی قبلی را فراهم می سازد.
- اجازه دهید خانم باردار سوالات، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های خود را در مورد تغذیه شیرخوارش بیان کند. گفتگوی دوطرفه با ارزش تراز صبحت یک طرفه کارمند بهداشتی است.
- خانم باردار را با نشان دادن عکس العمل و تشویق مناسب راهنمایی کنید.
- اطلاعات لازم را با زبان ساده بیان کنید.
- چنانچه خانم باردار بگوید ارزش شیر مادر و تغذیه انحصاری را می داند، پس می توانید آگاهی او را تقویت کنید.
- تصمیم مادر در مورد نحوه تغذیه فرزندش تحت تاثیر نظر پدر، مادر بزرگ و سایر افراد خانواده است. می توانید پیشنهاد کنید یک عضو خانواده که به مادر بیشتر نزدیک است و او را کمک می کند برای شنیدن صحبت‌های شما، مادر را همراهی کند.

چگونگی معاینه پستان و اشکال مختلف نوک پستان

- مادر را مطمئن کنید که اکثر خانم‌ها بدون هیچ مشکلی قادر به شیردهی هستند. پستانها و نوک آنها اندازه و شکل‌های مختلفی دارند. ولی همه آنها مگر در موارد خیلی نادر کامل و خوب عمل می کنند.
- شکل پستان تحت تأثیر ارث، سن و حاملگی می باشد. اندازه و شکل پستان با قدرت تولید شیر مرتبط نیست و

پستان‌های کوچک به همان اندازه پستان‌های بزرگ شیرتولید می‌کنند.

- نوک پستان به اشکال مختلف معمولی، کوتاه، صاف، فرورفته و بلند دیده می‌شود. شیرخوار در تمام موارد فوق می‌تواند به خوبی از پستان مادر شیر بخورد. گرچه در نوع صاف و بويژه فرورفته، پس از زایمان کمک بيشتری مورد نياز است، اما اين موارد نيز بعد از زایمان و در دوران شيرده بهتر می‌شوند.
- شيرخوار هنگام شيرخوردن، نوک پستان و آرئول (هاله قهوه‌ای) را به داخل دهان کشیده و می‌مکد بنابراین اگر قابلیت کشش نوک پستان خوب باشد مقدار کافی از نسج پستان در دهان شيرخوار قرار می‌گيرد. حتی در صورت کوتاه و صاف بودن نوک پستان مشکلی ايجاد نمی‌شود.
- پس اقدامات دوران بارداری مثل پوشیدن سينه‌بند، به‌كاربردن کرم، ماساژ پستان، کشش و تمرين دادن نوک پستان يا استفاده از شكل‌دهنده نوک پستان لازم نیست و به شيرده کمک نمی‌کنند.

معايشه پستان در طول بارداری به شرطی مفید است که:

- ضمن معايشه به مادر اطمینان دهيد که پستان‌ها به هر حال در طول بارداری بزرگ می‌شوند و جريان خون در آنها افزایش يافته و حساس‌تر می‌شوند و اين علائم، نشانه آماده شدن پستان برای تولید شير می‌باشد و در طول بارداری هیچ آمادگی و مداخله‌ای لازم نیست.
- روی قفسه سينه و پستان مادر به آثار جراحی، ترومای سایر مشکلات مانند وجود توده در پستان توجه شود.
- چنانچه معايشه پستان در بارداری بخواهد توan نوک پستان و يا پستان مادر را براي شيرده مورد سؤال قرار دهد، اين معايشه و اظهار نظر مضر خواهد بود. خيلي نادر است که خانمی بخاطر شکل پستان يا نوک آن نتواند شير بددهد. پس مادر را نگران نکنيد.

انجام چند روش در دوران شيرده‌ي برای نوک پستان‌های صاف و فرو رفته پیشنهاد می‌شود اما در بارداری کار خاصی لازم نیست:

- تحريك نوک پستان قبل از شروع شيرده‌ي، مكيدن پستان توسط کودک بزرگتر، بيرون کشیدن نوک پستان با سرنگ استفاده از شيردوش مناسب.
- در مورد نوک پستان‌های بلند چون ممکن است شيرخوار فقط نوک را بمکد باید کمک کرد تا او مقدار کافی از نسج پستان را در دهان بگير.

شرایط نیازمند مشاوره و مراقبت ویژه برای شيرده‌ي

برخی از مادران باردار مشکلات و نگرانی خاصی دارند که نیاز به حمایت، مشاوره و توجه خاص کارکنان بهداشتی درمانی و اعضا خانواده شان دارد. اين مادران را شناسایي و به آنها کمک کنيد و درباره موضوعاتی که ممکن است بر تصميم‌گيري آنها برای شيرده‌ي اثر بگذارد صحبت کنيد، چنانچه لازم است با اعضاء خانواده شان صحبت کنيد تا از آنان حمایت کنند.

در شرایط زیر مشاوره ویژه و حمایت از مادر لازم می‌شود:

- مادر برای فرزند قبلی مشکل شيرده‌ي داشته و از شيردادن منصرف شده و شير مصنوعی را شروع کرده و گول زنک یا بطری به شيرخوار داده است.
- مادر اصلاً به فرزند خود شيرنداده است.
- مادر شاغل است و یا تحصيل می‌کند و ساعاتی در روز از فرزندش دور است. در اين صورت باید مطمئن شويد

که می‌تواند سرکار و یا محل تحصیل برود و شیردهی را ادامه دهد.

- مادری که مشکل خانوادگی دارد. (باید اعضاء خانواده را برای حمایت مادر جلب کرد.)
- مادر افسرده است.

• مادر ایزوله و تنها است و حمایت اجتماعی ندارد.

• مادر، جوان، یا مسن است.

- مادر قصد دارد فرزندش را به فرزند خواندگی بسپارد (چنانچه بارداری ناخواسته تلقی شده، باید مادر را حمایت و امیدوار کرد تا بتواند بارداری و شیردهی را با سلامتی به پایان برساند.)
- نازایی وابسته به هورمون داشته است.

• هیپوتیروئیدی درمان نشده دارد.

• دیابت او درمان نشده است.

• دچار بیماری مزمن است یا نیاز به دارو دارد و یا کم خون است. (در این صورت باید درمان شود.)

- مادر قبل از جراحی پستان یا ترومما داشته که مجرای شیر یا اعصاب نوک پستان او طوری صدمه دیده که در تولید شیرش اختلال بوجود آمده است.

• ظاهر پستان وی مشکل دارد: عدم تقارن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری، بزرگ نشدن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری، نوک پستان صاف یا فرورفته (که معمولاً مشکلی در شیردهی نخواهد داشت و اقدامات لازم بعد از زایمان همزمان با شروع شیردهی و با آموزش وضعیت صحیح شیردهی و برجسته کردن نوک انجام می‌شود.).

- پیش‌بینی می‌شود که فرزندش بعد از زایمان به مراقبت ویژه نیاز خواهد داشت.
- مادر دو یا چند قلو باردار است.

• مادر دچار سوء تغذیه است. (براساس دستورالعمل وزن گیری در دوران بارداری)

• اگر مادر دچار عارض حوالی زایمان مثل خونریزی، فشار خون و عفونت گردد.

• مادر HIV یا HTIV مثبت است.

مادر در طی بارداری به فرزند قبلی خود شیر می‌دهد:

در این مورد توجه کنید که نیازی به قطع شیردهی نیست ولی چنانچه مادر سابقه زایمان زودرس داشته یا درد رحمی، خونریزی و کاهش وزن در طول بارداری دارد، اینها دلایل پزشکی برای از شیرگیری در طول بارداری محسوب می‌شوند. اگر مادر با شیردهی دچار انقباض رحمی می‌شود این انقباضات معمولاً خطیر ندارد اما باید با پزشک مشاوره کند. خانم بارداری که شیرمی دهد باید به تغذیه واستراحت خود توجه کند. گاهی پستان‌ها بیشتر حساس می‌شوند یا شیر در ۳ ماهه دوم کاهش می‌یابد که دلیل قطع شیردهی نمی‌شود. چه کمبود غذا در خانواده موجود باشد یا نباشد تغذیه با شیر مادر می‌تواند قسمت عمده‌ای از رژیم غذایی کودک خردسال را تشکیل دهد. چنانچه تغذیه با شیر مادر متوقف شود بخصوص که کودک منبع غذایی حیوانی نداشته باشد در خطر قرار می‌گیرد. تغذیه خوب مادر موثرترین راه تامین نیازهای تغذیه‌ای مادر، جنین و کودک نوبای شیر مادر خوار است. هیچ گاه نباید تغذیه شیرخوار را با شیر مادر ناگهان قطع کرد.

- گاه خانم باردار احساس می‌کند تغذیه انحصاری با شیر مادر امکان پذیر نیست. به او اطمینان دهید که قادر به انجام آن خواهد بود و بلافضلله پس از زایمان تغذیه انحصاری را آغاز کند و اگر با شرایط او واقعاً مشکل و امکان پذیر نباشد، تغذیه نسبی با شیر مادر را که بهتر از محرومیت کامل شیرخوار از شیر مادر است، توصیه کنید.

- مادری که فکر می کند شیردهی وضعیت ظاهر او را تغییر می دهد یا مزاحم کار او خواهد بود یا اطرافیانش او را به تغذیه مصنوعی تشویق می کنند، نیاز به مشاوره و مراقبت ویژه دارد.

گفتگوی دوران بارداری (گروهی - انفرادی)

گفتگو با مادران در دوران بارداری بخصوص برای آنان که زودتر از ۲۴ ساعت از بخش زایمان مرخص می شوند مفید است. در طی ملاقات های دوران بارداری کارکنان بهداشتی باید دانش و اطلاعات قبلی مادر را در مورد شیردهی بسنجدن، آگاهی او را ارتقا دهنده و کمک می کنند تا نحوه مدیریت شیردهی را بیاموزد.

به علاوه خانم باردار نیاز به اعتماد به نفس دارد تا بتواند شیر بدهد. این بدان معنی است که در مورد نگرانی هایی که دارد با او صحبت شود و برای برقراری جریان شیرش کمک شود.

خانم باردار محصل مدرسه نیست که همانند معلم جلوی کلاس بایستید و با او حرف بزنید. آموزش بزرگسالان باید مبتنی بر نیازهای آنان باشد و آن ها بتوانند مطالب را با اطلاعاتی که از قبل می دانستند، پیوند دهند و با دیگران درباره آن گفتگو کنند. بحث گروهی می تواند راه مفیدی برای رفع مسائل فرهنگی و باورهای غلط رایج باشد.

ممکن است یک خانم در دوران بارداری با کارکنان بهداشتی درمانی مختلفی مواجه شود. تمام کارکنان در ارتقاء و حمایت از تغذیه با شیر مادر نقش دارند.

بحث گروهی: جلسات بحث گروهی برگزار کنید. از مادرانی که شیرداده اند بخواهید تجارب موفق خود را بیان کنند و اگر مشکل داشته اند چه بوده و روش پیشگیری چیست. همچنین با استفاده از عروسک روش های شیردهی را بیان کنید.

گفتگوی اختصاصی در طول بارداری: گفتگوی دوران بارداری بخش مهمی از مراقبت های بارداری است. بحث تغذیه با شیر مادر بصورت فردی نیاز به صرف وقت خیلی طولانی ندارد. در هر جلسه با یک بحث کوتاه می توان مطالب زیادی را به مادران تقال داد. بخصوص که عده ای در بارداری بموضع مراجعه نمی کنند و یا فرصت کمی برای گفتگو وجود دارد.

کنترل درک مادر: آگاهی مادر را به طرح چند سوال کنترل کنید.

چک لیست دوران بارداری: استفاده از چک لیست برای موضوعات مورد بحث در مورد تغذیه با شیر مادر به کارمند بهداشتی کمک می کند که به چه مطالبی اشاره نماید و نشان می دهد که چه مطالبی با هر مادر بحث شده است. زنانی را که در طول بارداری بستری هستند را نیز در بحث های انفرادی و گروهی شرکت دهید.

مادران نیازمند مراقبت ویژه را شناسایی و برای شیردهی کمک کنید. برای مثال چنانچه انتظار می رود که نوزاد پس از تولد نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد مثلًا نارس به دنیا آید، صحبت در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر و حمایت های موجود برای تغذیه نوزاد نارس تحت مراقبت ویژه مفید است.

توجه داشته باشید که هنگام بحث گروهی، موقع مناسبی برای دادن اطلاعات در مورد روش تهیه و آماده سازی شیر مصنوعی نیست. در صورت لزوم اطلاعات باید به مادرانی که به دلایل موجه پزشکی تصمیم به تغذیه مصنوعی گرفته اند، به طور خصوصی گفته شود و باید نزدیک به زمانی که لازم است (نه چند هفته قبل از تولد نوزاد) بیان شود.

نقش مردان در حمایت همسر برای شیردهی

- مطالعات گسترده نشان می دهد زنانی که همسرشان آنها را در دوران شیردهی مورد حمایت قرار می دهند مدت طولانی تری به فرزند خود شیرمی دهند و احساس امنیت و آرامش خاطر بیشتری را تجربه می کنند گرچه مردها

نمی‌توانند شیردهند اما می‌توانند کارهایی مانند خواباندن، نواش کردن، حمام کردن، تعویض پوشک و به گردش بردن شیرخوار را انجام دهند. پس برای کمک آنها ارزش قائل شوید و به عنوان یک پدر و همسر به آنها نگاه کنید.

- چگونگی جلب مشارکت پدران: صحبت درمورد فرزند و وظایف پدر در دوران بارداری، تشویق آنان برای شرکت به همراه خانم‌ها در کلاس‌های مشاوره و آموزش شیردهی، آگاهی یافتن از اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش آن در سلامت کودک، دخالت دادن همسر در هنگام مشاهده شیردهی (برای اصلاح وضعیت نوزاد، ماساژ‌گردن و شانه‌های مادر در حین شیردادن، به ویژه در هفته نخست این کمک و همیاری ضروری است و مادر نیز برای طلب کمک از همسرش بعد از زایمان و در هنگام نیاز تشویق شود).

منابع:

۱. حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستان‌ها- فصل سوم)، وزارت بهداشت، انجمن علمی تغذیه با شیرمادر ۱۳۹۲
۲. تازه‌های تغذیه با شیرمادر برای متخصصین کودکان و پزشکان، فصل اقدامات مبتنی بر شواهد جهت حمایت از تغذیه با شیرمادر، انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر، ۱۳۹۳
۳. Core Curriculum for Lactation Consultant Practice, International Lactation Consultant Association (ILCA) ۲۰۱۵.
۴. New Unicef Baby Friendly standards briefing for antenatal education (www.maternal-and-early-years.org)
۵. Promoting Breastfeeding During Pregnancy – step ۳ (Baby Friendly Hospital Initiative:Revised,updated and Expanded for Integrated Care) ۲۰۰۹.
۶. Strategy V: Access to Breastfeeding Education and Information –CDC (<http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/>)
۷. Breastfeeding Education for Increased Breastfeeding Duration.WHO. ۲۰۱۳(www.who.int/elenabbc/breastfeeding-education)