

## عوارض روانی مصرف ترکیبات آمفتامین ها

عوارض روانی ناشی از مصرف آمفتامین ها معمولاً گذرا هستند و بیشتر به شکل توهم بینایی و شنوایی بوده و بسیار شبیه اسکیزوفرنی و پارانوئید بوده و ممکن است چند ساعت تا چند روز طول کشیده و بعضی اوقات لازم می شود فرد در بیمارستان بستری شود. کسانی که بصورت منظم از آمفتامین ها استفاده می کنند اغلب توهم شنوایی و بینایی را تجربه می کنند. بعضی از آنها توهم پوستی دارند و فکر می کنند جانوری داخل پوست آنها راه می رود. افسردگی شدید و میل به خودکشی در مصرف کنندگان طولانی مدت آمفتامین شایع است.

بسیاری از مصرف کنندگان متامفتامین ها اظهار می دارند از همان ابتدای شروع مصرف این مواد، درست قبل از شروع مصرف دچار اضطراب شدید می شوند. خود آزاری و صدمه به خود در مصرف کنندگان بسیار شایع بوده ولی در زنان خیلی کمتر از مردان است. رفتارهای خشونت آمیز و میل به نزاع بخصوص در مصرف کنندگان طولانی مدت و همچنین کسانی که دچار مسمومیت حاد شده اند شایع است.

عارضه روانی شایع دیگر بدنبال مصرف ترکیبات آمفتامینی "اعتیاد" به آن است. علائم محرومیت نسبت به آمفتامین ها با مواد مخدر مثل ترکیبات تریاک و هروئین و همچنین الکل بسیار متفاوت است. فرد دچار بی قراری شدید شده و نمی تواند بخوابد و بدینوسیله قادر به کنترل خود نبوده و این علائم بسیار شبیه مسمومیت با آمفتامین است. سایر علائم محرومیت شامل احساس خستگی شدید، میل شدید به خواب طولانی و برعکس آن، فرد بشدت بی قرار شده و اختلال خلقی شدید و بالاخره افسردگی شدید پیدا می کند. برگشت این حالت بصورت خواب طولانی مدت، پرخوری و تحریک پذیری خود را نشان می دهد.