

خطر کرونا در معتادان بیشتر است

معتادان از سیستم اینمنی ضعیفی برخوردارند و بروز عوارض و علائم در آنها بیشتر است، اما با این وجود آنها دسترسی مطلوبی به خدمات بهداشتی و مراقبتی ندارند و در صورتی که به کرونا ویروس مبتلا شوند، میزان مرگ و میر در آنها به مراتب بالاتر از جمعیت عادی خواهد بود.

پایین بودن سیستم اینمنی بدن معتادان باعث می‌شود آنها در برابر بیماری‌های عفونی نسبت به افراد عادی آسیب‌پذیرتر باشند، این گروه با توجه به اینکه از سیستم اینمنی بسیار ضعیفی برخوردارند علاوه بر شستشوی مدام دست‌ها، می‌باشد تماس‌های خود را با یکدیگر به شدت کاهش دهند.

تمامی معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر از سیستم اینمنی ضعیفی برخوردارند که البته ضعیف بودن سیستم اینمنی در معتادان تزریقی بیشتر از دیگر معتادان است، اما به طور کلی پایین بودن سیستم اینمنی بدن معتادان باعث می‌شود آنها در برابر بیماری‌های عفونی نسبت به افراد عادی به شدت آسیب‌پذیرتر باشند. به طور مثال بیماری عفونی مانند سل که سرعت انتقال و مسری بودن آن به مراتب از ویروس کرونا و ویروس‌های تنفسی دیگر کمتر است، میان مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر از افراد عادی است.

اگرچه معتادان از سیستم اینمنی ضعیفی برخوردارند و بروز عوارض و علائم در آنها بیشتر است، اما با این وجود آنها دسترسی مطلوبی به خدمات بهداشتی و مراقبتی ندارند و در صورتی که به کرونا ویروس مبتلا شوند، میزان مرگ و میر در آنها به مراتب بالاتر از جمعیت عادی خواهد بود.

باتوجه به اینکه معتادان کارتن خواب و بی‌سرپناه که عموماً در مناطق مخروبه و فضاهای غیربهداشتی سکونت دارند و در شرایط نامطلوبی زندگی می‌کنند، امکان انتقال ویروس کرونا در آنها به شدت افزایش می‌یابد. در این میان معتادانی که در گرمخانه‌ها و کمپ‌ها و سایر محیط‌های تجمعی سکونت دارند نیز احتمال انتقال کرونا ویروس در میان آنها بیشتر خواهد بود.

معتادان به ویژه معتادان بی‌سرپناه از امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند و این عدم برخورداری باعث می‌شود آنها برای کنترل و کاهش درد خود میزان مصرف مواد مخدر خود را افزایش دهند.

تیم‌های امدادرسان سیار باید در شهرهای بزرگی که جمعیت کارتن خواب‌ها متراکم است، به شناسایی علائم معتادان، اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه آموزش در این باره پردازنند. همچنین مراجع ذی‌ربط مانند سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت باید سازوکارهای ارجاعی مناسبی را برای معتادان در نظر بگیرند تا در صورتی که مواردی از کروناویروس در میان این افراد گزارش شد، این مراجع فارغ از روال اداری متعارف مانند تشکیل پرونده، درمان این افراد را در اولویت قرار دهند.

لازم است گرمانه ها، کمپ ها و شلترها به طور جداگانه بخش های قرنطینه ای در نظر بگیرند تا افراد مشکوک به کرونا ویروس در این بخش ها نگهداری شوند. همچنین گرمانه ها و کمپ ها و سایر مراکز نگهداری معتادان لازم است به منظور کاهش انتقال بیماری ها ، مواد ضد عفونی کننده ای را در اختیار معتادان قرار دهند و شناسایی زودرس و تفکیک بیمار مشکوک و نگهداری آنها در فضاهایی با شرایط مطلوب را در دستور کار خود قرار دهند. با توجه به اینکه معتادان از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارند علاوه بر شستشوی مداوم دست ها، توصیه می شود که تماس های خود را با یکدیگر به شدت کاهش دهند و معتادان تزریقی نیز مسایل بهداشتی و استفاده از وسائل بهداشتی یکبار مصرف را در دستور کار خود قرار دهند.